

La *Sitta* de la España central

por

A. Gil Lletget.

(Lámina VII.)

En el año 1857 publicó A. E. BREHM, en el *Allgem. Deutsch. Naturhist. Zeitung*, p. 447, una nota en la que establecía una raza de *Sitta cæsia*, propia de España, a la que llamó *minor*, por ser más pequeña que la *Sitta cæsia*, o *europæa cæsia* de los autores modernos.

Como la raza sólo está descrita sobre un ejemplar hembra que llevaba muerto muchos años, aparece con duda en todas las publicaciones de ornitología.

HARTERT, en *Die Vögel der paläarktischen Fauna*, p. 332, sólo la menciona en una nota, y HELLMAYR, en el *Genera Avium* (parte 16), la incluye con interrogante en la sinonimia de *Sitta europæa cæsia*.

Habiendo yo reunido este año material que he podido comparar con ejemplares del Museo Nacional de Ciencias Naturales, representando las formas *europæa*, *caucasica*, *cæsia*, *amurensis* y *uralensis*, y buenas figuras y descripciones de las demás subespecies, puedo confirmar la opinión de BREHM, afirmando la existencia de una raza española.

Esta raza es muy semejante a la *britannica* y *Homeyeri*, y por la clave de HELLMAYR estaría comprendida entre la *persica* y la *britannica*, siendo su culmen como en *S. e. persica*, 16,5, y más pequeño que en *S. e. britannica*; el ala, en cambio, es algo más grande que en ambas, 79,5 a 82 mm. en esta última, 81,86 en *britannica* y 85,5 en *minor*.

La descripción de la raza que nos ocupa, hecha sobre un ejemplar macho muerto a mediados del último mes de Mayo, es como sigue:

La cabeza y la parte superior gris cadete (1). La garganta es blanca, lavada de ante claro. La parte inferior del cuello es del mismo color, pasando gradualmente a un color ante parecido al *warm buff* de RIDGWAY; flancos pardo hígado. Cobertoras inferiores de

---

(1) Los nombres de los colores están tomados de RIDGWAY, *Color Standards*, 1912.