

Hierher gehört: W. Siehe exsicc. e Cilicia no. 439 sub nom. *Xeranthemi inaperti*.

Siebera pungens (Lam.) Gay. β) *nana* DC. — Boiss. fl. Or. III, 447.

Sultanabad, in monte Raswend; VIII. 1899. — Hamadan, in monte Elwend; 15. V. 1895.

Thevenotia scabra (Boiss.). — Boiss. fl. Or. III, 455. — Nota: Thevenotia DC. 1833 (non L. 1737) = Thevenotula O. Kuntze, Lex. gen. phan. 558 (1904).

β) *subaraneosa* Hausskn. et Bornm.; fol. scabris et araneosis.

Sultanabad, in derelictis prope oppidum; 18. VII. 1889. — Bornm. exsicc. no. 4059 sub *Th. scabra* Boiss. (1845) distributa ad *Th. Persicam* DC. Prod. VI. 551 (1837) pertinent, sed *Th. scabra* Boiss. vix specifice diversa est et rectius varietas *Th. Persicae* DC.

Lappa major Gaertn. — Boiss. fl. Or. III, 457.

Sultanabad, in fauce Girdu; 20. V. 1895 (var. *oligolepis* Bornm. v. nov.; capitulis minoribus paucifloris, involucri phyllis minus numerosis).

Cousinia (Homalochaete) discolor Bge. — Winkler, Mantissa synopsis spec. gen. Cousiniae DC. no. 40, in Act. Horti Petropol. XIV (1897), 187—243. — Winkler, Synopsis spec. gen. Cous. in A. H. Petrop. XII (1892), no. 40. — Boiss. fl. Or. III, 464.

Inter Sultanabad et Ispahan, prope Gulpaigan; VIII. 1899.

Cousinia (Drepanophorae) hamosa C. A. M. — Winkler, Mant. l. c. no. 70; Synops. l. c. no. 67. — Boiss. fl. Or. III, 483.

In monte Latetar inter Sultanabad et Kum; VII. 1897.

Cousinia (Orthacanthae) cylindracea Boiss. — Winkler, Mant. l. c. no. 84; Synops. l. c. no. 81. — Boiss. fl. Or. III, 480.

Sultanabad, in planitie; VIII. 1899. — Prope pagum Girdu; 3. IX. 1890 (C. Winkler, Mantissa l. c. p. 220 false sub C. involucreta Boiss., quae in ditione non obvia!). — Prope Gulpaigan; 1899.

var. *patula* Heimerl, in Stapf, Polak. Exp. n. Pers. I, 62 [1885]. — Winkl., Mant. l. c. p. 222; Synopsis p. 219.

Sultanabad, in aridis; 3. VII. 1892. — Prope Gulpaigan; 1899.

Cousinia (Orthacanthae) congesta Bge. — Winkler, Mant. l. c. no. 93; Synops. no. 90. — Boiss. fl. Or. III, 469.

In monte Raswend; VIII. 1890.

Cousinia (Heteracanthae) albescens Winkl. et Strauss. — Winkler, Mant. l. c. p. 223; no. 115.

Luristania, in monte Schuturunkuh, in fauce Dere-tschah (nicht „Dere-tuba“; Winkler l. c.), prope Kale Rustam; 1889. — Hamadan, in montibus Karagan; 1901.

Der klassische Standort dieser in der ganzen Tracht, Blattgestalt und Köpchengröße an *C. oligocephala* Boiss. (Section: Orthacanthae!) erinnernden, gelbblühenden Art ist der Schukurunkuh. Die Exemplare, welche Strauss vom Karagandagh bei Hamadan einsandte, sind davon nur durch breitere, plötzlich (nicht allmählich) in den Blattstiel verlaufende Wurzelblätter verschieden, indessen weichen andere am Schuturunkuh später (1902) gesammelte Exemplare durch bedeutend höheren Wuchs (bis 35 cm hoch) und etwas breitere größere Köpfehen, mit meist verlängerten