

allen Umständen getrennt gehalten werden muß. Auch habituell zeichnet sich die Pflanze vor den *Deiregyne*-Arten dadurch aus, daß die Grundblätter zur Zeit der Blüte eine Rosette um die Basis des Schaftes bilden.

1. *G. tenuiflorum* (Greenm.) Schltr., n. comb.

*Spiranthes tenuiflora* Greenm., in Proc. Amer. Acad. XXXV. (1900), p. 308.

Mexiko.

Die einzige Art der Gattung. Die Pflanze erinnert habituell an gewisse Arten von *Deiregyne*, ist aber schon dadurch gekennzeichnet, daß sie zur Blütezeit auch noch eine Rosette gestielter, bis 17 cm hoher Grundblätter besitzt. Die Blüten sind etwa so groß wie bei *Deiregyne trilineata* (Ldl.) Schltr., aber von dünnerer Textur. Sehr charakteristisch sind die langen, dünnen, trockenhäutigen, fast weißen Scheiden, welche den Schaft ganz einhüllen.

### 18. *Funkiella* Schltr. n. gen.

In dieser Gattung liegt ein weiterer vollständig isoliert stehender Typus vor, der sich in keines der übrigen Genera der *Spiranthisinae* unterbringen läßt, ohne daß dadurch die Gattungsgrenzen unnötig erweitert werden. Da die Pflanze auch habituell sehr auffallend ist, habe ich mich veranlaßt gesehen, sie zum Typus einer eigenen Gattung zu machen, die ich, nach dem bekannten Orchideensammler N. Funk, *Funkiella* genannt habe.

#### *Funkiella* Schltr. n. gen.

Sepala subparallela, horizontalia, subsimilia, glabra, ligulata, obtusiuscula, intermedium basi dorso columnae adnatum, lateralia obliqua, basi vix decurrentia. Petala oblique ligulata, supra medium paulo dilatata, haud decurrentia, glabra, sepali intermedii marginibus intus arcte agglutinata. Labellum horizontale, columnae parallelum, medio marginibus columnae agglutinatum, e basi subunguiculata cuneatum, medio leviter angustatum, dimidio anteriore ovatum, obtusiusculum, subplanum, sepala bene superans, glabrum. Columna gracilis, horizontalis, apicem versus paulo dilatata, dorso sepalo intermedio basi adnata, pede perbrevis leviter incurvulo. Stigma ut videtur simplex, concavulum. Rostellum e basi triangula subito in acumen contractum. Anthera ovato-cordata, cucullata, persistens. Pollinia clavata, viscidio oblongo, in acumine rostellii suffixo. Ovarium breve, erectum, glabrum, leviter tortum.

Herba terrestris; perennis, pusilla; radicibus paucis carnosis, tasciculatis, fusiformibus; foliis basilaribus synanthiis, paucis, erectis, elliptico-lanceolatis, basi petiolata-attenuatis, glabris; scapo brevi, vaginiis paucis tenuibus, alte et arcte vaginantibus omnino obtecto, textura tenui, apice 1—3-floro; bracteis erectis, textura tenuibus, acuminatis; floribus horizontalibus, pro planta vix spithamea satis magnis, tenuibus.