

\*\* forma **radicans** Boul.

Padovano: nei prati torbosi di pianura presso Abbazia Pisani (Béguinot).

\* **Drepanocladus vernicosus** (Lindb.) Warnst.

Friuli: nelle torbiere a Bueris a 300 m. (De Gasperi).

\* **D. intermedius** (Lindb.) Warnst.

Friuli: nelle torbiere a Bueris a 300 m. (De Gasperi).

Padovano: nei prati torbosi presso Onara in maggio (Béguinot).

**D. uncinatus** (Hedw.) Warnst.

Friuli: tra Col delle Erbe e il Ric. Canin a 1900 m. in settembre (De Gasperi).

\*\* **D. exannulatus** (Gümb.) Warnst. var. **brachydictyn** (Ren).

A questa varietà, invece che al tipo, è meglio riferire l'esemplare raccolto dal Pampanini a Mondeval nel Cadore e pubblicato, appunto come forma tipica, nel mio *Primo contributo*.

**Calliergon giganteum** (Schimp.) Kindb.

Cadore: lungo il Musigo presso Chiappuzza in agosto 1908 (Pampanini).

\*\* var. **dendroides** Limpr.

Friuli: nelle torbiere a Bueris in ottobre 1910 (De Gasperi).

#### HYPNACEAE.

\* **Isopterygium depressum** (Bruch.) Mitt.

Friuli: presso gli stillicidi calcarei presso Leonacco a m. 160 in gennaio 1912 (Feruglio).

**Drepanium cupressiforme** (L.) Roth.

Trevigiano: su suolo calcareo presso Vittorio al Passo di S. Boldo a 1500 m., e lungo il Musigo presso Chiappuzza in agosto (Pampanini).

Friuli: sui tronchi degli alberi presso Pradis a m. 135, Tavagnacco e Fontanabona a m. 200 (Feruglio).

\*\* var. **subjulaceum** (Mdo.)

Friuli: in Val di Musi presso Casere Tasaliesu a m. 375, e a Trusgne presso S. Pietro al Natisone a 655 m. in marzo (De Gasperi).