

- \*\* forma **radicans** Boul.  
Padovano: nei prati torbosi di pianura presso Abbazia Pisani (Béguinot).
- \* **Drepanocladus vernicosus** (Lindb.) Warnst.  
Friuli: nelle torbiere a Bueris a 300 m. (De Gasperi).
- \* **D. intermedius** (Lindb.) Warnst.  
Friuli: nelle torbiere a Bueris a 300 m. (De Gasperi).  
Padovano: nei prati torbosi presso Onara in maggio (Béguinot).
- D. uncinatus** (Hedw.) Warnst.  
Friuli: tra Col delle Erbe e il Ric. Canin a 1900 m. in settembre (De Gasperi).
- \*\* **D. exannulatus** (Gümb.) Warnst. var. **brachydictyn** (Ren).  
A questa varietà, invece che al tipo, è meglio riferire l'esemplare raccolto dal Pampanini a Mondeval nel Cadore e pubblicato, appunto come forma tipica, nel mio *Primo contributo*.
- Calliergon giganteum** (Schimp.) Kindb.  
Cadore: lungo il Musigo presso Chiappuzza in agosto 1908 (Pampanini).
- \*\* var. **dendroides** Limpr.  
Friuli: nelle torbiere a Bueris in ottobre 1910 (De Gasperi).

## HYPNACEAE.

- \* **Isopterygium depressum** (Bruch.) Mitt.  
Friuli: presso gli stillicidi calcarei presso Leonacco a m. 160 in gennaio 1912 (Feruglio).
- Drepanium cupressiforme** (L.) Roth.  
Trevigiano: su suolo calcareo presso Vittorio al Passo di S. Boldo a 1500 m., e lungo il Musigo presso Chiappuzza in agosto (Pampanini).  
Friuli: sui tronchi degli alberi presso Pradis a m. 135, Tavagnacco e Fontanabona a m. 200 (Feruglio).
- \*\* var. **subjulaceum** (Mdo.)  
Friuli: in Val di Musi presso Casere Tasaliesu a m. 375, e a Trusgne presso S. Pietro al Natisone a 655 m. in marzo (De Gasperi).