

cm alti, tenues (0,37 mm diametro) pilis brevissimis (0,09 mm longis) retrorsis undique tecti. Folia fere omnia aequalia (infima tantum minima) brevissime pedunculata, anguste-oblonga versus basim et apicem breviter attenuata, 6—8 (raro 10) mm longa, 2—3 mm lata, glabra, papillis microscopicis contacta, crassiuscula; nervus medianus firmus utrimque cum duobus tenuibus nervis lateraliibus, utrimque uberrime punctatus. Pedunculus cum ciliis paucis deciduis. Inflorescentia capitulum formans. Flores pedicellati. Pedicellus dense breviter-retrorse-pubescent. Calyx 3 mm (fructiferus 3,5 mm) longus, calyci tubus campanulatus, labio superiori aequilongus, dorso glaber, ventre pilosus. Dentes superiores calyci breves ($\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ mm longi) acutissimi, non ciliati. Corolla alba, 4,5 mm longa, pilosa, labium superius submarginatum. Calyx et corolla modice glandulose-punctata.

Kaukasus: Lars südl. von Wladikawkas (Marsch. v. Bieberstein, Olga et Boris Fedtschenko); Gau „Sber“ (Ispir nordöstl. Baiburt); Tschabantztal (C. Koch, Orig. Mus. Berlin); Distr. Achalkalaki, pr. pag. Gorelovka, 1750 m (Grossheim), ad lacum Toparavan (Zedelmejer), in Mt. Tavshan, 1570—1700 m, prope urbem Achalkalaki (Grossheim), Prov. Baku, dist. Schemacha, inter pag. Perekeshkjul et pasc. Agridzha (Sachokia).

var. b) **Kochii** Ronn. (= *T. parvifolius* C. Koch Linnaea, 21. Bd. 1848, 666 non *T. parvifolius* Opiz Seznam 97 et apud Déséglise Bull. Soc. Angers 1882, 188).

Lamina superior folii punctis destituta aut parce punctata, inferior item sparsim punctata, calyces et flores saepe rubro-perfusi, dentes superiores calycis breviter triangulares, cetera ut in typo. Gau „Sber“ (Ispir) (leg. C. Koch, Orig. Univ. Genf); Prov. Tiflis, pr. pag. Bakuriani (Kozlowsky); Distr. Achalkalaki, pr. pag. Gorelovka 1750 m (Grossheim); ad lacum Bugdaschen (Zedelmejer); ad lacum Abul-gel (Zedelmejer); Distr. Karabach, in Mte. Murov-Dagh (Kalantarov); Distr. Nachitschewan, in jugo Zangezur prope pag. Bitschenach 1900 m (Gavrilov et Doluchanov).

Der Name „*T. parvifolius*“ gehört zu jenen, welche man am besten wegen „dauernder Verwirrung“ (Nomenklat. Regeln Artik. 51, P. 4) ganz eliminiert.

var. c) **dzawacheticus** Ronn.

Folium utrimque pube brevi parce conspersum. Calyx in ventre uberius pilosus. Dentes superiores calycis breviter ciliati, cetera ut in typo.

Distr. Achalkalaki (Dzavachetia) prope pag. Gorelovka (Grossheim).

var. d) **ponticus** Ronn.

Rami floriferi usque ad 10 cm alti, interdum cum ramis secundariis. Folia glabra, supra fere epunctata, subtus crebre punctata, basi parce ciliata, in ramis floriferis late elliptico-lanceolata,