

cis sparsis, nervis utroque latere costae circ. 12. Stipulae arista vaginae aequilonga munitae. Rami floriferi 1—3 jugis foliorum coronati. Inflorescentia breviter pubescens. Calyx lobis ovatis, 1 mm longis latisque. Corolla tubo 7 mm longo, lobis 9 mm longis. Stylus 16 mm longus.

Distr. Africa Occidentali Cisaequatoriali. — Cameroons, Jaunde (Mildbraed 7978 B.D. typus).

48. *Pavetta permodesta* Wernham in Journ. Bot. LIV (1916) p. 227.

Planta caule lignoso simplici, circ. 10 cm alta, parte annotina caulis foliisque glabris. Folia petiolata; petiolus 3—7 mm longus; lamina oblanceolata, 12—15 cm longa, 3,6—4,5 cm lata, longe acuminata et basi longe cuneata, domatiifera, nodulis omnibus sparsis, nervis utroque latere costae 10—12. Rami floriferi duobus jugis foliorum coronati. Inflorescentia puberula, floribus circ. 40. Calyx lobis triangularibus an ovatis, 0,5 mm longis, 0,7 mm latis, intus glabris. Corolla tubo 6 mm longo, lobis 7 mm longis. Stylus 12,5 mm longus.

Distr. Africa Occidentali Cisaequatoriali. — Cameroons, Bite—Jaunde (Bates 716 N.H. typus, id. 1318 N.H.).

49. *Pavetta bangweënsis* Brem. sp. nov.

Frutex omnibus partibus glaber. Folia petiolata; petiolus circ. 2,5 cm longus; lamina anguste oblonga an oblanceolata, 14—16,5 cm longa, 4,7—5,3 cm lata, longe acuminata, basi cuneata, domatiis nullis, nodulis sparsis, nervis utroque latere costae circ. 9; stipulae cuspidatae. Rami floriferi uno jugo foliorum, magnitudine paulum reductorum coronati. Inflorescentia floribus circ. 20. Calyx lobis subquadratis, obtusis, non imbricatis. Corolla tubo 2,5 mm longo, lobis 5,5 mm longis. Stylus 11 mm longus, pubescens.

Distr. Africa Occidentali Cisaequatoriali. — Cameroons, Bangwe (Conrau 66 B.D. typus).

50. *Pavetta ixorifolia* Brem. sp. nov.

Frutex omnibus partibus glaber. Folia petiolata; petiolus usque ad 9 mm longus; lamina coriacea, lanceolata, circ. 11 cm longa et 3,5 cm lata, acuminata, basi acuta, domatiis nullis, nodulis nullis, costa alba, nervis utroque latere costae 12—14; stipulae breviter cuspidatae. Rami floriferi uno jugo foliorum coronati. Inflorescentia floribus circ. 20. Calyx truncatus an breviter lobatus. Corolla tubo 5 mm longo, lobis 5 mm longis. Stylus 11,5 mm longus.

Distr. Africa Occidentali Cisaequatoriali. — French Guinea, Fouta Djallon (De Caille 18137 Par. typus).

51. *Pavetta neurocarpa* Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 414; Hiern in Oliver, Fl. Trop. Afr. III (1877) p. 172; Hutch. & Dalz in Fl. West Trop. Afr. II (1931) p. 91; — *Ixora neurocarpa* (Benth.) Kuntze in Rev. Gen. Pl. I (1891) p. 287; — *P.*