

II. — PLÉCOPTÈRES.

Perla ochracea Kolbe.

Algérie : entre Médéa et Blida (KOLBE).

Perla bipunctata Pict.

Algérie : entre Médéa et Blida (KLAFALEK).

* *Perla* sp. (? *abdominalis* Burm.)

Algérie : oued Ighzer Temda, forêt de l'Akfadou, Kabylie; ruisseau dans les gorges de la Chiffa, entre Médéa et Blida, 6-V-23 ; *larves* (H. GAUTHIER).

Chloroperla Codinai Nav.

Maroc : Algesiras (NAVAS).

Strobiella minuta Klp.

Algérie : Bône (MORTON).

Genre et espèce connus seulement d'Espagne (Sierra Morena, STROBL) et découverts en Algérie par MORTON en 1903 (E. M. M., 1904, p. 38).

Leuctra tangerina Nav.

Maroc : de Tanger à Fondak de Aïn Yedida (NAVAS).

* *Leuctra geniculata* St.

Algérie : oued Ighzer Temda, forêt de l'Akfadou, Kabylie, *larve*; Alger, *adulte*.

La découverte par M. H. GAUTHIER de cette espèce est particulièrement intéressante au point de vue géonémique (1).

* *Protronemura humeralis* Pict.

Algérie : oued Areoua près d'Adelia, *larve*; source dans les gorges de la Chiffa, 6-V-23, 1 *adulte* (H. GAUTHIER).

Genre nouveau pour la faune nord-africaine.

N. B. — Je ne sais ce que peut être la *Perla Picteti* Luc., citée par LUCAS dans son *Exploration de l'Algérie*.

(1) Cf. LESTAGE. — La larve de *Leuctra geniculata* (*Ann. de Biol. lacustre*, IX, 1919 (1920), pp. 257-268).