

SCORPIONS DU SAHARA CENTRAL

par M. Paul PALLARY

La faunule des Scorpions du Sahara est relativement peu nombreuse. Jusqu'à ce jour, en effet, on ne connaissait guère que le vulgaire *Prionurus australis* L., le *Pr. Amoreuxi* Sav. et le *Buthus leptochelys* H. et Ehr. En 1914, l'arachnologiste russe A. A. BIRULA a distingué le *Prionurus* saharien de l'*Amoreuxi* d'Egypte et lui a donné le nom de *Pr. deserticola* (1). De même, il ne considère plus *B. leptochelys* comme identiquement semblable à celui d'Egypte et lui ajoute le nom d'*arenicola* que lui avait donné E. SIMON (2). BIRULA a encore décrit, en 1905, du Sahara tunisien, un *Buthus bicalcaratus* qui est le type de la section *Buthiscus* et un *B. Spatzi* qui est le type de la section *Buthacus* (3). Ce dernier est apparenté au *B. leptochelys*.




Fig. 1. — *Buthacus exilis* Plyr, de Djanet.

De notre côté, nous avons ajouté à cette liste deux espèces que nous avons décrites en 1928, dans le *Bulletin du Muséum*, pages 348 à 350: *Prionurus eburneus* et *Buthacus exilis* d'après des exemplaires envoyés de Djanet à l'Institut Pasteur d'Algérie, par le D^r CICILE.

En 1928, notre ami, le Professeur SEURAT, a rapporté de son voyage au Hoggar six espèces de Scorpions: *Buthus occitanus* Amrx, *Prionurus australis* L., *Pr. deserticola* Birula, *Buthacus leptochelys* H. et E., *Hete-*

(1) In *Sitz. d. Akad. der Wissensch. in Wien*, juni 1914, p. 635.

(2) Etude sur les Arachnides rec. en Tunisie, in *Explor. scientif. de la Tunisie*, 1885, p. 52.

(3) In *Zool. Anzeiger*, 1911, p. 137.