

au pied des Pyrénées par M. L'ABBÉ DULAC et dans le Lyonnais par MM. J. THERRY et VEULLIOT.

M. l'abbé Dulac de Sauveterre (Hantes-Pyrénées) dont nous avons souvent parlé à propos de ses intéressantes observations de tératologie mycologique prépare on le sait une Florule cryptogamique de la contrée qu'il habite. Les communications que nous avons reçues de lui sans discontinuité pendant le trimestre qui s'est écoulé sont autant de contributions à son futur travail. Nous relevons ci-après, en les puisant dans ses lettres et sur la vue des spécimens eux-mêmes, ses plus intéressantes découvertes :

Helvella crispa v. *fulva* Bull. à chapeau jaunâtre. *Cantharellus cine-reus* Fr. *Phallus caninus* F. *minor*. On sait que le stipe de cette espèce acquiert habituellement 8 à 10 cent. d'élévation ; l'exemplaire que nous avons reçu et provenant du bois de Coureau, est une véritable miniature ; il mesure à peine 5 à 4 cent. de hauteur et il est fertile. — La communication la plus importante consiste dans l'*Agaricus Oléarius* DC. 1^o à chapeau jaunâtre clair, papilleux, arrondi et à stipe central droit ; 2^o à chapeau ovale et à stipe latéral ; 3^o sessile, excroissant en groupe dans l'excavation du tronc d'un vieux *chêne* (racines ou souches) « deux fois à Sauveterre et une fois à Artagnan ». On sait que cette espèce très variable dans sa forme (un *Pleurotus* pour Fries et la plupart des auteurs, un *Crepidotus* pour MM. de Seynes et Inzenga) se présente rarement avec un *stipe central* et plus rarement avec un *stipe droit*. Elle a été observée par le savant auteur de la Flore Française autour de Montpellier (l'espèce on le sait y est fort répandue) sur les racines des *oliviers*. Chapeau roux doré ou quelquefois un peu brun en dessus, sur le *charme*, le *lilas*, le *laurier tin* et le *chêne yeuse*. Castagne l'a récoltée à Marseille sur le *figuier* et l'*acacia*. M. Inzenga en Sicile, sur l'*Arbousier*, l'*Alatérne* et l'*Ailante*. L'habitat du *quercus nigra* que fait connaître M. l'abbé Dulac est à ajouter à la série des supports de cette espèce qu'il faudra probablement réunir à la forme du noisetier jadis distinguée par Paulet (*Ag. Carpinii* B. Barla Fl. Nice Tab. 24 f. 5-7). La découverte de M. l'abbé Dulac a, pour la géographie botanique, un intérêt qui n'échappera à personne. — Nous relevons encore dans les notes de notre zélé correspondant les noms des espèces suivantes : *Agaricus violaceus* L. *Ag. infundibuliformis* Bull, *Cantharellus cornucopioides* Fr. *Clavaria alba* Prs. (isolé et fasciculé) toujours au même bois de Coureau en nombre. — *Ag. radicans* Fr. *Ag. longipes* Bull., *Agaricus microphyllus* Cord., parasite sur l'*Ag. adustus* Pers. *Agaricus hybridus* Bull., sur une souche de chêne, deux individus réunis.

Notre ami et bien zélé collaborateur M. J. Therry est constamment sur la brèche. C'est un pionnier de la mycologie des plus infatigables et des plus heureux à la fois. S'il est un carnet de voyage et d'herborisation curieux à connaître, c'est le sien assurément ; chaque feuillet, c'est-à-dire chaque journée a sa part utile et intéressante lorsqu'elle n'est pas, ce qui est fréquent, consacrée à une découverte nouvelle pour la contrée ou pour la science ! En attendant que nous ayons à parler d'un envoi considérable qui nous est annoncé par notre ami de Lyon, nous empruntons aux procès verbaux des deux dernières réunions de la société Botanique de cette ville, les communications mycologiques émanant de MM. Therry et Veulliot :

Séance du 7 novembre. — M. Therry, présente divers cryptogames récoltés aux environs de Lyon du 15 octobre au 7 novembre 1882. Ce sont : *Onphalia scyphiformis* Fr. sous les touffes de buis. *Mycena Corticola* Sch. sur