

rogench. Fonen fàcilment al soplet ab bulliciò, donant un glòbul negrós; directament son poch atacats pe 'ls àcits, pero fosos ja ho son més, donant clarament la reacció del ferre y la del coure. Aquest darrer detall es degut, no á que 's tracte de la varietat anomenada *cyprina*, sino á que 'l sulfur de coure que engloba á tots ells deu estar difundit per les seues esquerdes.

Barcelona, Febrer 1908.

N. FONT Y SAGUÉ, PVRE.

## TROVALLA DE UNA TORTUGA DEL GRUPU «EMYDÆ»

EN EL

Pliocénich del Hospitalet (Barcelona)

NOVA PER EUROPA

El día 26 de Desembre de 1905, ab mon amich En Joseph Colominas, anárem á estudiar el jaciment Pliocénich (Sorres del Astiá) del Hospitalet, prop del Cementiri, bæn explorat per l' inteligent geólech y paleontólech lo Canonge Dr. D. Jaume Almera, ahont recullirem:

*Scalaria pseudoscalaris*, Brocchi.

*Ostrea cochlear*, Poli.

» *lamellosa*, Brocchi.

» *Companyoi*, Fontannes.

*Anomia ephippium*, L.

*Chlamys scabrellus*, Lam.

» *venustus*, Golfus.

» *opercularis*, L.

» *Bollenensis*, Mayer.

» *pes felis*, L.

*Pecten benedictus*, Lam.

» *Jacobæus*, L.

*Amussium cristatum*, Bronn.

Pólipers y Foraminífers que actualment tè en estudi el Canonge Almera.