

libus numerosis oblongo-linearibus acutis acute runcinato-dentatis basi modice attenuatis sessilibus, caule erecto anguloso omnino aphylo vel foliis 1—2nis valde diminutis lineari-lanceolatis acuminatis subintegris *basi sagittatis sessilibus* obsito superne in ramos 2—3nos arcuato-strictos tenues longos monocephalos bracteis linearibus fulcratos diviso, pedunculis *apice non incrassatis* aphyllis, capitulis subminoribus, involucri phyllis lineari-oblongis subobtusis integris praeter tomentum album parcum setis pilisque longis nigris eglandulosis dense obsitis, externis paucis multo brevioribus, acheniis apice attenuatis pallidis laevibus, pappo albo involucrium vix excedenti. Floret augusto.

Caulis 15—24 cm, folia radicalia 6—7 cm  $\times$  6—10 mm, involucrium 1 cm  $\times$  8 mm.

In pratis alpinis m. Vitoša (Vel).

Similis *C. grandiflorae*, sed indumento, statura graciliore, foliis, capitulis minoribus certe diversa.

- C. orbelica** Vel. 1890. ♀. Perennis, radice fusiformi, foliis herbaceis utrinque *glandulis sessilibus et brevissime pedicellatis dense obsitis*, radicalibus obovato-oblongis in petiolum brevem attenuatis retrorsum acute inciso-dentatis, caulinis subintegris *e basi profunde cordata amplexicauli et auriculis angustis instructa late ovatis vel ovato-oblongis* obtusis vel superioribus subacutis, caule crasso sulcato pilis glanduliferis brevibus obsito a medio in ramos crassos paucos strictos aphyllis foliis fulcratos monocephalos diviso, pedunculis apice vix evidenter incrassatis, capitulis mediocribus, involucri phyllis lineari-elongatis breviter acuminatis virenti-nigris *glandulis densissimis sessilibus paucisque pedicellatis viscidis* externis perpaucis internis triplo brevioribus, acheniis apice attenuatis pallidis sub20costatis costis laevibus, pappo albo involucrium vix superante. Floret julio.

Caulis 40—80 cm, folia inferiora 14—18 cm  $\times$  5—7 cm, caulina 3—4 cm lata et 6—7 cm longa, involucrium 13 mm longum et 10 cm latum.

In graminosis subalpinis m. Rilo non procul a coenobio (Vel).

A *C. grandiflora* discedit haec species praesertim indumento viscido. Indumentum nempe *C. grandiflorae* in speciminibus bulgaricis, serbicus, helveticis et bohemicis animadverto ubique e glandulosis et pilis eglandulosis compositum, dum in nostra specie de-