



Vahl, Martin

Symbolae botanicae [...] Pars Prima... (1790)

Index

1. 17

2. 18

Convolvulus spinosus. FORSK. Cat. pl. Arab. pag. 106. n. 121.

Habitat in Arabia.

FRUTEX rigidus, ramosissimus, diffusus, pedalis: ramis ramulisque spinefcentibus: ramulis subsericeis, semipollicaribus.

FOLIA sessilia in ramis ramulisque, sparsa, oblonga, sericea, integra, parva, vix bilinearia.

FLORES ex axillis inferioribus ramulorum, sessiles, plerumque solitarii, rarius gemini.

Bractea binæ ad basin calycis, oblongæ, acutiusculæ, apice parum latiores, reflexæ.

CALYCIS foliola hirsuta, duo exteriora oblonga, rigida, reliquis majora.

COROLLA hirsuta, parva.

STIGMATA duo, capillaria.

CONVOLVULUS foliis sagittatis postice obtusis, caule repente, pedunculis sub- *Repens.*
bifloris (unifloris L.) LIN. S. V. pag. 203.

Ipomœa aquatica; foliis cordatis acutis. FORSK. Descr. p. 44.

Habitat in aquosis Arabiae felicitis.

RADICUBÆ fibrosæ, bipollicares.

CAULIS repens, teres, crassitie pennæ anserinæ. Stolones axillares, 3-4 pollicares.

FOLIA primaria cordato-acuminata, versus basin dentata: dentibus 3-4 inæqualibus, remotis, pollicaria. Stolonum cordato-sagittata, integerrima, minora. Omnia glabra.

Petiolus flexuosus, glaber, foliis duplo longior.

PEDUNCULUS axillaris, solitarius, biflorus, rarius quadriflorus, longitudine petioli. Flores pedicellati: pedicelli sensim crassiores. Bractea duæ minutæ ad basin pedicellorum.

CALYX quinquefidus: laciniis oblongis, glaberrimis, obtusis.

COROLLÆ tubus semipollicaris.

Planta FORSKALÆI optime convenit cum BALEL Hort. Malab. T. II. pag. 107. tab. 52.

Convolvulus vero PLUM. Amer. p. 89. tab. 105. videtur esse diversa planta.

CONVOLVULUS foliis panduriformibus integrisve emarginatis basi cordatis, pedunculis unifloris, caule repente. *Imperati*
60-61.

Convolvulo marino. IMPER. h. n. 671.

Soldanella vel brassica maritima major. BAUH. PIN. 295.

Convolvulus marinus, *Soldanella affinis*. BAUH. h. 2. pag. 168.

Convolvulus maritimus, *major italicus*, *sinuato & auriculato folio*. MORIS. h. Ox. 2. 37.

Soldanella marina, *longo & sinuato folio*, seu *Convolvulus marinus lactescens Soldanellæ congener*. Imperati. BARREL. Obs. 33. Icon. 856.

Habitat ad littora maris Neapoli.

FOLIA petiolata, remota, erecta, oblonga, basi cordata, utrinque lobulis binis rotundatis aucta, interdum integra, emarginata, crassiuscula, glabra, nervosa, subpollicaria.

Petiolus folio longior.

PEDUNCULUS axillaris, solitarius, interdum gemini, longitudine petiolorum; versus apicem foliolum lanceolatum.

E

CALYX



CALYX glaber: foliolis oblongis.

COROLLA & habitus Convolvuli Soldanellæ.

Arenarius CONVOLVULUS foliis oblongis emarginatis basi lobatis integrisve, pedunculis
60-61. unifloris, corollis tubulosis, caule decumbente.

Habitat in Insulis Azoricis.

Tota planta lævis.

CAULES decumbentes, filiformes, purpurascens, flexuosi.

FOLIA congesta, petiolata, oblonga, apice valde emarginata, basi sæpe utrinque lobulo rotundato aucta, interdum integra, avenia, subtus pallidiora, semiunguicularia.

Petiolus foliis longior.

PEDUNCULI bini vel solitarii, axillares, petiolum æquantes.

CALYCIS foliola æqualia, oblonga, submembranacea.

COROLLÆ *Tubus* superne sensim parum ampliatus, sesquipollicaris.

Facies omnino præcedentis sed lævis, folia plura congesta, caulis decumbens, præcipue vero differt corollis tubulosis, non vero campanulatis ut in C. Imperati.

CAMPANULA.

Cochlearifolia CAMPANULA foliis inferioribus petiolatis subrotundis dentatis, summis lanceo-
47-48. latis sessilibus subintegerrimis.

Campanula minor alpina foliis cochleariæ. BARREL. icon. 454.

C. cochlearifolia caulibus simplicibus unifloris, foliis radicalibus cordato-subrotundis crenatis longissime petiolatis, caulinis subspathulatis acutis flore cernuo. LA MARK Encycl. no. 4.

Habitat in Apeninis. Communicavit mecum Dn. CAVOLINI Neapolitanus, Cultor Historiæ naturalis eximius.

Tota glabra.

CAULES debiles, semipedales, superne ramosi. *Rami* simplicissimi, patentissimi.

FOLIA alterna; inferiora petiolata, subrotunda, grosse dentata, dentibus utrinque 3 acutis, basi integerrima, crassiuscula, avenia, semiunguicularia: superiora lanceolata, sessilia, subintegerrima, dente interdum uno alterove.

FLORES in apice ramorum solitarii, ante florescentiam cernui.

CALYCES glabri: laciniis lanceolato-subulatis, corolla longioribus.

CAPSULA angulata e lineis elevatis decurrentibus, trilocularis.

Diffusa CAMPANULA caulibus diffusis, foliis petiolatis ferrato-dentatis, inferioribus cor-
52-53. datis, superioribus lanceolatis, pedunculis unifloris.

Campanula parva, rotundifolia, flore cæruleo, pentagono grandi. RAJI h. pag. 791. TOURNEF. Inst. R. H. pag. 112. fide herbarii TOURNEF.

Campanula saxatilis, rotundifolia, hispida; flore cæcio amplo italica. BARREL. Icon. 453.

Habitat in Calabria. Dn. Pacifico. 2

RADIX perennis.

CAULES diffusi ramosi. *Rami* teretes, glabri, striati.

FOLIA petiolata alterna, obtuse ferrato-dentata, glabra, obtusa, unguicularia, inferiora cordata, summa lanceolata.

Petiolus