



Asso y del Río, Ignacio Jordán de

Synopsis stirpium indigenarum Aragoniae... (1779)

Index

1. 82

2. 83

OROBANCHE.

576. *Orobanche major* Loeffling. *Iter*, p. 207.
Terra bona Laguna l. 2. c. 131. Cienfuegos t. 3. p. 414.
 Provenit in siccis *en el monte torrero*, & alibi.
 Pecori displicet Schreber *Samml.* III. p. 62.

VITEX.

577. *Vitex Agnus castus*.
Sauzgarillo Laguna l. 1. c. 114.
 Loci non memini, sed plantam coram habeo, & in herbario Josephi Lucan nuper vidi.
 Folia integerrima in meis speciminibus.
 In Oriente semina cum Cepà contusa, & in cataplasmatibus formam redacta stomacho admovent in doloribus colicis Forskal.
Fl. Arab. p. 213.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

MYAGRUM.

578. *Myagrū rugosum*.
 Passim in agris *Casaraugusta*, *en Epila*, *Daroca*, *Calatayud*.
 Folia sæpius lanceolata, & obversè ovata. Caules procumbentes.
579. *Myagrū perfoliatum*.
 Myagrū Diosc. l. 4. c. 118. posset esse *Sativum*.
 In agris non rarum, *en Mojuela*.
580. *Myagrū paniculatum*.
 Occurrit mihi in montosis propè *la Val ruerta de Mosqueruela*.
581. *Myagrū (irregulare)* petalis duobus proximis reliquis majoribus, foliis lyrato-sinuatis.
 Myagro similis flore albo J. Bauh. *Hist.* II. p. 897.
 Oritur locis gramineis, humidiusculis *en Hijar*.
 Radix fibrosa. Caules palmares, teretes, glabri. Folia radicalia lyrato-sinuata, etiam integra, & oblonga, glabra: caulina amplexicaulia, basi sagittata. Flores albi. Calyx tetraphyllus. foliolis oblongis, concavis. Petala quatuor linearia, quorum duo proxima cæteris majora. Filamenta 6. de more familiarum, nullis denticulis instructa. Germen ovatum; stylus filiformis, brevis; stigma obtusum. Capsula subglobosa unilocularis, bivalvis. Semen unicum, subrotundum.
 Singularis planta, quæ notas artificiales diversorum generum in

in fructificatione colligat; nam ob petala irregularia ad *Iberides*,
ob capsulam manspermam forsam ad *Crambes* genus revocari
posset. Ego verò deficientibus staminum denticulis, & habitâ
ratione styli, atque faciei *Myagris* annumeravi.

DRABA.

382. *Draba alpina*.
Provenit in rupibus en el monte de Herrera, en el avellanar del
Collado circâ Badenas.

383. *Draba verna*.
In montosis frequens en Tolocha, Moncayo, en el monte de Her-
rera &c.
Paronychiis imposita medetur Gunner. Fl. Norv. p. 3. Racemus
nutans instantes imbres indicat Linn. Amœn. t. 1. Fl. œcon.

LEPIDIDIUM.

384. *Lepidium sativum*.
Mastuerzo Laguna l. 2. c. 144.
Provenit locis glareosis *Cesar Augusta*, en Moyuela.
In acetaria recipitur.

385. *Lepidium latifolium*.
Mastuerzo salvage Laguna l. 2. c. 165.
Juxtâ fossas magnâ copiâ *Cesar Augusta*, en Epila, Daroca, Ca-
latayud, Barbastro.

Judæi agnum paschalem cum Lepidio edere solebant. Huic
successit *Cochlearia armoracia*. Linn. Amœn. t. 5. Culina mu-
rata.

386. *Lepidium subulatum* Tab. VI. f. 3.
Habitat in siccis propè Epila, Tenuel.
Folia infernè imbricata. Flores numerosi albi, Siliculæ ovatæ.
Non est, *Nasturtium fruticosum*, foliis linearibus, glaucis, subirsu-
tis Haller. Helv. n. 506. quod cum nostro conjunxit.

387. *Lepidium Iberis*.
Iberis Diosc. l. 1. c. 147.
Passim juxtâ vias *Cesar Augusta*, en Daroca, Calatayud, Epila,
Barbastro.
Stamina sex in nostro solo: totidem in Helvetiâ numeravit
Hallerus n. 507.

THLASPI.

388. *Thlaspi alliaceum* Diosc. l. 2. c. 145.
L 2 Le-