

R. 6152

PLANTARUM  
RARIORUM  
ET  
EXOTICARUM  
IN  
HORTO  
KLEINIANO

FASCICULUS I.  
ANNO 1747. ET 1748.

*GEDANI*

Typis THOMÆ JOANNIS SCHREIBERI

MAGNIF. SENATUS ET ATHENÆI TYPOGRAPHI.

1748.



PLANTARUM

RARIORUM

ET

EXOTICARUM

IN

HORTO

KLAVIANO

FASCICULUS I.

ANNO 1744 ET 1745

GRADVA

THEATRO JOHANNIS BERNARDINI

IN THEATRO JOHANNIS BERNARDINI

1745

# Hochgeneigter Leser.



**S**eit dem im April 1747 dieser Garten unter meine Pflege gegeben worden, habe mir fürnehmlich müssen angelegen seyn lassen, so wohl den Garten selbst, als die durch übele Wartung meiner Vorfahren versäumte schöne Gewächse bisher in möglichste Ordnung und unter gehörige Cultur zu bringen, und solches mit desto mehrm Eifer und Lust, nachdem mein Patron ein beruffener Liebhaber und keine Mühe noch Kosten gespartet, einen sonderlichen Zuwachs von ausländischen Saamen und Pflanzen mir anzuschaffen. Wann derselbe mir nun auf mein Bitten erlaubet, dieses erste Büschlein, so er zu seinem und meinem Gebrauch selbst zusammen gebunden, als die erste Frucht meiner schuldigen Bemühung denen Garten-Pflanzen- und Blumen-Kennern dienstgestliffend zu offeriren, so habe nur Anfangs zu erinnern, daß nicht alle ausländische, sondern dererselben nur diejenige Gewächse, welche vorjezt zu hofentlich



fentlich=dauerhaftem Wachsthum oder auch zur Blüte gebracht, angegeben, mehrere aber, welche annoch zart und zweiffelhaft sind, vor die künftige Büschlein ausgestellt worden; Auswärtigen kan indessen dieser Catalogus zur Nachricht dienen, was im Garten bey mir vorhanden; der ich erbötig bin, jedem diejenigen Garten=Sachen, welche ich mehr als gedoppelt unterhalten mögen, oder auch nach Bewandniß mit Saamen und Früchten, gegen billigmäßige Zahlung, angedeyen zu lassen. Allen Garten Liebhabern mich hiemit bestens empfehlend

Johann Heinrich Meyer.

**Abrus**, *Alp. Ægypt.* 40. t. 40. *Linn. hort.* 488.

**Abutilon**, *Avicen: H. Eyst.* Sida *Linn. hort.* 346. no. 4.

**Acacia Ægyptiaca**, *Dalech. hist.* 160. *Mimosa spinis geminatis distinctis, foliis duplicato pinnatis, partialibus utrinque duobus.* *Linn. hort.* 209. n. 5.

— altera vera s. spina mercatensis vel arabica, *Plukn. alm.* 3. t. 251. f. 1. *Mimosa spinis geminatis, foliis duplicato pinnatis.* *Lin. hort.* 209. n. 10.

— americana, abrus folio, triacanthos. *Plukn. mantissa.*

— similis; afra arbor, foliis myrti aculeatis, splendentibus pinnatis, absque impari extremo, flore coccineo, tetrapetaloides. *Bærb. lugdh.* II. 57. *Guilandinoides.* *Lin. hort.* 489. n. 4.

— gloriosa insulæ Jamaicensis foliis minoribus &c. *Plukn. almag.* n. 5. *Flowerfence Sloane.* It. Jam. II. 49. *Crista Pavonis.*

**Acajou**; *Tourn. Inst.* 658. **Anacardium**, *Lin. hort.* 61. *The Cuscheu Tree.*

**Aconitum americanum** v. *Rudbeckia.*

**Acriviola**, *Bærb. lugdh.* I. 244. **Trophæolum** *Lin. hort.* 143. n. 2.

— maxima adorata, *Bærb. lugdh.* I. 244. **Cardaminum** ampliori folio & majori flore *Tourn. Inst.* 430. **Trophæolum** 1. *Lin. hort.* 143.

— flore pleno altera, *Lochneri.*

**Adhatoda Zeylanensium. *Bærb. Lugdh. app.* 642. **Justicia** foliis ovato-lanceolatis, spicis foliosis, florum galea concava; *Lin. hort.* 9. n. 1.**

**Æschinomene** v. *Mimosa.*

**Ageratum**, foliis serratis, *Baub. pin.* **Carelia americana**, lamii folio. *Pont. diss.* 184.

**Alaternus celastris** folio exluteo variegato. *H. R. Par.*

**Alcæa** v. *Ketmia.*

- Alkekengi indicum, minimum, fructu virescente. *Tourn. Inst.* 151. *Physalis annua ramosissima, pedunculis fructiferis petiolo longioribus. Lin. hort.* 62.
- Aloe folio in oblongum aculeum exeunte. *Bauh. pinn. americana maxima.*
- americana *Juccæ* foliis arborefcens, *Kigel. Cat. Beaum. comm. prælud.* 64. *Jucca arborefcens, foliis rigidioribus, rectis ferratis Dill. Eth. II.* 435.
- afric. caulescens, foliis magnis glaucis, caulem amplectentibus & in mucronem obtusorem exeuntibus. *Comm. præl.* 68. & rar. 44.
- — folio variegato, margine luteo, in aculeum rigidum exeunte.
- — caulescens perfoliata, glauca & non spinosa *comm. præl.* 74.
- — humilis, spinis inermibus & verrucis obsita. *Comm. præl.* 77. & rar. 45.
- — afra, humilis, arachanoidæa. *Comm. præl.* 78.
- — humilis foliis ex albo & viridi variegatis. *Comm. præl.* 79. & rar. 47.
- — erecta, rotunda, folio parvo & in mucronem rigidissimum exeunte. *Comm. præl.* 83.
- Guineensis, radice geniculata, foliis ex viridi & atro undulatim variegatis. *Comm. præl.* 84.
- Zeylanica pumila, foliis variegatis. *Par. Bat. prodr.*
- Succotrina vera, angustifolia, spinosa, flore purpureo. *Comm. hort.* Aloe vera minor *Aloedar, muntingii* 20.
- vulgaris, *Bauh. pin.*
- afric. brevissimo crassissimoque folio, flore subviridi, *Comm. hort. II.* 6.
- — margaritifera major, folio in summitate triangulari, flore subviridi. *Comm. hort.*

Aloe afric. margariti fera minor, *Comm. hort.*

— — caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis, *Comm. hort. II. 5.*

— — flore rubro, folio plicatili, latiori, graminei coloris, verrucis ab utraque parte albicantibus notato.

— — profunde glauca, foliis in margine dense obtuse dentatis, interna & externa parte leviter verrucosis.

— — caulescens, foliis glaucis, pro margine & dorsi parte superiore dentatis, in mucrone spinis binis ternisque albis, notatis.

— — caulescens, foliis profunde glaucis, crassis, margine & in dorsi rotundati summitate spinosa.

— — flore rubro, folio triangulari & verrucis ab utraque albicantibus notato. *Comm. hort. II. 9.*

— — caulescens, foliis minus glaucis in margine & dorsi parte superiore spinis rubicundis.

— — An? africana caulescens, perfoliata, angustiori spinosissimo folio, *Barb. lugdh.*

— quæ Iris uvariæ flore luteo, *Breyn. prodr. 2. p. 59.*

Aloe foliis linearibus, triangularibus, radicatis, membranaceis, longissimis, *Lin. hort. 133. n.*

14. Aloe afr. ead. sed omni parte longe major, & lætius, seminifera. *Barb. lugd. Lin. in add. horti.*

Alfine, foliis cordatis, floribus pentagynis. *Lin. hort.*

Amaranthus tricolor; *H. Eyst.*

— thi spicati, cristati, serici, differentię forte omnes.

— tho affinis, altera species Indiæ orientalis, floribus glomeratis Ocymoidis folio. *Comm. hort. I.*

85. floribus purpureis, *Breyn. Cent. 109* — floribus albis; Gomphræna caule recto, foliis ovato lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculatis, diphyllis, *Lin. hort. 86. n. 1.*

*Amaranthus* arborefcens dicta, arbor Virginiana;  
*Catal. Harlem.* flores nondum tulit,

— — baccifer, Circææ foliis, *Comm. hort.* I.  
 127. Rivinia *Lin.* hort. 35,

*Amaryllis* v. *Lyllo-Narciffus.*

*Amomum* v. *Zingiber.*

— — Plinii, vulgo Pseudo Capficum, *Dod.* 718. So-  
 lanum caule inermi fruticofolo, foliis ovato lanceo-  
 latis, angulofe dentatis, *Lin.* hort. 61. n. 6.

*Amorpha*; *Lin.* hort. 353. n. 1.

*Amygdalus* v. *Persica.*

*Anacampferos* v. *Portulaca.*

*Ananas* aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea  
 — — *Plum.* t. 652. Bromelia *Lin.* hort. 229.

— — fructu ovato, carne flavicante.

— — fructu ovato, carne albida.

*Ananas Sylveftris* braziliana, Kerbita vulgo; *Par. Bat.*  
 prodr.

*Androfæce*, foliis lanceolato-ovatis, dentatis, caly-  
 cibus corolla longioribus.

*Anemone*; egregiæ varietates.

*Anemonospermos* afra, folio Jacobææ tenuiter laci-  
 niato, flore aurantio, pulcherrimo, *Bærb. lugdh.*

I. 100, - *Arctotis* foliis pinnato finuatis, laciniis  
 oblongis, dentatis, *Lin.* hort. 412, n. 3.

*Anguria*, Cucumis, Curullus *Dod.* pempt. 664. Cu-  
 curbita feminum margine bafi dilatato, *Lin.* hort.  
 452. n. 8.

*Ant-Euphorbium* v. *Kleinia.*

*Apios* americana, *Bærb.* lugdh. II. 53. *Astragalus* tu-  
 berofus scandens fraxini folio, *Tourn.* Inf. 415.

*Glycine* radice tuberofa, *Lin.* hort. 361. n. 1. vir-  
 giniana.

*Aponynum*, v. *Periploca.*

*Aquifolium*, foliis ex luteo variegatis, *H. R. Par.*

Arbor



Arbor vitæ f. Thuya, *Tourn.*

Arbutus arbor, folio serrato, *Baub.* pin.

Arctotis v. *Anemonospermus.*

Aronia v. *Mespilus.*

Asclepias africana, aizoides, *Tourn. Inst.* 94. Stapelia denticulis ramorum extrorsum prominentibus.

*Lin. hort.* 77. n. 1. & denticulis ramorum erectis.

— — — flore pulchre fimbriato, *Comm.* rar. 19. Stapelia *Lin. hort.* n. 2.

Arum ægyptiacum, *Dod. pent.* 328. Colocasia ægyptiaca florida; *Alp. ægypt.* 48, t. 15. Arum acaule foliis peltatis ovatis, basi semi bifidis, margine repandis. *Lin. hort.* 435. n. 4.

— caule puniceo - Colocasia, quod arum Zeylanicum, minus; *Par. Bat.* 77. Arum Zeylanicum minus cauliculis nigricantibus, foliis Colocasiæ similibus *Comm. hort.*

Asparagus aculeatus, spinis horridus. *Baub.* pin.

Aster serotinus ramosus alter, flore purpurascente.

*Tourn. Inst.* 1. Flore albo; & plures.

— foliis ovato-oblongis alternis sessilibus, corymbo terminatrici, calycibus patulis subrotundis. *Lin. hort.* 408. no. 14.

Astragalus v. *Apios.*

Auriculæ ursi v. *Primula.*

Azarola v. *Mespilus.*

## B.

**B**alsamina, floribus simplicibus & plenis — Impatiens, *Lin. hort.*

Bamia v. *Ketmia.*

Barba Jovis pulchre lucens. *J. B.*

Belladonna v. *Lilio-Narcissus.*

Benzoin; *Barb.* lugdh. Arbor virginiana citrii vel Limonia

- monia folio, benzoinum fundens; *Comm. hort.* I. 189. Laurus foliis enervibus obverse ovatis, utrinque acutis, integris, annuis. *Lin. hort.* 154. no. 2.
- Berberis latissimo folio Canadensis. *Lin. hort.* 122.
- Bignonia americana fraxini folio, flore amplo, phœniceo. *Tourn. Inst.* 164. Bignonia foliis pinnatis, foliolis incisus geniculis radiatis. *Lin. hort.* 317. n. 4.
- Bixa v. *Mitella*.
- Boerhavia, foliis ovatis. *Lin. hort.* floribus rubris.
- Bromelia v. *Ananas*.
- Bupleurum, foliis ovatis, perfoliatis. *Lin. hort.*

## C.

- Cactus quatuordecim-angularis subrotundus, *Lin. hort.* 181. no. 2. Melocactus Indiae occidentalis. *Bauh. pin.* 384. - Echinomelocactus major non lactescens, costis rectis, *Plukn. alm.* 148.
- subrotundus, tectis tuberculis ovatis, barbatis, *Lin. hort.* 28. n. 0. Echinomelocactus minor lactescens absque tomento, cylindris strictioribus. *Par. Bat.* 135. v. *Cereus*.
- Cacalanthemum v. *Kleinia*.
- Cassé; Jasminum arabicum lauri folio, cujus semen apud nos Cassé dicitur. *Jussieu mem.* 1713. p. 292. Epoca Cassé Gedanensis in horto Kleiniano an. 1721.
- Camphorifera arbor japonica, foliis laurinis, fructu globoso, calyce brevissimo. *Breyn. prodr.* 2. & Centuria. Laurus foliis ovatis, utrinque acuminatis, trinerviis, nitidis, petiolis laxis. *Lin. hort.* 154. n. 5. Epoca an. 1721. arbor procera & robusta.
- Canna indica rubra. *H. Eyst.*
- Capparis inermis foliis ovalibus, alternis, perennantibus

tibus, *Linn. hort.* 204. *Cynophallophoros* Caribearum. *Pulkn. alm.* 126. T. 172. f. 4.

*Capficum*; plurimæ differentiæ.

*Cardiospermum*; *Linn. hort.*

*Cariophylli Sinenfis*, five *Dianthi 4ti* *Lin. hort.* 164. varietates; no. 6. & varietas.  $\beta$ .

*Carelia* v. *Ageratum*.

*Cassia calycibus acutis*, floribus pentandris; *Linn. hort.* 497. no. 13.

— five sena americana foliis emarginatis inverse ovatis, amplissimis.

*Cedrus virginiana*, vulgo; *Juniperus Virginiana* *Barb. lugdh.*

*Cerasus* v. *Lauro-cerasus*.

— sylvestris virginiana; ossiculis minimis.

*Ceratonia* *Dod.* siliqua edulis.

*Cereus peruvianus erectus maximus*, spinis fuscis, flore purpurascente.

— quadrangularis erectus, costis alarum instar assurgentibus. *Barb. lugdh.*

— scandens minor polygonus, articulatus. *Par. Bat.*

— erectus, gracilior, spinosissimus, spinis albis, polygonus. *Barb. lugdh.*

— erectus, gracilis, teres, spinosissimus, spinulis albis, stellularum forma radiantibus.

— scandens, minor, trigonus, articulatus, fructu suavissimo *Herm. parod.* 118. *Cactus triangularis*, scandens articulatus. *Linn. hort.* 182.

— articulatus, minor, lucidus, ex viridi & luteo variegatus.

— scolopendri folio, brachiato. *Dill. Elth.* 73. t. 64.

*Cerithe*, foliis ovatis, perfoliatis. *Lin. hort.*

*Chrysanthemum* v. *Rudbeckia*. *Leucanthemum*.

*Chamærops* v. *Palma*.

*Cinnamomum* v. *Laurus*.

Cineraria v. *Jacobæa*.

Cistus, caule procumbente, foliis alternis; *Linn. act. Suec.*  
 Clusia; *Linn. hort.* 431. & app. no. 500. Frutex æthi-  
 opicus portulacæ folio, flore ex albo virescente,  
*Comm. hort. I.* 177.

Colchicum, flore pleno; flore simplici.

Colocasia v. *Arum*.

Commelina, foliis ovato-lanceolatis, caule erectiuscu-  
 lo scabro, petalis duobus majoribus, *Linn. hort.*  
 495. Commelina erecta, ampliore subcæruleo flo-  
 re *Dill. Elth.* 91. t. 77. f. 88; virginiana.

— procumbens, flore luteo; *van Royen Prodr.* p.  
 538. Capituli bonæ spei.

— radice perenni foliis lanceolatis, caule repente,  
 glabro, petalis duobus majoribus.

Conium, feminibus aculeatis, *Linn. hort.*

Consolida regalis s. Delphinium, *Linn. hort.* 213.

Convolvulus, calycibus tuberculatis, pilosis, *Linn. virg.*

— foliis lanceolato ovatis, caule declinato, floribus  
 salutaris, *Linn. virg.*

— sive quamoclit foliis cordatis. v. *Quamoclit.* & plu-  
 res *convolvuli* præstantiores.

Conyza africana tenuifolia, subfrutescens, flore aureo,  
*Dill. Elth.* p. 104. f. 103.

Coral arbor, *Clus. Hist.* 2. p. 253. *Comm. hort. I.* 211.

Erythrina foliis ternatis, caule spinoso, *Linn. hort.*  
 354. n. 2.

— an, Coral arbor polyphylla non spinosa, fraxini  
 folio, siliqua alis foliaceis extantibus &c. Dogwood  
 Tree *Sloane II.* t. 176.

— an, arbor coral affinis non spinosa, fraxini folio  
 rotundioræ foliis ex ramis pubescentibus; *Sloane tab.*  
 178.

— arbor Carolinensis, hastato folio, *Petiv. hort.*  
 106. *Dill. Elth.* 107. t. 9. f. 106. Erythrina foliis

terna-

ternatis, caule simplicissimo, inermi. *Linn. hort.*  
354. n. 1.

Corona folis v. *Rudbeckia*.

Coriandrum fructibus digynis. *Linn. hort.*

Cotyledon major arborescens, atra, foliis orbiculatis,  
glaucis, limbo purpureo & maculis viridibus nota-  
tis; *Barb. lugdh.* Cotyledon foliis subrotundis,  
planis, integerrimis, *Linn. hort.* 176. no. 2.  $\beta$ .

— afra, folio crasso, lato, laciniato, flosculo aureo.  
*Barb. lugdh.* Cotyledon foliis laciniatis. *Linn.*  
*hort.* 175. n. 1.

— capensis semilobato folio. *Dill. Elth.* 113.

— afra arborescens, foliis glaucis oblongioribus.  
*Barb. lugdh.*

— afra frutescens, foliis longis, retusis, depressis &  
cruciatis, fore luteo.

Cupressus foliis imbricatis. *Linn. hort.* 449.

Crucianella, foliis linearibus. *Linn. hort.*

Cyclamen aleppicum, flore albo, basi purpurea, odo-  
rato. *H. R. Par.*

— flore carneo, basi purpurea odorato. *H. R. Par.*

— flore toto albo. *J. Barb.*

Cynophallophoros v. *Capparis*.

Cynaglossum, foliis lanceolatis, corollis calyce duplo  
longioribus. *Roy. Leyd.*

Cytisus v. *Laburnum*.

## D.

**D**aphne v. *Laureola*.

Datyna, datura pericarpis nutantibus globosis. —  
flore albo, violaceo, simplici, duplici triplicive,  
*Linn. hort.* 55. *Stramonium* fructu spinoso ro-  
tundo flore albo & violaceo simplici & pleno, *Tour-  
nesf.*



Del-

Delphinium v. *Consolida*.

Dictamnus creticus. *Baub.* pin. 222. Origanum creticum latifolium tomentosum, seu dictamnus creticus, *Tourn. Inst.* 199.

Draco arbor v. *Palma*.

## E.

**E**chinomelocatus vid. *Cactus*.

Echium, caule ramoso, foliis caulino ovatis, floribus solitariis, lateralibus. *Linn. hort.*

Elacalli v. *Tithymalus*.

Eryngium foliis radicalibus oblongis, incisus, caule dichotomo, floribus sessilibus. *Linn. hort.*

Erythrina v. *Coral*.

Eugenia; *Mich. nova pl. gen.* 226. t. 108. Myrtoides foliis ovatis, *Linn. hort.* 489. no. 8.

Euphorbium verum antiquorum Scadida-Calli *hort. maleb.* I. 23. II. 42.

— afrum polygonum, spinosum caule tuberibus ornato, *Barb. lugdh.*

— afrum caule squamoso, tuberoso, minus *H. Beaum.*

— afrum, caule crasso squamoso in capitis medusæ speciem cincto. *Barb. lugdh.* I. 258. Euphorbia inermis tecta tuberculis imbricatis, foliolo linearis instructis, *Linn. hort.* 197. no. 6.

— aculeata nuda, multangularis, aculeis geminatis *Linn. hort.* 196. no. 5.

v. *Tithymalus. Kleinia.*

## F.

**F**erula, foliis pinnatifidis, pinnis linearibus, planis trifidis. *Linn. hort.*

Ficoides africana, frutescens, folio tumido, extremitate stellata, flore purpureo. *Bradley succul.* I. p.

6. t. 5. Mesembryanthemum foliis apice barbatis,  
*Linn. hort.*

**Ficoides capensis**, humilis, folio tereti, pilis in extre-  
mitate stellatis, fl. purpureo. *Bradl. II. p. 6. t. 5.*

— — foliis teretibus confertis, glaucis, flore  
albo. *Bradl. I. p. 7. t. 6.*

— — Mesembryanthemum perfoliatum, foliis  
majoribus triacanthis, *Dill. Elth. II. p. 251. f. 240.*

— — Mesembryanthemum, foliis minoribus  
diacanthis. *Dill. Elth. f. 239.*

— — deltoides, dorso & lateribus murica-  
tis, majus, *Dill. Elth. I. p. 254. f. 245. pag. 256. f. 247.*

— — Acinaciforme, flore amplissimo pur-  
pureo, *Dill. Elth. I. p. 282. f. 270.*

— — falcatum majus, flore purpureo me-  
diocri *Dill. Elth. p. 284. f. 273.*

— — frutescens folio purpureo rariore.  
*Dill. Elth. p. 279. f. 268.*

— — foliis corniculatis, brevioribus, *Dill.*  
*Elth. p. 261. f. 252.*

— — tenuifolium, procumbens, flore  
coccineo, *Dill. Elth. p. 266. f. 256.*

— — foliis verruculi-  
formibus, floribus  
melius umbellatis, *Dill. Elth. p. 268. f. 259.*

— — nocti florum, fl. intus caudido, ex-  
tus stramineo, odoratissimo, *Dill. Elth. p. 273. f. 263.*

— — foliis verruculi formibus humilior  
quam p. 268. f. 259.

— — crystallinum, plantaginis folio, un-  
dulato, *Dill. Elth. p. 232. f. 221.*

**Ficus benghalensis**, folio subrotundo, fructu orbicula-  
to *Comm. hort. arbor procera.*

— indica f. *Opuntia maxima*, folio spinoso, longissi-  
mo & latissimo, *H. ludgh.*

— — folio oblongo medio. *H. R. Par.*

Ficus

*Ficus indica* folio spinoso, fructu majore, *Bauh. pin.*

— *curassavica minima*, *Hort. Baum.*

*Flos cardinalis*, *Menz. Lex.*

— *passionis v. Passiflora.*

*Fritillaria*, *Linn. hort. 119. no. 1.*

— *Linn. hort. 119. no. 2. Liliium perficum*, *Bauh.*  
& plures.

## G.

**G**enista v. *Spartium.*

*Gentiana*, floribus lateralibus, confertis; pedunculatis, corollis rotatis, *Linn. hort.*

*Geranium* afric. noctu olens, radice tuberosa, foliis angustioribus & latioribus, *Breyn. Cent. 126. t. 58.*

— arborefcens, malvæ folio plano, lucido, flore elegantissimo Kermesino *Bærb. lugdh. I. p. 162.*

— folio althææ flore coccineo fulgidissimo. *Bærb. lugdh. I. p. 264.*

— foliis tenuiter incisif, floribus carnelis, striis purpureis.

— afric. *Alchymilla* hirsuto folio, floribus albidis.

— afr. folio althææ, odore melissæ. *H. Lugd.*

— afr. folio malvæ crasso, molli, odoratissimo flosculo pentapetalo albo. *Bærb. lugdh.*

— humile foliis trilobatis incisif flore cæruleo.

— folio variegato; & plura.

*Glycine* v. *Apios.*

*Gomphrena* v. *Amaranthus.*

*Gossypium* herbaceum f. *Xylon. J. B. I. p. 343.*

— frutescens semine albo, *Bauh. pin. 430. Gossypium brasiliantum* flore flavo. *Sloane fl. 156.*

*Granadilla* v. *Passiflora.*

*Guajava* alba dulcis. *Comm. hort. I. 121. t. 63. Psidium*  
*Linn. hort. 184.*

— alba acida, fructu rotundiori. *Plukn. alm. 181. t. 193. f. 4.*

H. Hæ-



**H**æmanthus foliis lanceolatis; *Linn. hort.* 127. no. 2.  
 Hyacintho affinis africana bulbosa radice, caule  
 elegantissime maculato, foliis Colchici latissimi,  
 floribus coccineis hexapetalis umbellatis. *Seba. Th.*  
*I. 4. t. 12. f. 12. 13.*

**Hedysarum** v. *Mimosa*.

— clypeatum flore suaviter rubente, *Bærh. lugdh.*  
*II. 51.* — flore albido *Tourn. 401.* Hedysarum  
 foliis pinnatis leguminibus articulatis, aculeatis.  
*Linn. hort.* 365. no. 2.

**Hepatica** fl. pl. cæruleo - purpureo - albo.

**Heleborus** hortensis.

**Hibiscus** v. *Ketmia*.

**Horminum** syriacum glutinosum, æthiopidis folio, *H.*  
*Maurocc.* Salvia foliis oblongo - cordatis, margine  
 serrato - crenatis, floralibus calyce longioribus;  
*Linn. Hort.* 12. no. 6.

**Hyacinthus** v. *Hæmanthus*. *Lyllo - Narcissus*.

— africanus, tuberosus, flore cæruleo umbellato,  
*Breyn. prodr. II. p. 39; Comm. hort. 2. p. 133.* Poly-  
 anthes floribus umbellatis, *Linn. hort.* 126. n. 2.

— indicus tuberosus, flore hyacinthi orientalis, *Bauh.*  
*pin. 47.* Polyanthes floribus alternis, *Linn. hort.*  
 126. no. 1.

— indicus tuberosus flore pleno; *Linn. hort.* 126.  
 no. 1. α.

— indicus tuberosus, foliorum limbis argenteis;  
*Krauss. cat. berol.*

— stellatus; *Scilla Linn. hort.* 123.

**Hyoſcyamus**, foliis lanceolatis. *Lin. hort.*

— foliis petiolatis, floribus sessilibus. *Linn. hort.*

**Hypericum** floribus trigynis, calicibus acutis, stamini-  
 bus petalo brevioribus, caule fruticoso, *Linn. hort.*  
 — floribus trigynis, calicibus acutis.



**J**acobæa maritima C. B. *pin.* 131. Cineraria *Dod.* 642.

Jalapa *Tourn.* Mirabilis. *Lin. hort.* 53. 54.

Jasminum v. *Cassé.*

— Hispanicum flore majore externe rubente *Bærb.* lugdh. 2. p. 216.

— vulgatus flore albo. *Bærb.*

— arabicum, foliis limonii conjugatis, flore albo duplici, oderatissimo. *Bærb.* Nyctanthes caule volubili, foliis subovatis acutis. *Lin. hort.* 5.

— azoricum trifoliatum, flore albo odoratissimum, *Comm. hort.* I. p. 159. Jasminum foliis oppositis ternatis, *Lin. hort.* 5. n. 2.

— indicum flavum odoratissimum, *Ferr. cult.* 393. Jasminum foliis alternis ternatis, obtusis, *Lin. hort.* 5. n. 4.

— humile luteum, *Bærb.* lugdh. 2. p. 216. Jasminum foliis alternis ternatis, acuminatis, *Lin. hort.* 6. no. 5.

Impatiens v. *Balsamina.*

Ipomœa v. *Quamoclit.*

Iris fusiana; Iris chalcedonica latifolia, *Hort. Eyff.*

— fativa lutea; & *phures.*

Juniperus; v. *Cedrus.*

Justicia v. *Adhatoda.*

## K.

**K**etmia, folio manihot serrato, flore amplo sulphureo. *Dill. Elth.* 189. t. 156. f. 189. Hibiscus foliis palmato digitatis septempartitis, *Lin. hort.* 350. no. 5.

— indica, vitis folio, parvo flore, *Tourn.* 100. Alcea indica parvo flore *Bauh. pin.* 317.

— Ægyptiaca, semine moschato, Abelmofch dicta. *Park. Th.* 303. Bamia moschata *Alp. exot.* p. 106.

Klei-

*Kleinia*, foliis lanceolatis, caule laevi ventricoso *Lin.*  
hort. 395. n. 1. *Cacalanthemum* folio *Nerii* glau-  
co. *Dill. Elth.* 61. t. 54. f. 62.

— foliis carnosis planis, ovato-oblongis *Lin.* hort.  
395. n. 4. *Anteuphorbium* *Dodon.* pempt. 378.  
*Euphorbium* 12. *Bærh.* lughd. 1. p. 259.

— foliis sagittatis dentatis.

## L.

**L**aburnum, arbor trifolia, anagyridi similis. *J. B.* 1.  
p. 361. *Cytisus* foliis ovato-oblongis, racemis sim-  
plicibus pendulis. *Lin.* hort. 354. n. 1.

*Lapathum* præstantissimum, *Rhabarbarum* officinarum  
dictum. *Moriss.* 2. p. 577. *Rheum* *Lin.* hort. 155.

— f. *Rhabarbarum* monachorum; differentias vid.  
*Lin.* hort. 155.

*Lavendula* foliis dissectis. *Baub.* pin. 216. *Comm.* rar.  
27. t. 27. *Lin.* hort. 303.

— v. *Stoechas*.

*Laureola* semper virens flore viridi, quibusdam *laureola*  
*mas*, *Baub.* pin. 462. *Thymelæa* *laurifolia* semper  
virens, seu *laureola mas*. *Tournf.* 595. *Daphne*  
*Lin.* hort. 147. no. 1. floribus racemosis laterali-  
bus, foliis lanceolatis integris (fructu nigro) —  
(fructu rubro).

*Lauro-Cerasus*, *Clus.* hist. I. p. 420. *Padus* foliis sem-  
per virentibus, lanceolato ovatis. *Lin.* hort. 185.  
n. 2.

*Laurus* v. *Benzoin*. *Camphorifera* arbor.

— *Indica*, *Aldini* farn. 61. *Cinnamomum* *sylvestre*  
*americanum*. *Seba.* th. 2. p. 90. t. 84.

— *vulgaris*, *Baub.* pin.

— folio elegantissime variegato. *Bærh.* lughd.

— *tinus* f. *Sylvestris*. *Tinus* *Lin.* hort. 109.

— *Alexandrina vera*, *Barr.* rar. t. 250. *Ruscus* 2.

B 2 *Lin.*

*Lin. hort.* 465. — *Ruscus lati folius* sive *laurus alexandrina* fructu in medio foliorum extra pendente, *Dill. Elth.* t. 251 - p. 223. f. 323. — *Ruscus foliis supine floriferis sub foliolo*, *Linn. hort.* 466. no. 3.

**Leonurus**, capituli bonæ spei, *Breyn. Cent.* 171. t. 8. 6. — *americanus nepetæ folio*, flore phæniceo minore, *Breyn. prodr.* 2. p. 62. *Leonurus foliis ovatis, calycibus decagonis septemdentatis inæqualibus*, *Linn. hort.* 312. no. 2.

**Leucanthemum canariense**, foliis chrysanthemum, pyrethri sapore, *Tourn. Inst.* 666. *Chrysanthemum fruticosum foliis linearibus dentato trifidis*, *Linn. hort.* 417. no. 5.

**Ligustrum**, foliis duplicato ternatis. *Linn. hort.*

**Lilio-Narcissus polyanthos**, flore incarnato, fundo ex luteo albescente, *Bærb. lugdh.* 2. p. 14. *Amaryllis spatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, genitalibus declinatis*, *Linn. hort.* 135. no. 2. *Lilium americanum, puniceo flore, bella Donna dictum. Herm. parad.* 194.

— *indicum, flore albo exterius rubente. Tourn.* 372. *Lilium indicum; narcissinis foliis, monanthonem, ex albo rubrum; H. L. Bat.* 374.

**Lilium persicum** v. *Fritillaria.*

**Luffa arabum** *Tourn. act.* 1706.

**Lycopersicon**; fructu albo-luteo-rubro; sive solanum *Lin. hort.* 60. no. 1. vulgo, poma amoris.

**Lycopsis**, foliis lanceolatis; calycibus fructuum pendulis. *Linn. hort.*

## M.

**Magnolia**, foliis ovato lanceolatis. *Linn. hort.* 272. *Magnolia altissima flore ingenti candido. The Laurel Tree of Carolina. Catesb. II. p. 61. an, the umbrella Tree? Catesb. II. 80. Magnol-*

Magnolia, Lauri folio subtus albicante; The Sweet  
flowring Bay. Laurier à fleur odorante. *Catesb. I.*  
39. *Dill. Elth. 207. t. 168. f. 205*; cono minori.

Malva arborefcens. *H. Eyst.*

— foliis subcordatis, laciniatis, glabris, caule ar-  
boreo. *Linn. hort. 347. no. 3.* Malva capensis,  
frutescens; grossulariæ folio minori glabro, *Dill.*  
*Elth. 208. t. 169. f. 206.*

Mala infana v. *Melonga<sup>en</sup>.*

Malus punica v. *Punica.*

Marum syriacum & creticum. *Bærb. lugdb.* Teucrium  
foliis ovatis utrinque acutis integerrimis, floribus  
solitariis spicatum digestis. *Lin. hort. 303. no. 15.*

Medicago leguminibus lunulatis margine integerrimis,  
caule frutescente, *Lin. hort. 377. m. 6. & aliæ*  
*species.*

Melocactus v. *Cactus.*

Melongena s. Solanum pomiferum instar mali rotundi  
albi — oblongi — violacei, *Tourn. Baub. pin.*  
Mala infana, *Dod. pent. 458.*

Mesembryanthemum v. *Ficoides.*

Mespilus apii folio laciniato. *Baub. pin.* Azarolos *Casalp.*  
*syft. 100.* Cratægus foliis obtusis bis trifidis, *Lin.*  
*hort. 188. no. 4. β.*

Mimosa s. *Æschynomene spinosa* tertia sive foliolis aca-  
ciæ angustioribus, siliquis parvis echinatis, *Breyn.*  
*Cent. p. 40.*

— (americana) inermis foliis duplicato pinnatis,  
siliquis linearibus glabris, *Linn. hort. 209. no. 8.*

— de Mississipi, semen a *Dn. Collinson.* in altitudinem  
7' excrefcens.

— surinamensis, tenui acaciæ folio, siliqua nigra,  
glabra articulata, semine nigro, longo, *Breyn.*  
*Cent. 48.* Mimosa spuria de Pernambuco, dicta  
mimosa italica, *Zanoni.*

v. *Acacia.*

B 3

Mira-

Mirabilis v. *Falapa*.

Mitella americana maxima tinctoria, *Tourn.* 242. Orleansa seu Orellana folliculis lappaceis, *Comm. hort.* 1. p. 65. t. 33. Bixa *Lin. hort.* 211.

Momordica zeylanica, pampinea fronde, fructu breviori, *Tournef.*

Morus fructu albo humilior, profundius laciniata. *C. B. p.*

— fructu nigro *C. B. p.* 459.

Musa fructu cucumerino, longiori, *Plum.* 24. Palma humilis longis latisque foliis, *Baub. pin.* Epocha horti *Klein.* 1724.

Myrtus Zeylanica v. *Eugenia*.

— communis italica,

— minor vulgaris.

— balsamica foliis mali granati,

— folio buxi.

— angustifolia batica,

— foliis roris marini.

— foliis mucronatis ex alb. & viridi variegatis flosculis rubro candidis,

## N.

**N**asturtium indicum flore variegato, pleno sive Acrixiola fl. pl. altera, *Lochneri.* Trophæolum *Lin.* hort. 142.

Nerion, floribus rubentibus. *B. Pin.*

— floribus albis. *B. Pin.*

— indicum angustifolium, floribus odoratis simplicibus (carneis) *Herm. lugdh.*

— indicum latifolium flore variegato pleno. *Comm. hort.*

Nuxjuglans virginiana nigra; *H. L.*

Nyctanthes v. *Jasminum*.

Oenan-

**Oenanthe**, flosculis radiantibus umbellarum pro-  
liferis. *Lin. hort.*

**Oenothera**, foliis lineari-lanceolatis, undulatis. *Linn.*  
virg.

**Olea fativa**, *B. Pin.* Olea foliis lanceolatis ramis tere-  
tiusculis. *Linn. hort. no. 7.*

**Orleana** v. *Mitella.*

**Ornithopus**, foliis ternatis, fere sessilibus, appendi-  
culatis; impari maximo. *Linn. hort.*

## P.

**Padus** v. *Lauro-Cesarus.*

**Paliurus**, *Dod. pempt. 756.* Rhamnus foliis trigynis  
aculeis geminatis, altero inferiori reflexo, *Linn.*  
*hort. 69. no. 1.*

**Palma** v. *Musa.*

**Palma dactylifera.** *Plum. n. pl. gen. 1. 2.* Palma vul-  
garis. *J. B.*

**Palma s. Draco arbor**, *Clusii.*

**Papaver orientale hirsutissimum**, flore magno; *Com-  
mel. rar. 34.*

**Passiflora** foliis palmatis quinque partitis integerrimis,  
involucris cordatis triphyllis, *Linn. hort. 432.*  
*no. 6.*

— foliis semitrifidis, ferratis, basi duabus glandu-  
lis convexis; lobis ovatis, *Linn. hort. 432. n. 7.*  
**Granadilla triphyllis** flore roseo. *Berb. lugdh.*

— tres, quorum desiderantur flores.

**Periploca** foliis oblongis, *Tourn.* Apocynum sive pe-  
riplœca scandens folio oblongo, flore purpurascen-  
te *J. Baub.* Periploca foliis lanecolato ovatis *Lin.*  
*hort. 78. n. 1.*

Periploca flore viridi in medio purpurante.

Perfica nana burdegalensis. Amygdalus indica rara  
*Plukn. alm. 28. t. 11. f. 3.*

Perficaria orientalis, nicotianæ folio, calice florum  
purpureo; *Comm. rar.*

Phlomis fruticosa, salviæ folio latiore & rotundiore,  
*Tourn. 127.* Phlomis involucri radiis lanceolatis,  
villosis; *Lin. hort. 315. n. 3.*

Physalis v. *Alkekengi.*

— caule fruticoso, tereti; foliis ovatis integerrimis, floribus confertis. *Royen. Lugd.*

— annua ramosissima, ramis teretibus, pubescentibus, geniculis nodosis. *Linn. hort.*

— — ramis angulosis, glabris, foliis dentato serratis; *Lin. hort.*

Pinus sativa; *Baub. P.*

Polyanthes v. *Hyacinthus.*

Portulaca africana semper virens, flore rubicundo  
*Comm. hort.* Anacampseros foliis acuminatis *Linn. hort. 207.*

Primulæ *Lin. hort. f. auriculæ ursi, elegantissimæ.*

Prunus maritima racemosa, folio rotundo glabro, fructu minore purpureo. The mangrove Grape-Tree, *Sloane voy. t. 220. tom. II. p. 129. Catesby II. p. 96, ibi optima figura raræ hujus plantæ.*

Psidium v. *Guajava.*

Ptelea virginiana. *Linn. hort.*

Punica flore pleno majore; *Lin. hort.*

## Q

Quamoclit americana hederæ folio, flore coccineo  
*Comm. rar. 21.* Ipomæa foliis cordatis acuminatis vix dentatis, *Linn. hort. 66. no. 2.*

— Ipomæa foliis linearibus pinnatis floribus solitariis. *Linn. hort. 66. n. 1.*

R. Rha-



## R.

- R**habarbarum v. *Lapathum*.  
 Ricini varii.  
 Rivinia v. *Amaranthus*.  
 Royena v. *Staphyloendron*.  
 Rudbeckia foliis compositis, *Linn. hort.* 420. Corona folis foliis amplioribus laciniatis. *Tourn.* 490.  
 Chrysanthemum americanum perenne &c. *Morrison*.  
 Rudbeckia altera.  
 Rhus v. *Sumach*. *J. B.*  
 Ruellia foliis petiolatis, fructu sessili conferto. *Linn. hort.*

## S.

- S**alvia africana frutescens folio subrotundo glauco flore aureo magno. *Comm. hort.* 2. 183.  
 v. *Horminum*.  
 Sapindus, *Linn. hort.* 152. Soap-Berry *Plykn. alm.* 255. t. 217. Nuci prunifera arbor americana fructu saponario; orbiculato monococco nigro.  
 Scadida Calli v. *Euphorbium*.  
 Scherardia; *Dill. gen. flosculis rubris*.  
 Sclarea v. *Horminum*.  
 Scilla v. *Hyacinthus*.  
 Sedum vulgare *Clusii*. Sempervivum tectorum majus,  
 — majus arborefcens. *J. Baub.*  
 — Canarium foliis omnium maximis; *Comm. hort.* 2. 95.  
 — minus teretiusculum album, *Baub. Pin.*  
 Senecio v. *Kleinia*.  
 Sena v. *Cassia*.

Sefeli, petiolis ramiferis, membranaceis; oblongis, integris; *Linn. hort.*

— petiolis ramiferis membranaceis, ventricosis emarginatis. *Linn. hort.*

Sida v. *Abutilon.*

— foliis subrotundo cordatis, acuminatis, crenatis. *Roy. lugdh.*

— foliis crenatis, inferioribus cordatis, obtusis, superioribus acuminatis. *Roy. lugdh.*

Solanum v. *Melongena. Lycopersicon. Anomum.*

— americanum tomentosum, folio verbasci parvo fructu flavescente. *Plum.*

— indicum pomiferum spinosum, boraginis flore, fructu croceo. *Herm. lugdh. 573.*

Spartium ramis oppositis teretibus versus apicem floriferis, foliis lanceobatis. *Linn. hort. 356. no. 1.*

Genista juncea. *J. Baub.*

— floribus luteis, plenis, odoratis.

Stachis foliis lanceolato ovatis, basi emarginatis, verticillis tomentosis, *Linn. hort. 410. no. 4.*

Stapelia v. *Asclepias.*

Staphylodendron africanum folio singulari lucido *Herm. Par. Bat. 232. t. 232. Royena foliis ovatis; Linn. hort. 149. no. 1.*

Stœchas arabica vulgo dicta *J. Baub.* Lavendula foliis lanceolatis linearibus, spica comosa, *Linn. hort. 303. n. 4.*

Stramonium v. *Datura.*

Swertia.

## T.

**T**agetes, caule subdiviso diffuso, *Linn. hort. 418.*

Tamariscus narbonensis, *Dalechamp. hist. 180.* Tamariscus maria floribus pentandris. *Linn. hort.*

Te-

*Telephium* foliis oblongo ovatis, racemis secundis terminatricibus. *Lin. hort.*

*Terebinthus* vulgaris mas. *Berh. lugdh. 2. 173.* Pistacia foliis impari pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis mas. *Linn. hort. 456. no. 2.*

*Teucrium* v. *Marum.*

*Thuya* f. arbor vitæ *Tourn.* Strobulis lævibus, squamis obtusis. *Lin. hort. 449. no. 1.*

*Thymelæa* v. *Laureola.*

*Tinus* v. *Laurus.*

*Tiru-Calli* v. *Tithymalus.*

*Tithymalus* arborefcens aizoides, spinosus, caulice angulari, foliis Nerii. *Comm. præl. 56. Comm. hort. I. 25.* *Ela Calli hort. malab. 2. f. 43.* *Euphorbia aculeata* seminuda, angulis obliquis tuberculatis. *Linn. hort. 196. no. 3.*

— ramosissimus, frutescens, pene aphyllus *Berh. lugd.* *Euphorbia inermis fructicosa* subnuda, filiformis erecta, ramis patulis determinate confertis. *Linn. hort. 307. no. 9.*

— aizoides triangularis & quadrangularis articulatus & spinosus ramis compressis *Commelin. præl. 21. & 55. t. 5.* *Euphorbia aculeata, triangularis, subnuda, articulata, ramis patentibus; Linn. hort. 196. no. 1. α. v. Euphorbium. no. 2.*

— — africanus simplici squamato caule *comm. prælud. 57. t. 7.* *Euphorbia inermis* tecta ruberculis imbricatis, foliolo lineari instructis, *Linn. hort. 197. no. 6. γ.*

— — fruticosus canariensis, aphyllus quadrangularis & quinquangularis, spinis geminis aduncis atro nitentibus armatus. *Comm. hort. I. t. 104.* *Euphorbia aculeata quadrangularis nuda, Lin. hort. 196. no. 2.*

— indicus frutescens. *Tiru-Calli, hort. malab. Comm. hort. I. 27. & 2. f. 44.* Tithy-

*Tithymalus erectus* caule tereti, foliis in summitate angustis longissimis.

— *maritimus anacampserotis folio*, in spinam brevissimam desinente.

*Tordylium*, involueris umbella longioribus. *Lim. hort.*

*Toxicodendron* foliis alatis, fructu purpureo, pyriformi sparso, *Catesb. I. 40. an*, *Scarles Rhus?*

— *an*, foliis alatis, fructu rhomboides. *Dill. Elth. 390. t. 292. f. 377. fœmina? Rhus foliis pinnaris integerrimis, Lim. hort. 110. no. 2. Poison Ash.*

*Tribulus*, foliis sex parium pinnatis. *Lim. hort.*

*Tulipifera*. *Arbor Tulipifera*. The Tulip Tree. *Catesb. I. p. 48. Arbor tulipifera virginiana tripartito acoris folio, medio lacinia velut abscissa. Pluk. Phyt. t. 117. & t. 248.*

## V.

**V**iburnum.

## Y.

**Y**ucca gloriosa.

v. *Aloe.*

## Z.

**Z**ingiber latifolium sylvestre. *Herm. lugdh. 636. 636. Amomum scapo nudo, spica oblonga, obtusa; Lim. hort. 3. no. 2.*

*Zygophyllum*, foliis sessilibus. *Lin. hort.*



A Collinsonio Londin:

9 Sept: 1748.

*Polypodium altissimum*; Sloane Jamaica

*Lilio-Narcissus, Guineensis*. f. sent by  
Charles Wager, first Lord of ye Ad-  
miralty from Cape-Coast Castle in  
Guinea; is a non descript.

*Lilio Narcissus polyanthos*, flore in-  
cano. Red Lillie vulgo. Mexico Lillie  
vulgo; vid Sloane II Jamaica.

Narciss of Japan; minor species of  
the Gurnsey Lillie. was broug  
from China; is a non descript.

*Lilio Narcissus, Tolabo dicta.*  
Talboon Lillie vulgo; vid. Sloan  
II. Jamaica.

Quinq *Lilio Narcissi* singulares  
Indiæ occidentalis in nomina  
48.

