

AFBEELDINGEN  
VAN  
Z E L D Z A A M E  
G E W A S S E N,  
DOOR  
NICOLAAS MEERBURGH,  
HORTULANUS VAN DEN KRUIDTUIN  
VAN 'SLANDS UNIVERSITEYT  
TE LEYDEN.



TE LEYDEN,  
BY JOHANNES LE MAIR,  
M D C C L X X V.

# ЧЕРНОГРДА

МАУ


СКАЗАНИЯ

ИЗДАВАЮЩИ

ПОДЯЛЯЮЩИ

НОВОГОДНЯИХ СЛАДОСТЕЙ

СВЯТОГО НАСЛАДИТЕЛЬСТВА ПОДАЮЩИ



## V O O R B E R I G T.

M Y, zeedert een' geruimen tyd, voor zo verre myn beroep toeliet, geoeffend hebbende in het afteeknen van alle Gewassen, welke my zeldsaam voorkwamen, en die ik door anderen niet of nauwlyks afgebeelt vond, oordeelde ik niet onnut te zyn, insgelyks te beproeven, of ik dezelen in plaat zoude kunnen brengen, en, met hunne natuurlyke Coleuren verciert, den Liefhebberen der Natuur en Kruidkunde mede deelen; hier toe wierd ik niet weinig aangespoord, dewyl de ondervinding my dagelyks leerde, hoe moeilyk het is, een groot getal Planten, tot hier toe niet algemeen bekend, van elkander en van anderen te onderscheiden, of schoon zy door den groten Linnæus, en anderen berouemde Kruidkundigen nauwkeurig beschreeven zyn, ten zy men de Beschryvingen met de Afbeeldingen vergelykt: bequaamer gelegenheid, dan ik daagelyks heb, kon zich ook niet opdoen, daar de Kruidtuin dezer Universiteyt, die voor geene andere in Europa behoeft te wyken, een groot getal Planten

## V O O R B E R I G T.

bevat, welke men in veele Tuinen vrugteloos zoude zoeken, en schoon door den Heere Linnæus, volgens de medegedeelde Beschryving van den Hooggeleerden Heere D. v. Royen, opgegeeven, egter nergens, zoo veel my bewust is, behoorlyk afgebeeld zyn.

Het eerste Tiental, welk ik nu den Kruidkundigen aanbiede, zal uitwyzen, hoe ik geslaagt ben in dit werk, alleen uit lust tot de Kruidkunde, en geenzins met eenig ander oogmerk, ondernoomen, terwyl ik hoop, zoo het zelve eenige goedkeuring mag wegdraagen, daar in van tyd tot tyd voorttegaan.

De naamen der Gewassen heb ik van Linnæus ontleent, en my op deszelvs Werken telkens beroepen: dus ben ik ook te werk gegaan met de Kappellen, welke ik op elke Plaat tot eenige Cieraad afgebeelt heb, en die alle uit myne Verzameling ontleent zyn.

## IASMINUM (Grandiflorum) TAB. I.

IASMINUM (*Grandiflorum*) foliis oppositis pinnatis; foliolis extimis confluentibus. Linn. Sp. pl. p 9.

IASMINUM (*Grandiflorum*) hispanicum magno flore externe rubente. Linn. Mantiss. II. 316.

## PAPILIO (Helenus) TAB. I.

PAPILIO (*Helenus*) alis caudatis nigris: posticis macula alba: subitus tribus albidis lunulisque septem ferrugineis. Linn. Syst. Nat. 745.

## HEDYOTIS (Herbacea) TAB. II.

HEDYOTIS (*Herbacea*) foliis linear-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. Linn. Sp. pl. pag. 147.

## PAPILIO (Polydamas) TAB. II.

PAPILIO (*Polydamas*) alis dentatis nigris fascia interrupta flava, posticis subitus maculis linearibus flexuosis rubris. Linn. Syst. Nat. 747.

## SALVIA (Paniculata) TAB. III.

SALVIA (*Paniculata*) foliis obovato-cuneiformibus denticulatis nudis, caule frutescente. Linn. Syst. Nat. (2) Mantiss. pag. 25.



PA-

**PAPILIO** (*Polydamas*) TAB. III.

**PAPILIO** (*Polydamas*) subtus conspecta; hujus alæ supra fascia lutea è maculis parallelis sagittatis; posticarum margo subtus maculis 7, linearibus, fluxuosis (3) Coccineis.

**COMMELINA** (*Africana*) TAB. IV.

**COMMELINA** (*Africana*) corollis inæqualibus, foliis lanceolatis glabris, caule decumbente. Linn. Sp. pl. p. 60.

**PAPILIO** (*Troilus*) TAB. IV.

**PAPILIO** (*Troilus*) alis caudatis nigris: primoribus punctis marginalibus pallidis; posticis subtus maculis fulvis. Linn. Syst. Nat. 747.

**HYOSCYAMUS** (*Physalodes*) TAB. V.

**HYOSCYAMUS** (*Physalodes*) foliis ovatis integerrimis, calycibus inflatis subglobosis. Linn. Sp. pl. p. 258.

**PAPILIO** (*Mnemosyne*) TAB. V.

**PAPILIO** (*Mnemosyne*) alis oblongis integerrimis albidi-nigro-nervosis; primoribus maculis duabus nigris marginalibus. Linn. Syst. Nat. 754.

**DAIS** (*Cotinifolia*) TAB. VI.

**DAIS** (*Cotinifolia*) Linn. Sp. pl. pag. 556.

## PAPILIO (Picra) TAB. VI.

PAPILIO (*Piera*) alis oblongis integerrimis albis nigro-nervosis: primoribus maculis duabus nigris marginalibus.

Linn. Syst. Nat. 754.

## MARTYNIA (Longiflora) TAB. VII.

MARTYNIA (*Longiflora*) caule simplici, foliis orbiculatis repandis. Linn. Syst. Nat. (2) 412.

## PAPILIO (Troilus) TAB. VII.

PAPILIO (*Troilus*) subtus conspecta. Linn. Syst. Nat. 746.

## SELAGO (Tomentosa) TAB. VIII.

SELAGO (*Tomentosa*) racemis ramosis, foliis ovatis crenatis tomentosis caule prostrato. Linn. Sp. pl. p. 877. n. 7.

## MANULEA (Tomentosa) TAB. VIH.

MANULEA (*Tomentosa*) foliis tomentosis, caulis foliosis, pedunculis multifloris. Linn. Mantiss. II. pag. 420.

## PAPILIO (Pammon) TAB. VIII.

PAPILIO (*Pammon*) subtus conspecta alis caudatis nigris concoloribus omnibus margine maculatis; posticis fascia maculis septem albis. Linn. Syst. Nat. 746.

## CROTON (Lobatum) TAB. IX.

CROTON (*Lobatum*) foliis inermi-ferratis: inferioribus quinque lobis; superioribus trilobis. Linn. Sp. pl. p. 1427.  
Nostra species semper habet folia trifida, cau' emque pilosum.

## PAPILIO (*Demophon*) TAB. IX.

PAPILIO (*Demophon*) alis dentatis: supra fascia viridi sub-  
tus griseo marmoratis. Linn. Syst. Nat. 753.

## IMPATIENS (*Capensis*) TAB. X.

Planta annua, sub dio laete crescens, ad altitudinem quatuor  
pedum, caules lucide rubescunt, geniculatae, stabiles, ra-  
mi alterni teretes, flores lutei intus rubro maculati;

Habitus Impatientis Noli-tangere.

Habitat ad Promontorium Bonae. Sp.

## PAPILIO (*Sectator*) TAB. X.

PAPILIO (*Sectator*) alis integerrimis, primoribus supra  
fuscis fasciaque dilutiore transversali: inferioribus nigris,  
postice albo coeruloque punctatis.

Magnitudo ut in iconē. Abdomen & Corpus nigra, alæ pri-  
mores supra fuscâ fasciâ integerrima transversali per medium.  
Subtus margo niger ad medianam alam fuscus, cæterum ala  
flava, fasciâ per medium angusta transversali nigro termina-  
ta: alæ secundariæ ad abdomen supra fuscæ, cæterum ni-  
græ, versus exteriorem partem, atræ, maculis albis coeru-  
lescentibusque sparsis irregularibus variæ, subtus flavæ, ver-  
sus marginem fuscæ, per medium transversa fascia flava ni-  
gro-circumscripta ornatæ, quo colore reliqua alæ pagina  
tincta est. Versus marginem superiorem viride flavescentes  
& ad basim punctulis ternis concoloribus, atque ante fasciam  
ocellis geminis nigris conspicuæ.

## VERONICA (*Hispanica*) TAB. XI.

VERONICA (*Hispanica*) spicis terminalibus, foliis sub-linearibus pinnatifido - acute dentatis. Planta perennis. Caules filiformes, quas folia ambiunt oblongiuscula subaequalia, sublinearia, acute pinnatifido - dentata : denticuli divergentes recurvati, ad summitatem quandoque terna, quandoque omnino nulli.

Corollae tubulosae, tubus longitudinem calycis aequans, laciniae coerulecentes, stamina lutescentia, antherae violaceae.

Habitat in Hispania.

## PAPILIO (*Demophon*) mas. TAB. XI.

PAPILIO (*Demophon*) alis dentatis: supra nigris fascia viridi, subtus griseo marmoratis Linn. Syst. Nat. 753.

## CELASTRUS (*Lucidus*) TAB. XII.

CELASTRUS (*Lucidus*) foliis ovalibus nitidis integerrimis marginatis. Linn Syst. Nat. 181. Mantiss. 49.

Habitat ad Cap. b. spei.

Frutex erectus: Ramis fuscis, duris; folia alterna, ovata s. obovata, obtusiuscula, venosa, lucida, brevissime petiolata, margine integerrimo reflexo.

Pedunculi axillares, conferti, simplices folio breviores.

Petala concava, stama corollâ breviora, stylis crassis, stigmata tria divergentia.

## PAPILIO (*Demoleus*) TAB. XII.

PAPILIO (*Demoleus*) alis dentatis fuscis: maculis fasciaque maculosa flavis; posticis ocellis binis. Linn. Syst. Nat. 753.

## AMARYLLIS (*Undulata*) TAB. XIII.

AMARYLLIS (*Undulata*) spatha multiflora. Corol-



lis

lis patulis, petalis undulatis mucronatis basi dilatatis.  
Habitat ad Promontorium Bonae Spei.

Scapus cum umbella magnitudine umbellae cum pedunculo  
geranii zonalis. Spatha profert circiter 12. flores purpu-  
reos, petalis angusto-lanceolatis, apice valde mucrona-  
tis; basi ipsa ovata, stamina declinata. Linn. Syst. Nat. 237.

### PAPILIO (Hecabe) TAB. XIII.

PAPILIO (*Hecabe*) alis integerrimis rotundatis flavis ex-  
timo nigris: singulis subtus punctis pallidis numerosissimis  
Linn. Syst. Nat. 763.

### BROWALLIA (Elate) TAB. XIV.

BROWALLIA (*Elate*) pedunculis unifloris multifloris-  
que. Linn. Sp. pl. pag. 880.

Habitat in Peru.

Simillima B. demissae, sed caulis duplo major, rigidus,  
crassitie dimidiis digitis, quasi fruticosus; Rami inferiores  
longitudine fere ipsius caulis, quod non in demissa.

Folia floralia huic fere glabra. Pedunculi alii uniflori, alii  
triflori, quinqueflori & ultra, corolla saterate coeruleo-  
violacea, nec dilute violacea.

BROWALLIA haec est simillima B. demissae, distincta  
tamen ab ea caule stricto quasi lignosa Linn. Mantiss. (2)  
421.

### PAPILIO (Ulysses) TAB. XIV.

PAPILIO (*Ulysses*) subtus conspecta. Linn. Syst. Nat. 748.

### BROWALLIA (Demissa) TAB. XV.

BROWALLIA (*Demissa*) pedunculis unifloris. Linn. Sp.  
pl. pag. 879.

### PAPILIO (Demophon) TAB. XV.

PAPILIO (*Demophon*) subtus Conspecta Linn. Syst. Nat. 753.  
CY-

**CYTISUS** (*Aethiopicus*) TAB. XVI.

**CYTISUS** (*Aethiopicus*) racemis lateralibus strictis, ramis angulatis, foliolis cuniformibus. Linn. Sp. pl. p. 1042.

**PAPILIO** (*Scylla*) TAB. XVI.

**PAPILIO** (*Scylla*) alis subintegerrimis rotundatis fulvis: primoribus supra albis limbo nigro; subtus omnibus nebulosis. Linn. Syst. Nat. 763.

**CROTALARIA** (*Quinquefolia*) TAB. XVII.

**CROTALARIA** (*Quinquefolia*), foliis quinatis Welliatandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 51. t. 28. fig. mala.

Foliola angusta lanceolata, obtusa, saepe retusa, subnuda lateralibus brevioribus, calyces campanulati. Flores racemosi alterni glabri. Linn. Sp. pl. pag. 1006.

**Obs.** In nostra planta folia ima sunt simplicia; paulo altiora sunt terna, adhuc quae altiora sunt quaterna fiunt, donec suprema quinquefida existunt; unde triviale nomen  
**Cl.** Linnaeus desumpit.

**PAPILIO** (*Melpomene*) TAB. XVII.

**PAPILIO** (*Melpomene*) alis oblongis integerrimis nigris: primoribus fascia rubra; posticis basi subtus punctis sanguineis. Linn. Syst. Nat. 758.

**BALTIMORA** (*Recta*) TAB. XVIII.

**CHRYSANTHEMUM** Americanum, caule alato, amplioribus foliis binatis, floribus pallide lutescentibus parvis. Pluk. mant. 46. t. 342. f. 3.

Habitat in Marilandia, ad urbem Baltimore. O. H. U.

Caulis bipedalis, tetragonus, erectus, viridis: lateribus profunde canaliculatis: angulis scabris: rami laterales brevissimi.

Folia opposita, petiolata, ovata, acuminata, ferrata, trinervia, patentia, subtomentosa, pilis brevissimis, sericeis; antiquioribus scabra.

Paniculae terminales, parvae, flores lutei. Corollulae discotomentosae antheris nigris. Linn. Mantiss. (2). 288.

### PAPILIO (*Philoctetes*) TAB. XVIII.

PAPILIO (*Philoctetes*) alis subcaudatis fuscis; posticis ocellis duobus coeruleis pupilla nigra punctisque tribus albus. Linn. Syst. Nat. 750.

Alae Primores, subtus fascia linearis alba & linea transversa atra baseos: Posticae punctis. 3. albis & maculis 2. violaceis.

### COREOPSIS (*Lanceolata*) TAB. XIX.

COREOPSIS (*Lanceolata*) foliis lanceolatis, integerimis ciliatis. Linn. Sp. pl. pag. 1283.

Obs. in nostra planta folia infima semper ternata existunt.

### PAPILIO (*Aeneas*) TAB. XIX.

PAPILIO (*Aeneas*) alis dentatis atris primoribus supra macula viridi; posticis macula palmata sanguinea Linn. Syst. Nat. 747.

### LOBELIA (*Minuta*) TAB. XX.

LOBELIA (*Minuta*) foliis radicalibus ovatis scapis capillaribus.

Habitat in cap. b. speci subaquosis ♂.

Planta minuta (uti Cameraria & Bellum minutum) pollicaris.

Radix filiformis propaginibus repens. Folia radicalia, obovata, obtusa, tenera, vix crenata, longius petiolata. Scapus setaceus, bipollicaris, erectus, aphyllus, uniflorus. Calyx oblongus, lanceolatus, erectiusculus; Corolla infundibuliformis. Capsula infera oblonga. Affinis Lobeliae Laurentiae sed tenerior, nec ulla bractea in scapa, a L. Erino differt caule nullo. Linn. Mantiss. (2) 192.

### PAPILIO (*Ulysses*) TAB. XX.

PAPILIO (*Ulysses*) alis dentatis nigris disco coeruleo radiante; posticis subtus ocellis septem. Linn. Syst. Nat. 748.




TAB. I.



N. Keerburgt fecit

TAB. II.



N. Meerbregt fecit

TAB. III.




N. Meenburgh scut

TAB.IV.



N. Meerburgt Secit

TAB.V.



N. Meenburgh fecit

TAB.VI.



N. Meerburgh fecit



N. Meerburgh fuit

TAB.VIII.



N. Meerbongh fecit

TAB. IX.



N. Meenborg fecit



N. Meerburgt. fecit

TAB XI



N. Meenburgh facit

TAB. XII.



N. Meerburgh fecit

TAB XIII



N. Meerburgh fecit

TAB XIV



N. Neenburgh ferit

TAB XV.



N. Meesburg E. fecit

TABXVI



N. Murburgl fecit

TÁB XVII.



N. Meerburgh fecit

TAB XVIII.



W. W. Meerbunge fecit

TAB X V III.



N. Meerburg & fecit.

TABXX



N. Meesburgl fecit.