

III. BOTANICA

1. Catalogo methodico das plantas observadas em Portugal

POR

CARLOS MARIA GOMES MACHADO

(Continuado de pag. 128 do num. 2)

Ordo 4. BRASSICACEAE

Trib. I. Arabideae

1. Matthiola R. Br.

1. *M. tristis* R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 120.—*Hesperis provincialis* L. sp. ed. 1. 664. —*H. angustifolia* Lamk. enc. III. 322; Brot. fl. lus. I. 577. —*Cheiranthus tristis* L. sp. ed. II. 925. —Rchb. ic. II. t. 46, f. 4348. —Welw. it. lus. (1851) n.^o 22; Mach. exs. n.^o 1047.

In maritimis pr. Cezimbra (Brot.); serra da Arrabida (Welw.! Hochst.!). Durii ripis pr. Porto (Brot.). Peren. April. —Jun.

M. incana R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 119.—*Hesperis violaria* Lamk. enc. III. 323; Brot. fl. lus. I. 577. —Rchb. l. c. t. 45, f. 4354. —[Goi-veiro encarnado].

Colitur in hortis freq. et subsppontanea. Peren. Vère et aest.

Cheiranthus cheiri L. sp. 924; Brot. fl. lus. I. 576. —Rchb. l. c. t. 45, f. 4347. —[Goiabeiro amarelo].

Colitur in hortis et subsppontanea ad muros hortis proximos. Peren. Vère et aest.

2. Nasturtium R. Br.

1. *N. officinale* R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 110; Seub. fl. azor. 43,

n.º 317; Lowe man. fl. of Mad. 23. — *N. aquaticum* Trag. hist. 82; Grisl. V. Lus. n.º 1055. — *Sisymbrium nasturtium* L. sp. 916; Vand. spn. 45; Brot. fl. lus. I. 587; Fig. fl. pharm. 375. — Rchb. l. c. t. 50, f. 4359. — Mach. exs. n.º 39. — [Agrião].

In rivulis, fontibus, pratis humidis in tota Lusitania freq. (Brot.); c. Conimbr.! etc. Peren. Apr. — Maj.

2. *N. Boissieri* Coss. ann. sc. nat. et pl. crit. 26. — *N. asperum* Boiss. voy. bot. 28. — *Sisymbrium asperum* Vand. spn. 45 (non L.); Brot. fl. lus. I. 588. — Welw. it. lus. (1854) n.º 24; Mach. exs. n.º 1045.

In humidis agri Olisip. (Welw.! Webb!); in uliginosis Mundae (Brot.). Ann. Aest.

3. *N. sylvestre* R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 110. — *Eruca nasturtii folio Lus.* Grisl. V. Lus. n.º 469. — *Sisymbrium sylvestre* L. sp. 916. — Rchb. l. c. t. 55, f. 4368. — Mach. exs. n.º 869.

In muris pr. monasterium de Sancta Clara c. Conimbr.! Peren. Jun.

4. *N. amphibium* R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 110. — *Sisymbrium amphibium* L. sp. 917; Vand. spn. 45. — *Camelina aquatica* Brot. fl. lus. I. 564. — Rchb. ic. t. 52, f. 4363. — Mach. exs. n.º 942.

In paludosis, inundatis, fossisque c. Conimbr.! c. Cabeceiras de Basto (Henr.!). Peren. Jun. — Aug.

3. *Barbarea* R. Br.

1. *B. vulgaris* R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 109. — *Turrita siliquis longissimis* Lus. Grisl. V. Lus. n.º 1451. — *Erysimum barbarea* L. sp. 922; Vand. spn. 45; Brot. fl. lus. I. 575; Fig. fl. pharm. 367. — Rchb. l. c. t. 47, f. 4355 et 4356. — Mach. exs. n.º 37.

In arvis, collinis, etc. pr. Obidos (Brot.); c. Conimbr.! Ourentã! Bussaco! etc. Bisann. et perenn. Aest.

Obs. A variedade d'esta especie, que mais vulgarmente temos observado, é a que corresponde á *B. stricta* Fries (Rchb. l. c. t. 47, f. 4355), e que alguns auctores conservam ainda como especie.

2. *B. praecox* R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 109; Lowe man. fl. of Mad. 23; Drouet cat. de la fl. des Açores 77. — *Erysimum praecox* Sm. Engl. bot. t. 1129. — Rchb. l. c. t. 49, f. 4358.

In Otta (Welw.! h. Coss.). Bisann. Aest.

4. *Arabis* L.

1. *A. lusitanica* Boiss. Diagn. pl. or. ser. 2. n.^o 1. pg. 20. — *Turritis hirsuta* Vand. spn. 45; Brot. fl. lus. I. 578. — *Turrita minor* Grisl. V. Lus. n.^o 1450. — Welw. it. lus. (1854) n.^o 28; Mach. exs. n.^o 40.

In collinis Extremadurae pr. Cacem (Welw.); in cultis pr. Olisip. (Hochst.) ad sepes pr. Conimbr.! Ann. et bisann. Apr. — Jun.

2. *A. muralis* Bert. dec. ital. II. 37. n.^o 6; et fl. ital. VII. 435. — Rchb. l. c. t. 40, f. 4339.

In serra da Arrabida (Welw.! h. Coss.). Bisann.

3. *A. perfoliata* Lamk. enc. I. 219. — *Turrita vulgarior et major* Clus. hist. II. 126. f. 2 et 5; Grisl. V. Lus. n.^o 1450. — *Turritis glabra* L. sp. 930; Brot. fl. lus. I. 578. — Rchb. l. c. t. 44, f. 4346.

In serra da Estrella pr. Manteigas et alibi (Brot.). Bisann. Maj. — Jun.

4. *A. Boryi* Boiss. voy. 26. t. 5, f. a. — *Cardamine heterophylla* Bory Florul. n.^o 29 (non Host. nec Lap.). — *C. Boryi* Boiss. El. n.^o 9. — *Descurainia pinnatifida* Webb it. hisp. 75. — Mach. exs. n.^o 944.

In altioribus da serra da Estrella! Peren. aut bisann. Aug.

5. *Cardamine* L.

1. *C. pratensis* L. sp. 915; Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 583; Fig. fl. pharm. 372. — *C. altera simplici flore* Clus. hist. II. 128. f. 2. — *C. sive flos cuculi* Grisl. V. Lus. n.^o 257. — Rchb. l. c. t. 28, f. 4308. — Mach. exs. n.^o 942.

In pratis humidis, udis Cintræ! pr. Pereira (Brot.); inter Louzã et Miranda do Corvo (Brot.); serra da Estrella (Brot.). Peren. Apr. — Jun.

2. *C. hirsuta* L. sp. 915; Brot. fl. lus. I. 583; Fig. fl. pharm. 373; Lowe man. fl. of Mad. 24; Drouet Cat. de la fl. des Açores 76. — *C. minor* Grisl. V. Lus. n.^o 258. — Rchb. l. c. t. 26, f. 4304. — Mach. exs. n.^o 44.

In arvis, vineis, hortis, sepibus, etc. freq. in tota Lusitania: c. Olisip.! Conimbr.! Ann. Hyeme et vère.

Trib. II. Alyssineae

6. Lunaria L.

1. *L. rediviva* L. sp. 911; Vand. spn. 44. — *Viola latifolia Lunaria odorata* Clus. hist. I. 297. — *Bulbonach perenne* Grisl. V. Lus. n.^o 236. — Rchb. l. c. t. 23. f. 4290.

In silvis montis de Nossa Senhora das Necessidades; c. Moimenta da Beira rara (Brot.). Perenn. Aest.

7. Alyssum L.

1. *A. granatense* Boiss. et Reut. pug. pl. nov. 9; Coss. not. crit. 446. — Mach. exs. n.^o 1345.

In marginibus Guadianae! Ann. Mart.

2. *A. collinum* Brot. phyt. lus. II. 209. t. 180. — *A. montanum* Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 558. — *Thlaspi montanum spicatum flore luteo* Grisl. V. Lus. n.^o 4393. — Welw. it. lus. (1851) n.^o 45; Mach. exs. n.^o 1041.

In collibus de Faro! serra de Monsanto (Welw.); et alibi in Extremadura (Brot.); c. Cantanhede (A. de Carv.). Ann. Apr. — Maj.

3. *A. alpestre* L. mant. 92; Brot. fl. lus. I. 557 (ex Hoffm.). — Rchb. l. c. t. 20, f. 4275.

In agris pr. Bragança freq. (Brot.). Peren. Apr. — Maj.

4. *A. maritimum* Lamk. enc. I. 98; Brot. fl. lus. I. 558; Seub. fl. azor. 44. n.^o 349. — *A. minimum* L. sp. 908; Vand. spn. 44. — *Thlaspi toto anni curriculo florens* Grisl. V. Lus. n.^o 4394. — *Clypeola maritima* L. mant. 426; Vand. spn. 44. — *Koniga maritima* Lowe man. fl. of Mad. 34. — Rchb. l. c. t. 48, f. 4266.

In maritimis de Caparica (Brot.); serra de Monsanto (Welw.); Cacilhas! etc. Peren. Vère et aest.

8. Draba L.

1. *D. muralis* L. sp. 897; Brot. fl. lus. I. 559; Lowe man. fl. of Mad. 32. — Rchb. l. c. t. 42, f. 4235. — Mach. exs. n.^o 43.

In sepibus pr. Cintra (Brot.); c. Conimbr.! etc. Ann. Mart. — Maj.

9. Erophila D. C.

1. *E. verna* D. C. syst. II. 356. — *Draba verna* L. sp. 896; Brot. fl. lus. I. 559. — Rchb. l. c. t. 42, f. 4234. — Mach. exs. n.^o 1288.

In arvis ad Tagum pr. Salvaterra de Magos (Brot.); in collinis pr. Santa Clara c. Conimbr.! Ann. Febr. — Mart.

Cochlearia glastifolia L. sp. 904; Brot. fl. lus. I. 571. — Rchb. l. c. t. 47, f. 4261.

Colitur et subsppontanea in muris do Porto ad ripas Durii (Brot.). Ann. Aest.

Trib. III. Sisymbrieae

10. Malcolmia R. Br.

1. *M. parviflora* D. C. syst. II. 442. — *Leucojum sylvestre minimum Scalbriense* Grisl. V. Lus. n.^o 861. — *Hesperis parviflora* D. C. fl. fr. ed. 3. IV. 654, et ic. gall. t. 35. — Mach. exs. n.^o 36.

In cabo Mondego! pr. Mira (A. de Carv.!). Ann. Maj. — Sept.

2. *M. littorea* R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 424. — *Leucojum maritimum minus* Clus. hist. I. 298. f. 2. — *L. marinum mas* Grisl. V. Lus. n.^o 863. — *Hesperis lusitanica angustifolia, folio dentato, purpurascente flore* Tourn. inst. 223. — *H. lusitanica fruticosa purpurea* Vaill. herb. — *Cheiranthus littoreus* L. sp. 925. — *Hesperis littorea* Lamk. enc. III. 322; Brot. fl. lus. I. 577. — Rchb. l. c. t. 56, f. 4373. — Welw. it. lus. (1854) n.^o 20; Mach. exs. n.^o 34.

In maritimis de Villa Real de Santo Antonio! costa da Trafaria et alibi ad Tagum (Brot. Welw.!). Figueira et Porto (Brot.). Bisann. et peren. Vère et aest.

3. *M. lacera* D. C. syst. II. 445. — *Leucojum marinum minus* Grisl. V. Lus. n.^o 862. — *L. lusitanicum purpureum foliis eleganter dentatis* Herm. parad. bot. 193. t. 60. — *Cheiranthus lacerus* L. sp. 926. — *Hesperis lacera* Lamk. enc. III. 322; Brot. fl. lus. I. 577 (ex L.). — Desf. cor. Tourn. 63. t. 47; et ann. mus. XI. 377. t. 34. — Welw. it. lus. (1854) n.^o 34; Bourg. exs. n.^o 1763; Mach. exs. n.^o 911.

In maritimis pr. Faro (Welw.! Bourg.! Mach.!). Ann. Apr. — Maj.

M. maritima R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 424. — *Cheiranthus maritimus* L. amoen. IV. 280; et sp. 924. — *Hesperis maritima* Lamk. enc. III. 324; Brot. fl. lus. I. 575. — Rchb. l. c. t. 56, f. 4372. — Mach. exs. n.^o 35.

Colitur in hortis et subs spontanea ad littora Tagi salsi pr. Belem (Brot.). Ann. Aest.

44. *Sisymbrium* All.

1. *S. alliaria* Scop. carn. ed. 2. n.^o 825. — *Erysimum alliaria* L. sp. 922. — *Hesperis alliaria* Brot. fl. lus. I. 578. — Rchb. l. c. t. 60, f. 4379. — Mach. exs. n.^o 472. [Alliaria, Herva alheira].

In umbrosis humidis da ribeira de Niza pr. Portalegre! Conraria pr. Co-nimbr. (Brot.). Bisann. Apr. — Jul.

2. *S. thalianum* J. Gay ann. sc. nat. ser. 1.^a VII. 399; Lowe man. fl. of Mad. 26. — *Bursa pastoris minor* Grisl. V. Lus. n.^o 240. — *Arabis thaliana* L. sp. 929; Vand. spn. 45; Brot. fl. lus. I. 579. — Rchb. l. c. t. 60, f. 4380. — Welw. it. lus. (1851) n.^o 32; Mach. exs. n.^o 4249.

In arvis, vineis, muris etc. freq. c. Olisip. (Brot.); serra de Cintra (Welw.); c. Conimbr. (Brot., Mach.). Ann. Hyeme et vère.

3. *S. officinale* Scop. fl. carn. ed. 2. n.^o 824. — Seub. fl. azor. 44, n.^o 320; Lowe man. fl. of Mad. 25. — *Erysimum* Grisl. V. Lus. n.^o 482. — *E. officinale* L. sp. 922; Vand. spn. 45; Brot. fl. lus. I. 575; Fig. fl. pharm. 366. — Rchb. l. c. t. 72, f. 4401. — Mach. exs. n.^o 38. — [Rin-chão].

In ruderatis, agris, etc. freq. c. Monchique! Olisip. (Brot.); Conimbr. et alibi. Ann. Apr. — Jul.

4. *S. polyceratum* L. sp. 918; Brot. fl. lus. I. 588 (ex Hoffm.). — *Erysimum alterum* Mathioli Grisl. V. Lus. n.^o 483. — Rchb. l. c. t. 73, f. 4403.

In agris pr. Gollegā et alibi ad ripas Tagi (Hoffm.). Ann. Aest.

5. *S. irio* L. amoen. IV. 270; et sp. 924; Brot. fl. lus. I. 588; Drouet cat. de la fl. des Açores 77. — *Erysimum* II. Tab. ic. 840; Grisl. V. Lus. n.^o 484. — Rchb. l. c. t. 75, f. 4408. — Mach. exs. n.^o 1343.

In segetibus c. Faro! (Welw. h. mus. Par.); val de Pereiro et collinis cal-careis c. Olisip. et alibi in Extremadura (Brot.). Ann. Apr. — Jul.

6. *S. sophia* L. sp. 920; Vand. spn. 45; Brot. fl. lus. I. 587; Fig. fl. pharm. 376.—*Sophia chirurgorum* Lob. ic. 738. f. 4; Grisl. V. Lus. n.^o 1484.—Rchb. l. c. t. 74, f. 4405.

In Transmontana; ad Durium presertim pr. Barca d'Alva (Brot.). Ann. Maj.

12. Erysimum Gaertn.

1. *E. virgatum* Roth. cat. bot. 75?; Brot. fl. lus. I. 575! (ex Link).

In serra da Estrella inter Cea et Sabugueiro (Link., Welw.). Bisann. Jun.—Jul.

2. *E. linifolium* J. Gay Erisym. nov. diagn. 3.—*Cheiranthus linifolius* Pers. enc. II. 201.—*Hesperis repanda* Lag. nov. gen. et sp. 20.

In Lusitania (ex Coss. not. crit.). Perenn.

Trib. IV. Camelinaeae

13. Camelina Crantz

1. *C. sativa* Crantz aust. 10; Brot. fl. lus. I. 564.—*Sesamum* Grisl. V. Lus. n.^o 1315.—*Myagrum sativum* L. sp. 894; Cav. ic. I. 47. t. 66.—Rchb. l. c. t. 24, f. 4292. —[Gergelim].

In agris c. Conimbr. et alibi in Lusitania boreal (Brot.). Ann. Vère.

Trib. V. Brassiceae

14. Brassica Benth. et Hook.

1. *B. sabularia* Brot. fl. lus. I. 582; et phyt. lus. I. 97. t. 43.—*Rapistrum dissecto folio humi strato* Grisl. V. Lus. n.^o 1217.—*Sisymbrium Parra* L. mant. 255; Vand. spn. 45.—Welw. it. lus. (1851) n.^o 25; Bourg. exs. n.^o 4760; Mach. exs. n.^o 1032.

In maritimis arenosis pr. Faro (Bourg.! Mach.!) et Tagum (Welw.). Ann. et bisann.? Apr. — Maj.

2. *B. oxyrrhina* Coss. ann. sc. nat. et not. crit. 26.—Welw. it. lus. (1851) n.^o 24; Bourg. exs. n.^o 4759; Mach. exs. n.^o 413.

In maritimis arenosis pr. Villa Real de Santo Antonio (Bourg.! Mach.!); pr. Coina in Transtagana (Welw.); c. Ourentã (Mach.! et A. de Carv.!). Ann. et bisann. Apr. — Maj.

3. *B. Tournefortii* Gou. ill. 44. t. 20, f. A. — *Eruca erecta* Lag. cat. hort. Mad. 1815, pg. 20; et Gen. et sp. 20. — Mach. exs. n.^o 1344. In agris pr. Faro! Ann. et bisann. Maj.

3. *B. fruticulosa* Cyr. pl. rar. II. 7. t. 4.? — Mach. exs. n.^o 29. In marginibus da ribeira de Cea! Perenn. Aest.

4. *B. cheirantos* Vill. dauph. III. 332, t. 36; Webb. it. hisp. 72. — *B. pseudo-erucastrum* Brot. fl. lus. I. 581! — Rchb. l. c. t. 94, f. 4432 et 4433. — Bourg. exs. n.^o 4761; Mach. exs. n.^o 1270,

In umbrosis silvestris pr. Monchique (Bourg.!). cabo da Rocca (Webb); c. Conimbr. (Brot., Mach.!). Bisann. Maj. — Jul.

5. *B. sinapistrum* Boiss. voy. 39. — *Rapistrum vulgare luteum* Grisl. V. Lus. n.^o 4240. — *Sinapis arvensis* L. sp. 933; Brot. fl. lus. I. 584; Lowe man. fl. of Mad. 28. — *S. orientalis* Brot. fl. lus. I. 584. — Rchb. l. c. t. 86, f. 4425.

In arvis et inter segetes pr. Faro (Bourg.!. h. Coss.); c. Olisip., Conimbr. et alibi (Brot.). Ann. Vère et aest.

6. *B. alba* Boiss. voy. 39. — *Sinapis album* Grisl. V. Lus. n.^o 4325. — *S. alba* L. sp. 933; Brot. fl. lus. I. 585; Fig. fl. pharm. 374; Lowe man. fl. of Mad. 28. — Rchb. l. c. t. 85, f. 4424. — Mach. exs. n.^o 30. — [Mostardeira branca].

In agris, vineis, etc. c. Conimbr. (Brot., Mach.!). Ann. Maj. — Jun.

7. *B. laevigata*. — *Sinapis laevigata* L. amoen. acad. IV. 281; et sp. 934; Vand. spn. 45; Brot. fl. lus. I. 585.

In montosis do Gerez (Brot.). Ann. Aest.

8. *B. ochroleuca* Soy-Will. ann. sc. nat. 2.^a ser. II. 446. — *Sisymbrium erucastrum* Poll. Pal. II. 234; Brot. fl. lus. I. 588. — *Erucas-trum Pollichii* Spenn. frib. 946. — Rchb. l. c. t. 89, f. 4428.

In cabo da Rocca et alibi in Extremadura (Brot.). Ann. Vère.

9. *B. adpressa* Boiss. voy. 38. — *Sinapis incana* L. sp. 934; Vand. spn. 45; Brot. fl. lus. I. 585; et phyt. lus. II. 205. t. 172. — *Hirschfel-dia adpressa* Moench. meth. 264. — Rchb. l. c. t. 85, f. 4423. — Mach. exs. n.^o 33.

In ruderatis, agris, viisque frequens per totam Lusitaniam! Bisann. Vère et aest.

15. *Diplotaxis* D. C.

1. *D. erucoides* D. C. syst. II. 631. — *Sinapis erucoides* L. amoen. IV. 322; et sp. 324. — *Eruca latifolia Scalbicensis* Grisl. V. Lus. n.º 467? — Rchb. l. c. t. 84, f. 4422.

In Troia (Welw.! h. Coss.). Ann.

2. *D. virgata* D. C. syst. II. 631. — *Sinapis virgata* Cav. prael. ex Lag. — Welw. it. lus. (1854) n.º 26.

In tectis et ad muros Olisip. (Welw.). Ann. Mart.

3. *D. catholica* D. C. syst. II. 632. — *Rapistrum segetum multifido folio* Grisl. V. Lus. n.º 1215. — *Sisymbrium catholicum* L. mant. 93; Vand. fasc. pl. et spn. 45; Brot. fl. lus. I. 587; et phyt. lus. II. 202. t. 474. — Bourg. exs. n.º 1758; Mach. exs. n.º 32.

In agris, cultis, herbidis, etc. freq.: c. Faro! (Bourg.); c. Olisip. (Brot. Welw.); c. Conimb.! Ann. Vère et aest.

4. *D. viminea* D. C. syst. II. 635. — *Eruca pumila supina brumalis* Lus. Grisl. V. Lus. n.º 470? — *Sisymbrium vimineum* L. sp. 919. — Rchb. l. c. t. 81, f. 4416. — Welw. it. lus. (1854) n.º 27.

In serra de Monsanto (Welw.). Ann. Mart.

16. *Eruca* Tourn.

1. *E. sativa* Lamk. fl. fr. II. 496; Lowe man. fl. of Mad. 31. — *Eruca latifolia sativa flore pallido* Grisl. V. Lus. n.º 466. — *Brassica eruca* L. sp. 932; Brot. fl. lus. I. 581; Fig. fl. pharm. 371. — Rchb. l. c. t. 84, f. 4421.

In Pezo da Regoa et alibi in Transmontana (Brot.). Ann. Jun. — Jul.

Trib. VI. Lepidineae

17. *Capsella* Vent.

1. *C. bursa pastoris* Moench. meth. 271; Lowe man. fl. of Mad. 35; Drouet cat. de la fl. des Açores 78. — *Bursa pastoris major* Grisl. V. Lus. n.º 240. — *Thlaspi bursa pastoris* L. sp. 903; Vand. spn. 44;

Brot. fl. lus. I. 568; Fig. fl. pharm. 362. — Rchb. l. c. t. 11, f. 4229.
— Mach. exs. n.º 46. — [Bolsa de pastor].

In arvis, agris, ruderatis, etc. freq. in tota Lusitania! Ann. Febr. — Sept.

2. *C. procumbens* Fries nov. mant. I. 14. — *Lepidium procumbens* L. sp. 898. — *Hutchinsia procumbens* Desv. journ. III. 168. — Rchb. l. c. t. 11, f. 4221. — Welw. it. lus. (1851) n.º 18; Mach. exs. n.º 1034.

In sabulosis pr. Faro! (Welw.). Ann. Mart. — Apr.

18. *Ionopsisidium* Rchb.

1. *I. acaulis* Rchb. Pl. crit. VII. 20. t. 649. — *Cochlearia pusilla montana* Grisl. V. Lus. n.º 377. — *Thlaspi minimum Lusitanicum cochleariae folio* Tourn. inst. 243. — *Cochlearia acaulis* Desf. fl. atl. II. 69. — *C. Olisiponensis* Brot. fl. lus. I. 571. — *C. pusilla* Brot. phyt. lus. I. 100, t. 21; Fig. fl. pharm. 355. — Welw. it. lus. (1851) n.º 19; Mach. exs. n.º 44.

In collibus da Ajuda et Alcantara pr. Olisip.! (Brot., Webb! Welw.); in Montagraço et alib. in Extremadura (Brot.). Ann. Hyeme.

19. *Senebiera* Poir.

1. *S. coronopus* Poir. enc. VII. 76; Lowe man. fl. of Mad. 35; Drouet cat. de la fl. des Açores 78. — *Coronopus repens* Lob. ic. 238. f. 1; Grisl. V. Lus. n.º 397. — *Cochlearia coronopus* L. sp. 904; Vand. spn. 44. — *C. Ruellii* Brot. fl. lus. I. 565. — Rchb. l. c. t. 9, f. 4210. — Mach. exs. n.º 48.

In ruderatis, viis, etc. freq.: c. Olisip.! Conimbr.! et alibi in Lusitania australiori (Brot.). Ann. Aest.

2. *S. didyma* Pers. enc. II. 185; Lowe man. fl. of Mad. 35. — *Lepidium didymum* L. mant. 92. — *Senebiera pinnatifida* Seub. fl. azor. 44, n.º 323. — Rchb. l. c. t. 9, f. 4209. — Mach. exs. n.º 4220.

In viis pr. Tavira! c. Olisip. (Welw.! h. Coss.); in arvis c. Conimbr.! c. Ourentã! Ann. Apr. — Jul.

20. *Lepidium* R. Br.

1. *L. heterophyllum* Benth. cat. 95. — *Thlaspi vaccariae folio* Grisl.

V. Lus. n.^o 4391. — *T. campestre* Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 568; Fig. fl. pharm. 361. — Mach. exs. n.^o 913.

In arvis etc. freq.: c. Conimbr.! Ourentâ! etc. Ann. Apr. — Jul.

2. *L. graminifolium* L. sp. 900. — *Thlaspi lusitanicum umbellatum* gramineo folio flore albo Tourn. inst. 243. — Rchb. l. c. t. 10, f. 4248.

In Setubal (Welw. h. Coss.). Perenn.

3. *L. latifolium* L. sp. 899; Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 567; Fig. fl. pharm. 360. — *Lepidium* Grisl. V. Lus. n.^o 855. — Rchb. l. c. t. 10, f. 4249. — Bourg. exs. n.^o 1762; Mach. exs. n.^o 428. — [Herva pimenteira, herva serra].

In marg. rivulorum pr. Silves et Villa Nova de Portimão! (Welw.! h. mus. Par.; Bourg.!); in fossis, collicis, umbrosis, subhumidis de Caparica trans Tagum (Brot.); in agris Conimbr.! (Brot.). Perenn. Aest.

4. *L. draba* L. sp. ed. I. 645; Brot. fl. lus. I. 567. — *Draba I. vulgaris* Clus. hist. II. 123 et 124. f. 1. — *Cochlearia draba* L. sp. ed II. 904. — Rchb. l. c. t. 9, f. 4244.

In segetibus do campo de Ourique, val de Pereiro et ad agrorum versuras pr. Olisip. (Brot.). Perenn. Vère.

L. sativum L. sp. 899; Brot. fl. lus. I. 567. — Rchb. l. c. t. 9, f. 4242. — [Mastruço ordinario].

Colitur in hortis. Ann. Aest.

Trib. VII. Thlaspideae

24. Biscutella L.

1. *B. auriculata* L. sp. 944; Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 573; — *B. Lamarckii* Jord. diag. d'esp. nouv. I. 323. — *Thlaspi clypeatam* segetum annuum Grisl. V. Lus. n.^o 4387. — Rchb. l. c. t. 8, f. 4207. — Welw. it. lus. (1851) n.^o 14; Bourg. exs. n.^o 1763; Mach. exs. n.^o 1031.

In argillosis pr. Loulé (Bourg.); inter segetes c. Tavira! in Extremadura pr. Lumiar (Welw.); c. Olisip. (Brot.). Ann. Vère et aest.

2. *B. laevigata* L. mant. 225; Brot. fl. lus. I. 573; Webb it. hisp.

- 77.—*B. ambigua* Rchb. ic. pl. rar. VII. t. 648. n.^o 839. —*B. lusitanica* Jord. diagn. d'esp. nouv. I. 345. —*Thlaspi clypeatum* Clus. pan. 471. —*T. clypeatum montanum perenne* Grisl. V. Lus. n.^o 4388. —Welw. it. lus. (1851) n.^o 43. —Rchb. l. c. t. 8, f. 4203, 4205 et 4206.

In Transtaganae petrosis pr. Vendas (Welw.); in Serra da Arrabida (Brot., Webb); Cintra et alibi in Extremadura (Brot.). Perenn. Vère.

22. *Thlaspi* Dill.

1. *T. perfoliatum* L. sp. 902; Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 568. —Rchb. l. c. t. 5, f. 4483. —[Mostardeira brava (ex Vand.)].

In agris et ad vias in Extremadura et Lusit. boreali (Brot.). Ann. Apr. —Jun.

2. *T. montanum* L. sp. 902; Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 569. —*T. montanum II.* Clus. hist. II. 131. f. 1. —Rchb. l. c. t. 5, f. 4487.

In Transmontana boreali (Brot.). Perenn. Apr. —Maj.

23. *Iberis* Gaertn.

1. *I. contracta* Pers. enh. II. 186. —*I. lusitanica* Jord. diagn. d'esp. nouv. I. 276. —Bourg. exs. n.^o 2077; Mach. exs. n.^o 974.

In arvis sabulosis pr. Faro (Bourg.!). pr. Bragânc (Oliv.!). Bisann. Jul.

2. *I. Tenoreana* D. C. syst. II. 404. —Ten. fl. nap. t. 160. f. 1. —Welw. it. lus. (1851) n.^o 29; Mach. exs. n.^o 1033.

In saxosis ad cabo de S. Vicente (Welw.!). Perenn. Maj.

3. *I. linifolia* L. sp. 905. —*Thlaspi lusitanicum umbellatum, gramineo folio flore purpurascente* Tourn. inst. 243.

In Lusitania (Tourn.).

4. *I. Welwitchii* Boiss. diagn. pl. or. 2.^a ser. n.^o 1. pg. 39. —*I. linifolia* Brot. fl. lus. I. 570 (ex Welw.). —Welw. pl. exs. (1839) n.^o 83; (1842) n.^o 23, et it. lus. (1851) n.^o 23.

In pinetis sabulosis Extremadurae transtaganae pr. Coina (Welw., Brot.). Bisann. Maj. —Jul.

5. *I. pectinata* Boiss. diagn. pl. or. 1.^a ser. n.^o 1. p. 75; et Voy.

suppl. 720.—*Thlaspi parvum IV odorato flore* Clus. hist. II. 132. f. 4.
—Bourg. exs. n.º 2078.

In incultis ad cabo de S. Vicente (Bourg.); in Villa Nova de Milfontes
(Welw.! h. Coss.). Ann. Maj.

I. amara L. sp. 906; Brot. fl. lus. I. 569. — Rchb. l. c. t. 7, f.
4497.

Culta et subs spontanea pr. Collares. Ann. Aest.

6. *I. conferta* Lag. var. 2. n.º 22, pg. 243; et Gen. et sp. pl. 49,
n.º 255. — Mach. exs. n.º 940.

In cantaro gordo da serra da Estrella! Perenn. Aest.

7. *I. garrexiana* All. fl. ped. I. 250. t. 54, f. 2. — *I. sempervirens*
Webb it. hisp. 77. — Rchb. l. c. t. 7, f. 4498.

In serra da Arrabida (Webb). Perenn.

24. Teesdalia R. Br.

1. *T. nudicaulis* R. Br. h. Kew. ed. 2. IV. 83; Lowe man. fl. of
Mad. 33. — *T. caulescens* Rchb. in Holl'list. — *Iberis nudicaulis* L. sp.
907; Brot. fl. lus. I. 570. — Rchb. l. c. t. 6, f. 4489. — Mach. exs. n.º
1289.

In arvis sabulosis et collinis c. Conimbr.! Ourentã! Ann. Vère.

2. *T. lepidium* D. C. syst. II. 392; Lowe man. fl. of Mad. 33. —
Lepidium nudicaule L. sp. 898; Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 566.
— Rchb. l. c. t. 6, f. 4488. — Welw. it. lus. (1851) n.º 16; Mach.
exs. n.º 85.

In Loulé (Bourg. h. Coss.); agris Olisip. (Welw.); c. Conimbr. et alibi
in Beira, etc. (Brot.). Ann. Febr. — Mart.

25. Hutchinsia R. Br.

1. *H. petraea* R. Br. h. Kew, ed. 2. IV. 82. — *Lepidium petraeum*
L. sp. 899; Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 566. — Rchb. l. c. t. 6, f. 4490.
— Welw. it. lus. (1851) n.º 17.

In serra de Monsanto (Welw.); in collibus calcareis de Alcantara et alibi
in Extremadura (Brot.); in petrosis humidis pr. Olisip. (Hochst.). Ann. Mart.
— Apr.

Trib. VIII. Isatideae

26. *Isatis* L.

1. *I. lusitanica* Brot. fl. lus. I. 560 (ex Hoffm. non L.); Vand. spn. 45; Fig. fl. pharm. 364. — *I. sylvestris minor lusitanica* Herm. lugd. 678. — *I. platyloba* Link.

Intra saxa pr. Miranda do Douro ad imas fluvii ripas (Hoffm.). Ann. Maj.

27. *Calepina* Adans.

1. *C. corvini* Desv. journ. bot. III. 158. — *Myagrum monospermum* Grisl. V. Lus. n.^o 1044. — *M. iberioides* Brot. fl. lus. I. 562; et phyt. lus. I. 95. t. 42.

In seg. c. Conimbr. raro; in Transmontana et alibi in Lusitania boreali (Brot.). Ann. Apr. — Maj.

28. *Bunias* R. Br.

1. *B. erucago* L. sp. 935. — *B. aspera* Brot. fl. lus. I. 562. — Rchb. I. c. t. 4, f. 4459—4461. — Mach. exs. n.^o 34.

In Algarb.! (Bourg.! h. Coss.); in tritici segetibus pr. Castro Marim (Welw.! h. mus. Par.); c. Conimbr.! ad ripas Durii pr. Porto (Brot.). Ann. Jun.

Trib. IX. Cakilineae

29. *Crambe* Tourn.

1. *C. hispanica* L. sp. 937; Brot. fl. lus. I. 563. — *Rapistrum rotundifolium palustre, monospermum* Grisl. V. Lus. n.^o 1218. — Barr. ic. t. 387; Jacq. obs. fasc. II. 20. t. 44.

In Bemposta ad Durii ripas, et alibi in Lusit. boreali (Brot.). Ann. Maj.

30. *Rapistrum* Boerh.

1. *R. rugosum* All. ped. I. 257, t. 78; Webb it. hisp. 71; Lowe man. fl. of Mad. 38; Drouet cat. de la fl. des Açores 78. — *R. monospermum* Grisl. V. Lus. n.^o 1212. — *Myagrum rugosum* L. sp. 893. — *M.*

hispanicum Vand. spn. 44; Brot. fl. lus. I. 563. — Rchb. l. c. t. 2, f. 4471. — Mach. exs. n.^o 50.

In agris, inter seget. etc. in tota Lusit.! (Brot.). Ann. Aest.

31. Cákile Tourn.

1. *C. maritima* Scop. carn. n.^o 844; Seub. fl. azor. 44, n.^o 320; Lowe man. fl. of Mad. 37. — *C. serapionis erucae folio* Lob. Grisl. V. Lus. n.^o 244. — *C. serapionis* Brot. fl. lus. I. 561. — *Eruca marina sive cakile serapionis* Grisl. V. Lus. n.^o 472. — *Bunias cakile* L. sp. 936; Vand. spn. 45. — Rchb. l. c. t. 1, f. 4158. — Mach. exs. n.^o 49. — [Eruca marina, Oruga].

In arenosis maritimis pr. Figueira! et alibi in Oceani littorea (Brot.). Ann. Aest.

Trib. X. Raphaneae

32. Raphanus L.

1. *R. raphanistrum* L. sp. 935; Brot. fl. lus. I. 574; Lowe man. fl. of Mad. 41; Drouet cat. de la fl. des Açores 78. — *Rapistrum vulgare album* Grisl. V. Lus. n.^o 4211. — Rchb. l. c. t. 3, f. 4472. — Mach. exs. n.^o 28. — [Saramágó].

In arvis, cultis, etc. freq. in tota Lusitania! Ann. Vère.

R. sativus L. sp. 935; Brot. fl. lus. I. 574. — Rchb. l. c. t. 3, f. 4475. — [Rábão].

Colitur in hortis. Ann. Vère.

(Continua)