



**NARCISSORUM
NOTULÆ, XIV-XV**

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

FONTQUERIA **56(04)**: 31-36; **56(05)**: 37-48

MADRID, 28-XI-2009

FONTQUERIA is a series of botanical publications without administrative affiliation. It publishes original works in Botany, particularly those that are of interest to the editors. Its publications are in any language, the only limitation being the ability of the editorial team.

Accredited with the *International Association for Plant Taxonomy* for the purpose of registration of new non-fungal plant names.

PRODUCTION

Database consultant:	Guillermo GONZÁLEZ GARCÍA
Typesetting:	Ambrosio VALTAJEROS POBAR, Ulpiano SOUTO MANDELOS
Screen operators:	Samuel FARENA SUBENULLS, Emilio NESTARES SANTAINÉS
Preprinting:	Sonja MALDÍ RESTREPO, Demetrio ONCALA VILLARRASO

DISTRIBUTION

Postal distribution: Contact the editor
Mail for electronic distribution: Fontqueria@yahoo.com

EDITOR

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS. Madrid (MA)

EDITING CONSULTANTS for this fascicle

Matías MAYOR LÓPEZ (FCO)
María Eugenia RON ÁLVAREZ (MACB)

NARCISSORUM NOTULÆ, XIV

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. E-28014 Madrid (España)

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (28-xi-2009). Narcissorum notulæ, XIV. *Fontqueria* 56(04): 31-36.

Keywords. *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*); section \times *Apomedes* Fernández Casas & Susanna de la Serna; section \times *Bulbomedes* Fernández Casas (1984). Nomenclature, Chorology. New Nomospecies: *Narcissus* \times *Aguiarii* Fernández Casas, *N.* \times *matritensis* Fernández Casas. Spain, Portugal.

Abstract. Nomenclatural and chorological notes about five Iberian hybrids of *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*), sections \times *Apomedes* Fernández Casas & Susanna de la Serna (1981) and \times *Bulbomedes* Fernández Casas (1984). Two new hybrid species are proposed: *Narcissus* \times *Aguiarii* Fernández Casas [*N. rupicola* Dufour (1830) \times *N. triandrus* Linnaeus (1762), subsp. *triandrus*], and *N.* \times *matritensis* Fernández Casas [*N. cantabricus* De Candolle (1816) \times *N. pallidulus* Graells (1854)].

Résumé. Remarques nomenclaturales et chorologiques au sujet de cinq hybrides ibériques du genre *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*), sections \times *Apomedes* Fernández Casas & Susanna de la Serna, 1981, et \times *Bulbomedes* Fernández Casas (1984). Ils se décrivent deux espèces hybrides: *Narcissus* \times *Aguiarii* Fernández Casas [*N. rupicola* Dufour (1830) \times *N. triandrus* Linnaeus (1762), subsp. *triandrus*], et *N.* \times *matritensis* Fernández Casas [*N. cantabricus* De Candolle (1816) \times *N. pallidulus* Graells (1854)].

Resumo. Notas nomenclaturales e distribucionales a respeito de cinco espécies ambígenas ibéricas do género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*), das seções \times *Apomedes* Fernández Casas & Susanna de Serna (1981) e \times *Bulbomedes* Fernández Casas (1984). Descrevem-se duas espécies híbridas, *Narcissus* \times *Aguiarii* Fernández Casas [*N. rupicola* Dufour (1830) \times *N. triandrus* Linnaeus (1762), subsp. *triandrus*], e *N.* \times *matritensis* Fernández Casas [*N. cantabricus* De Candolle (1816) \times *N. pallidulus* Graells (1854)].

Resumen. Notas nomenclaturales y corológicas acerca de cinco híbridos ibéricos del género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*), de las secciones \times *Apomedes* Fernández Casas & Susanna de la Serna (1981) y \times *Bulbomedes* Fernández Casas (1984). Se proponen dos mestos nuevos: *Narcissus* \times *Aguiarii* Fernández Casas [*N. rupicola* Dufour (1830) \times *N. triandrus* Linnaeus (1762), subsp. *triandrus*], y *N.* \times *matritensis* Fernández Casas [*N. cantabricus* De Candolle (1816) \times *N. pallidulus* Graells (1854)].

Sección \times *Apomedes* Fernández Casas & Susanna de la Serna (1981)

Narcissus Linnaeus, nothosect. *Apomedes* Fernández Casas & Susanna de la Serna, *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 301 (1981)

– *Narcissus* sect. *Apodanthi* A. Fernandes (1969) \times sect. *Ganymedes* (Salisbury) Schultes f. (1830)

SPECIES TYPICA: *Narcissus* \times *rupidulus* Fernández Casas & Susanna de la Serna (1981)

***Narcissus* \times *rupidulus* Fernández Casas & Susanna de la Serna, *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 301 (1981)**

– *Narcissus pallidulus* Graells (1854) \times *N. rupicola* Dufour (1830)

INDICATIO LOCOTYPICA: «Madrid, Guadarrama: ad radices montis Cabeza Lijar dicti, 30T VL00, 1.700 m, in dumosis; solo petroso siliceo»

TYPUS: *A. Susanna de la Serna* 773, 25-V-1980 (herb. FJFC, holo-)

= *Narcissus* \times *Christiansenii* A. Fernandes, *Anuário Soc. Brot.* 49: 29-30, tab. 1 (1983)

- ≡ *Narcissus × rupidulus* Fernández Casas & Susanna nothosubsp. *Christianssenii* (Fernandes) Barra Lázaro, *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 350 (2002)
- ut *Narcissus rupicola* Dufour (1830) × *N. triandrus* Linnaeus (1762) subsp. *triandrus* (orig.); demum × *N. triandrus* Linnaeus subsp. *cernuus* (Salisbury) A. Fernandes (1993), A. FERNANDES (1993: 36)
- INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Lusitania, Herminiis Mont., loco dicto Penhas Douradas, in rupestribus»
- TYPUS: «Serra da Estrela: Penhas Douradas. Terrenos rochosos», *H. Christiansen s/n [1804]*, 18-V-1971 (COI, holo-)
- ILLUSTR.: A. FERNANDES (1983: tab. ii)
- BIBLIOGR.: F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1999: 9).

Hs, CÁCERES:

- 30STJ69 39.70°, -005.73°; Jaraicejo, «puerto de Miravete: a unos 600 m. En fisuras de cuarcitas», *F. J. Fernández Casas 8808 & A. Susanna de la Serna*, 18-III-1985 (herb. FJFC); E. DORDA ALCARAZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1989: 161 [anat.]).
- 30STJ97 39.52°, -005.38°; TJ9372, «Guadalupe: Sierra de Guadalupe, iuxta repetidor de TV, 39°28,330'N, 005°24,377'W, 4707 ft. In rupestribus siliceis apricis, septemtrionem spectantibus», *F. J. Fernández Casas Ff_09-104*, 31-III-2009 (herb. FJFC).

Hs, CIUDAD REAL:

- 30SUH76 38.53°, -004.43°; Fuencaliente, «Sierra del Rey: puerto de Niefla. Substrato siliceo», *E. Dorda Alcaraz 18b, R. Gamarra Gamarra & J. Pueche Uriá*, 22-II-1985 (herb. FJFC); E. DORDA ALCARAZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1989: 160 [anat.]).

Hs, MADRID:

- 30TVL11 40.79°, -004.00°; VL1919, «Rascafría: puerto de Cotos, 1650 m», *F. J. Fernández Casas 4605 & A. Susanna de la Serna*, 03-V-1981 (MA 227839).
- 30TVL32 40.88°, -003.77°; «Rascafría: Puerto de la Morcuera, inter oppidula Miraflores de la Sierra et Rascafría, ad 1500 m. In rupestribus siliceis», *A. Susanna de la Serna 853*, 24-IV-1982 (B s/n).

Hs, SEGOVIA:

- 30TVL00 40.70°, -004.12°; VL0306, «El Espinar: Alto de los Leones [de Castilla], 1550 m. In pratis; solo siliceo», *F. J. Fernández Casas 6682*, 09-V-1982 (B 100053232).

Hs, TOLEDO:

- 30TUK54 40.15°, -004.70°; «Real de San Vicente: cerca de la cumbre del Real de San Vicente. In rupestribus siliceis apricis, septemtrionem spectantibus», *F. J. Fernández Casas Ff_09-063*, 18-III-2009 (herb. FJFC).
- 30TUK54 «Real de San Vicente: cerca de la cumbre del Real de San Vicente. In rupestribus siliceis apricis, septemtrionem spectantibus», *F. J. Fernández Casas Ff_09-108*, 06-IV-2009 (herb. FJFC).

PORTUGAL, (11) GUARDA:

- 29TPE26 40.35°, -007.53°; «Serra da Estrela: Penhas Douradas. Terrenos rochosos», *H. Christiansen 1804*, 18-V-1971 (COI, holo-; typus *N. × Christianssenii*).

***Narcissus × Aguiarii* Fernández Casas, *nothospec. nov.*, Fontqueria 56(04): 32-34 (28-xi-2009)**

- *Narcissus rupicola* Dufour (1830) × *N. triandrus* Linnaeus (1762), subsp. *triandrus*
- INDICATIO LOCOTYPICA: «Bragança, freguesia de Grijó de Parada, Cabeço da Freira, junto ao rio Sabor»
- TYPUS: *C. Aguiar 1159*, 18-IV-1991 (COI, holo-)
- *Narcissus × Christiansenii* A. Fernandes, T. Leitão & C. Aguiar, *Anuário Soc. Brot.* 58: 35-45 (1993), non A. Fernandes, *Anuar. Soc. Brot.* 49: 29-30, tab. 1 (1983) quod est *N. × rupidulus* Fernández Casas & Susanna (1981)
- ut *Narcissus rupicola* Dufour (1830) × *N. triandrus* Linnaeus subsp. *cernuus* (Salisbury) A. Fernandes (1993), e protologo emendato, sed sphalm.
- ILLUSTR.: A. FERNANDES, M. T. LEITÃO & C. AGUIAR (1993: tab. 13, pag. 38).

DIAGNOSIS LATINA, cf. A. FERNANDES, T. LEITÃO & C. AGUIAR, *Anuário Soc. Brot.* **58**: 35-36 (1993)

A *Narcisso triandro* intlorescentia 2-3-flora nec 1-6(8)-flora; *pedicellis* usque ad 30 mm longis, rectis vel leviter curvatis; *floribus* erectis vel ascendentibus nec dependentis; *corona* 6 mm alta margineque crenulata, nec 10 mm alta margineque integra; *tubo* luteo-viridi, 15-17 mm longo, superne plus minusve incurvato; *tepalis* patentibus vel plus minusve reflexis, 10 × 4 mm, *apice* acutis et apiculatis nec admodum reflexis basim tubi attingentibus vel excedentibus, differt.

Ad *Narcissum rupicolam* corona et tepalorum forma accedit, sed ab illo inflorescentia 2-3-flora neque uniflora; *pedicellis* usque 30 mm longis neque pedicello nullo vel brevi; *tubo* perianthii 15-17 mm neque usque ad 22 mm longo; *tepalis* sæpe modice reflexis nec patentibus. Propter colorem perianthii intermedius inter *Narcissum rupicolam* et *N. triandrum* est.

ORIGEN DEL RESTRICTIVO específico y su prosodia

Dedicado a su descubridor, Carlos AGUIAR, profesor en la “Escola Superior Agrária” de Bragança (Portugal). La pronunciación es llana, a-guiá-rii.

OBSERVACIONES

A. FERNANDES, T. LEITÃO & C. AGUIAR (1993: 35s) publicaron este mesto de las proximidades de Bragança, bajo el nombre de *Narcissus* × *Christiansenii* A. Fernandes (1983); poco después o al mismo tiempo, A. FERNANDES (1993: 36) insistió en tal identificación. Ese nombre corresponde a un mesto descrito de la Serra da Estrela, y es un sinónimo tardío de nuestro *N. ×rupidulus* Fernández Casas & Susanna (1981). El hecho de que la publicación fuese acompañada de una descripción/diagnosís latina bastante completa –justamente la que nosotros empleamos aquí arriba, ligeramente modificada– nos induce a pensar que creyeron que se trataba de un mesto nuevo, al menos al principio; y eso mismo seguimos pensando nosotros ahora.

Aunque las dos notoespecies –*Narcissus* × *rupidulus*, *Narcissus* × *Aguiarii*– sean muy parecidas, y que la variabilidad de sus individuos sea grande, como en casi todos los híbridos naturales que conocemos, difieren de un modo que estimamos absoluto por su diferente especie generatriz, la correspondiente a la sección *Ganymedes*. La especie parental de la sección *Apodanthi* que los portugueses atribuyen a su mesto es coincidente con el que señalamos nosotros, ella es *Narcissus rupicola* Dufour (1830); que ahí no hay ningún problema. Es en la especie parental de la sección *Ganymedes* donde se centra la diferencia. Los autores portugueses consideran que tanto en la Serra da Estrela como en Bragança se cria el mismo taxo, al que llaman *N. triandrus* subsp. *cermuus* (Salisbury) A. Fernandes (1993); por ello, al considerarlos hijos de los mismos padres, suponen idénticos ambos mestos, pese a sus diferencias morfológicas, evidentes pero también inherentes a su naturaleza mestiza.

Nuestros repetidos estudios de campo, nos han conducido a establecer que de la sección *Ganymedes* (Salisbury) Schultes f. (1830) no existe en toda la Serra da Estrela otra especie que *Narcissus pallidulus* Graells (1854); y que en todo el norte lusitano no hay otra que *N. triandrus* Linnaeus (1762) subsp. *triandrus*.

Me sabe mal contradecir a mi añorado maestro el profesor Abílio Fernandes, tanto por razones personales como por el enorme respeto que me merece su síntesis de la sección *Ganymedes*, A. FERNANDES (1993), trabajo modélico en muchos aspectos, elaborado con gran laboriosidad y destreza. Por otra parte, soy consciente de no haber resuelto algunos aspectos importantes de la sección *Ganymedes*, como su nomenclatura sin ir más lejos, lo cual no me permite insistir en mi buen conocimiento del grupo, que me gustaría hacerlo. Pero sí creo haber entendido bien las poblaciones ibéricas en el campo, y puedo insistir en que, formas y pequeñas variedades aparte, en la península sólo pueden distinguirse con claridad tres taxos: *Narcissus triandrus* en el amplio NW atlántico, *N. pallidulus* en casi toda la península de clima mediterráneo, y *N. lusitanicus*

localizada en las cercanías de Ferreira do Zêzere (Santarem, Portugal); la última especie se encuentra rodeada, por el sur, norte y oeste, por la segunda, y nunca entra en contacto con la primera. En todo ello me atrevo a insistir, a pesar de algún desliz distribucional que se me ha escapado hace tiempo, y que al parecer resultó estolonífero.

Tal visión de la sección *Ganymedes* la logré durante los primeros años que dediqué al estudio del género, y me llegó de mano de los estudios anatómicos. El corte transversal de la hoja es el carácter más firme y sólido que permite separar sin ambigüedades *N. triandrus* de *N. pallidulus*; presenta hechuras cualitativas fáciles de observar y que carecen de excepciones conocidas, lo cual es bien raro en el género, cf. E. DORDA ALCARAZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1989; 1994).

PORTUGAL, (05) **BRAGANÇA**:

- 29TPG83** 41.87°, -006.78°; «(Bragança) fregresia Grijó de Parada: cabeço da Freira, junto ao rio Sabor», *C. Aguiar 1159*, 18-IV-1992 (COI, holo-; typus *N. × Aguiarii*); A. FERNANDES, M. T. LEITÃO & C. AGUIAR (1993: 36, tab. 13).
- 29TPF96** 41.24°, -006.68°; «Mogadouro: Brincó, junto à estrada Mogadouro - Moncorvo, 100 m antes da plaça do Conselho de Freixo de Espada à Cinta, alt. 650 m aprox. Planalto con afloramentos graníticos», *C. Aguiar s/n*, 28-III-1993 (COI [2]).

Sección ×**Bulbomedes** Fernández Casas (1984)

Narcissus Linnaeus, sect. ×*Bulbomedes* Fernández Casas, Fontqueria 6: 36-37, n° 35 (1984), ut hybr. sect. *Bulbocodium* De Candolle (1815) × sect. *Ganymedes* (Salisbury) Schultes f. (1830)

SPECIES TYPICA: *Narcissus litigiousus* del Amo (1861), hoc loco proposita

Narcissus ×**litigiousus** del Amo, Rest. Farm. 1861: 8, col. 1 (1861), ut nomospecies

INDICATIO LOCOTYPICA: «In cacumine collis "del Martinete", prope Granatam, locis petrosis pudingæformibus, ad 700 m, Habitat floretque cum præcedente in eodem tempore iisdemque locis sed rarior»

TYPUS: GDA?, non vidi.

- *Narcissus albicans* (Haworth) Sprengel (1825) × *N. pallidulus* Graells (1854)
 - ≠ *Narcissus* ×*matritensis* Fernández Casas (2009), quod est *Narcissus cantabricus* De Candolle (1816) × *N. pallidulus* Graells (1854)
 - = *Narcissus* ×*Susanne* Fernández Casas, Exsiccata quædam a nobis nuper distributa, III (163-253): 13-14, n° 250 (1980)
- INDICATIO LOCOTYPICA: «Ciudad Real: pr. oppidulum Puertollano, loco dicto Monte del Tío Pedrillo, 30SVH08, ad 850 m, in pascuis, solo siliceo»
- TYPUS: *F. J. Fernández Casas 2963*, *J. López López*, *J. F. Muñoz Garmendia*, *A. M. Pons-Sorolla y Ruiz de la Prada* & *A. Susanna de la Serna*, 01-III-1980 (BC 633243; C, loan 107/2003: 337; herb. FJFC, holo-; G 177219; herb. M. LAÍNZ; M; NY; RNG)
- = *Narcissus* ×*Susanne* Fernández Casas nm. *montielanus* Barra & G. López, Anales Jard. Bot. Madrid 39(1): 76 (1982)
 - ≡ *Narcissus* ×*Susanne* Fernández Casas nothosubsp. *montielanus* (Barra & G. López) Barra & G. López, Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 202 (1984)
 - ≡ *Narcissus* ×*montielanus* (Barra & G. López) Barra & G. López, Anales Jard. Bot. Madrid 50(1): 123, col. 2 (1992)
 - ut *Narcissus cantabricus* De Candolle subsp. *luteolentus* Barra & G. López (1982) × *N. pallidulus* Graells (1854)

INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat inter parentes prope montes Cabeza de Buey (Ciudad Real, Cozar), loco dicto Los Morriones, ad 950 m, solo petroso cuarcítico, VH8376, n.º 2305 GF, 31-III-80, *A. Barra*, *G. López* & *R. Morales* (Holotypus MA 217834) et in pascuis iuxta viam Villapalacios-Albadalejo (Albacete), solo siliceo ad 720 m, WH 2971, n.º 5428 bis EV, 6-III-80, *G. López*, *R. Morales*, *F. Muñoz* & *E. Valdés* (fig. 6)»

TYPUS: *A. Barra Lázaro*, *G. López González 2305*, *R. Morales Valverde*, 31-III-1980 (MA 217834, holo-)

- ?– *Narcissus* × *Abilioi* Rivas Martínez in sched. (MAF 87674), non *N.* × *Abilioi* Fernández Casas, Bol. Soc. Brot., sér. 2, 53: 645 (1980), quod est *N. Fernandezii* Gomes Pedro (1947) × *N. Bulbocodium* Linnaeus (1753)
- *Narcissus* × *Muñozii-Garmendie* A. Fernandes, Mem. Acad. Ciênc. Lisboa 32: 37 (1993), non Fernández Casas, Exsiccata quædam a nobis nuper distributa, IV (254-500): 21, n° 468 (1981), quoad ad sectionem *Pseudonarcissum* pertinet
- ILLUSTR. A. BARRA LÁZARO & G. A. LÓPEZ GONZÁLEZ (1982: 76, fig. 6); F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1984: 47, n° 60); F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1987: 18, n° 79); J. L. HERVÁS SERRANO (1992: 74-75); F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1998: 155, tab. 4, fig. 1, 4).
- ILLUSTR. (photo-): J. W. BLANCHARD (1990: 86, fig. 34, ut *N. Muñozii-Garmendie*); F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2005: 5, lam. i; 6, lam. ii).
- DISTR. GEOGR.: Badajoz, Ciudad Real, Granada, Toledo, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2005: tab. 1035, pag. 3).

***Narcissus* × *matritensis* Fernández Casas, nothospec. nov., Fontqueria 56(04): 35 (28-xi-2009)**

TYPUS: *F. J. Fernández Casas & C. Soriano Martín*, 27-III-1985 (herb. FJFC, holo-)

BIBLIOGR.: M. A. RIVAS PONCE, C. SORIANO MARTÍN & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1985: 129-130)

– *Narcissus cantabricus* De Candolle (1816) × *N. pallidulus* Graells (1854)

?= *Narcissus* × *Susannæ* Fernández Casas nothovar. *toletanus* Fernández Casas & Luceño Garcés, Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 187-188, tab. [1], fig. 3 (1986)

≡ *Narcissus* × *litigiosus* del Amo nm. *toletanus* (Fernández Casas & Luceño Garcés) Fernández Casas, Fontqueria 55(34): 271 (2005)

INDICATIO LOCOTYPICA: «Toledo, Almorox: loco dicto Pinar de Almorox, 30TUK85, ad 550 m»

TYPUS: *M. Luceño Garcés*, 24-III -1983 (MA 265445, holo-)

≠ *Narcissus* × *Susannæ* Fernández Casas (1980), quod est *Narcissus albicans* (Haworth) Sprengel (1825) × *N. pallidulus* Graells (1854)

≠ *Narcissus* × *litigiosus* del Amo (1861), quod est *Narcissus albicans* (Haworth) Sprengel (1825) × *N. pallidulus* Graells (1854)

ILLUSTR.: F. J. FERNÁNDEZ CASAS & M. LUCEÑO GARCÉS (1986: 188, tab. [1], fig. c); M. A. RIVAS PONCE, C. SORIANO MARTÍN & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1985: 127, tab. 1, figæ. 1, 1a, 1b, ut *N.* × *Susannæ*).

ILLUSTR. (photo-): F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2005: tab. ii, fig. 2b, pag. 6).

DIAGNOSIS LATINA vel character essentialis

Characteres inter eos parentum proprios omnino intermedii. FOLIA angosta, humistrata vel suberecta, dorso leviter striata, asymmetrica. FLORES 1-3, pallide lutei, subpatenti vel modice nutanti; *pedunculi* 4-10 mm longi; *spatha* aliquatenus fusca; *antheris* insertis.

ORIGEN DEL RESTRICTIVO específico y su prosodia

El nombre se toma del gentilicio latino de Madrid, en cuya provincia se ha descubierto el tipo. Es una voz llana, se pronuncia ma-tri-tén-sis.

HS, MADRID:

30TVL20 40.70°, -003.89°; VL2902, «Colmenar Viejo: inter oppidula Colmenar Viejo et Hoyo de Manzanares, 900 m. In pascuis siccis apricis: solo sabuloso siliceo», *F. J. Fernández Casas & C. Soriano Martín*, 27-III-1985 (herb. FJFC, holo-; typus *N.* × *matritensis*).

***Narcissus* × *Ernii* Fernández Casas, Fontqueria 3: 23-25, n° 3 (1983)**

≡ *Narcissus* × *Fosteri* R. Irwing Lynch nothosubsp. *Ernii* (Fernández Casas) Barra & G. López, Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 203 (1984)

– *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus (1753) subsp. *Bulbocodium* × *N. triandrus* Linnaeus (1762), subsp. *triandrus*

INDICATIO LOCOTYPICA: «León, sed pr. oppidulum Guardo (Palencia), C-615, km 90, 30T UN43, ad 1100m, in pratis»

- TYPUS: *A. Ceballos Jiménez, H. Ern & F. J. Fernández Casas 3100*, 11-V-1980 (herb. FJFC)
 = *Narcissus × raianus* A. Fernandes, Leitão & Aguiar in A. Fernandes, Mem. Acad. Ciênc. Lisboa 33: 37 (1992)
- ut *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus (1753) subsp. *Bulbocodium × N. pallidulus* Graells subsp. *lusitanicus* (Dorda Alcaraz & Fernández Casas) A. Fernandes (1992)
 INDICATIO LOCOTYPICA: «Portugal: Concelho de Bragança, S. Martinho de Angueira»
 TYPUS: *J. Castro & A. D. da Fonseca Rozeira s/n*, 07-IV-1954 (COI, holo-; PO 8439, iso-)
- [=] *Narcissus × Sampaianus* A. Fernandes, Mem. Acad. Ciênc. Lisboa 33: 38 (1992), sine lat. descr.
- ≡ *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus (1753) × *N. reflexus* Brotero (1804), A. Fernandes, Bol. Soc. Brot., sér. 2, 13: 81-83 (1934)
- ut *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus (1753) subsp. *Bulbocodium × N. triandrus* Graells subsp. *cernuus* (Salisbury) A. Fernandes (1992)
 “INDICATIO LOCOTYPICA”: «Serra do Gerez: pr. Ponte da Maceira»
 “TYPUS”: *A. Fernandes, F. A. Mendonça & G. A. da Silva Ferreira Sampaio*, iv-1931 (COI)
- ILLUSTR.: A. FERNANDES (1934: lam. vi, figæ. 27, 28).

PORTUGAL, (05) BRAGANÇA:

- 29TPG83** 41.87°, -006.78°; «Bragança: monte de São Bartholomeu. No monte», *Bessa & A. D. da Fonseca Rozeira s/n*, 01-IV-1954 (PO 8438).
- 29TQG00** 41.60°, -006.55°; Jardim Botânico. De bolbos trazidos de «Vimioso: Angueira. Num Lameiro», *J. Castro & A. D. da Fonseca Rozeira s/n*, 07-IV-1954 (COI, non vidi, holo-; typus *N. × raianus*).
- 29TQG00** «Vimioso: Angueira. Num Lameiro», *J. Castro & A. D. da Fonseca Rozeira s/n*, 07-IV-1954 (PO 8439, iso-; typus *N. × raianus*).

AGRADECIMIENTOS

A mi colega José Félix Muñoz Garmendia, por su auxilio documentalista.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARRA LÁZARO, A. & G. A. LÓPEZ GONZÁLEZ (1982). Notas sueltas sobre el género *Narcissus* en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* **39**(1): 67-78.
- BLANCHARD, J. W. (1990). *Narcissus, a guide to wild daffodils*. [i-v]vi+7-203 págs. Alpine Garden Society.
- DORDA ALCARAZ, E. & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1989). Estudios morfológicos en el género *Narcissus* L. Anatomía de hoja y escapo, III. *Fontqueria* **27**: 103-162.
- DORDA ALCARAZ, E. & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1994). Estudios morfológicos en el género *Narcissus* L. Anatomía de hoja y escapo, IV. *Fontqueria* **39**: 69-150.
- FERNANDES, A. (1934). Nouvelles études caryologiques sur le genre *Narcissus* L. *Bol. Soc. Brot., sér. 2*, **9**: 3-198.
- FERNANDES, A. (1983). Deux hybrides de *Narcissus* spontanés au Portugal. *Anuário Soc. Brot.* **49**: 29-31.
- FERNANDES, A. (1993). Sobre a secção *Ganymedes* (Salisb.) Schultes fil. do género *Narcissus* L. *Mem. Acad. Ciênc. Lisboa* **32**: 3-39.
- FERNANDES, A., M. T. LEITÃO & C. AGUIAR (1993). Sobre a ocorrência de duas novidades de *Narcissus* L. no nordeste de Portugal. *Anuário Soc. Brot.* **58**: 13-45.
- FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (1984). Remiendos y enmiendas en el género *Narcissus* L. *Fontqueria* **6**: 35-50.
- FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (1987). A vueltas con los narcisos. *Fontqueria* **14**: 17-22.
- FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (1998). *Narcissorum notulæ*, III. *Fontqueria* **48**: 151-156.
- FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (2005). Asientos para un atlas de la flora occidental, 28. *Adumbr. Summæ Ed.* **11**: 1-8.
- FERNÁNDEZ CASAS, F. J. & M. LUCEÑO GARCÉS (1986). Un nuevo mestizo de *Narcissus* en Toledo. *Anales Jard. Bot. Madrid* **43**(1): 187-188.
- HERVÁS SERRANO, J. L. (1992). Cuatro plantas con bulbo de Jaén. *Blancoana* **10**: 74-75.
- RIVAS PONCE, M. A., C. SORIANO MARTÍN & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1985). Ocho narcisos en una localidad de Colmenar Viejo. *Anales Jard. Bot. Madrid* **42**(1): 125-132, 3 tab.