

no 259
F-2298 Caja Pau
BOTANICA (U.C. NAT.) 4(2): 95-96

Sinonimias de algunas plantas (1935)

POR C. PAU

Thymus vulgaris L., var. *hirtus* = *Thymus hirtus* Willd. = *Th. diffusus* Salzm. = *Th. Willdenowii* Boissier, *Voy. bot.*, tab. 166.

La estampa del *Voyage botanique*, por carecer de pestañas en la base de las hojas, pertenece sin duda de ninguna clase, al *Th. vulgaris* L.; y del que es también otro sinónimo el *Th. difusus* Salzm.; que como ya nos advirtió Bentham, *Prodr.*, XII, 498, solamente difiere del *Th. vulgaris* por su tallo esparcido (caul. diffusus).

Pero Boissier, además incluyó en su *Th. hirtus* otra forma perteneciente, por las hojas pestañosas, al tipo linneano *Th. Zygis*; como es su variedad *erianthus*. Esta heterogénea agrupación fué causa de que Willkomm, *Prodr. fl. hisp.*, II, p. 401, diera su *Th. hirtus* con hojas « margine basim versus hirtociliatis », cuando según la estampa de Boissier carece de pestañas. En cambio, véase en la representación del *Th. tenuifolius* Boissier (non Miller) = *Th. Zygis* L. forma *genuina*, bien manifiestas estas pestañas de las hojas; cuando tampoco faltan las pestañas en la variedad *erianthus*, según los ejemplares de mi colección, procedentes de la Texea, Alpujarras, etc.

Willkomm incluye en su *Th. hirtus*, cierta planta de tallos difusos, algo vellosos, que abunda en la provincia de Madrid, y que no puede separarse del *Th. Zygis*, más que como variedad; atendiendo a su mayor robustez, vestidura y ser desparramada. Esta planta se me comunicó como *Th. hirtus*; pero, no puede serlo, por que la planta que he visto del Jardín Bot. de Berlín, carece de pestañas en su base foliar.

Boissier también comparó con el *Th. vulgaris* la planta de Gibraltar, juzgándola « bien différente »: pero, no hay que estrañarlo, teniendo en cuenta que no lo hizo con el tipo de Linné; sino que con su *Th. vulgaris* que pertenecía al *Th. glandulosus* Lag. = *Th. hyemalis* Lange = *Th. Reuteri* var. *ericoides* Rouy.

Afirmó Boissier, con verdadera interpretación, que su forma típica denominada *legitimus*, por sus tallos rastreros y flores rosadas tiene afinidades remotas con el *Th. Serpyllum*. Realmente; eso mismo pude yo apreciar cuando vi el ejemplar del Museo Botánico Berolínense, y que debo a la amabilidad del Dr. Diels y a la amistad del Sr. C. Faust.

Thymus tomentosus Willd., *Enumer.*, p. 626. — El autor lo da con hojas tomentosas y el *Th. tomentosus* de los Autores no presenta tomentosas las hojas. Bentham, *Prodr.*, XII, 498, lo presenta con el signo de admiración, y lo da con las hojas apenas pecioladas y tomentosas; pero solamente las jóvenes; y Willkomm omite en su frase el carácter tomentoso de las hojas Boissier, *Voy bot.*, p. 487, tampoco da las hojas

Re 18. 951

tomentosas en su variedad *micranthus*; pues, se reduce a decir, que las hojas son mas obtusas y mas espatuladas.

Cervia disperma = *Cervia saturejaefolia* Rodriguez, in Lagasca, *gen. et sp.*, p. 7 (1816) = *Lithospermum dispernum* L. = *Messerschmidia cancellata* Asso. = *Rochellia stellulata* Rehb.

«Genus novum est Borraginearum, Hydroleae affine. *Saturejae hortensis* facie». Sevilla (Lagasca).

Arenaria Arenaria = *Stellaria Arenaria* L. (1753) = *Arenaria hispanica* Sprengel, *Syst. veget.*, II, p. 396 (1825) = *A. baetica* Pau (1895) = *A. falax* Batt., *Soc. bot. franc.*, p. 419 (1912) = *A. spathulata* Boissier, Willkomm, Lange, Ball.

Desconozco de la Península la *Arenaria spathulata* Desf; por este motivo, propuse en mis *Notas botánicas* el de *A. baetica*; que substituí con otra denominación, cuando me apercibi de que Salzmann habia dado este nombre a otra especie. Aunque naciera especie muerta.

Silene rubella L., var. *Bergiana* Gurque, *Pl., eur.*, II, 2, 305 (1899) = *S. Berjiana* Lindm, *Hort. berg.*, I, n. 6, p. 3 (1891).

La poseo en mi colección de Portugal (Daveau), Barcelona (Pujol). Es frecuente en Marruecos: Alcazaba de Zeluan (Pau), Metalza (Sennen y Mauricio), Daxar Riffien (Aterido), Ben Karrik (Mas Guindal), Tanger (Pau), Zerhun (Jahandiez), Voluvilis (Maire) y Oran (Alleizette).

Es una forma probablemente inconstante y apenas diversa del tipo, que yo herboricé en los muros de Zeluan el año 1910 y que puede verse en la *Flora selecta* de Ch. Magnier, n. 2149, procedente de Portugal.

Stachys cretica L. = *St. herachlea* All. — Willkomm, Suppl., p. 133, dice: «Delendum nomen *S. cretica*, quae in Hispania non provenit». Briquet, en cambio, *Les Labiées des Alpes maritimes*, partie II, p. 230, en su observación tercera, escribe: «Le *Stachys cretica* L., ... cette espèce doit être laissée de côté comme indéchiffrable». Sin embargo: Linné conigna un caracter muy decisivo para determinar esta especie, y que el mismo Briquet cita también; por que *Cal... manum valde pungentes*, creo que si es suficiente, para separar la *St herachlea* de sus afines.

Onobrychis Reuteri Leresche (Willk., *Illustr.*, tab. 91). — Planta cultivada escapada del cultivo. Su robustez lo demuestra.

Carduncellus hispanicus Boiss., var. *araneosus* — *C. araneosus* Boiss. Lo mismo creemos del *C. Pomelianus* Batt. = *C hispanicus* Boiss., var. *Pomelianus*.

Peucedanum peucedanoides = *P. uliginosum* Lk. = *P. lancifolium* Lange., var. *aragonense* = *P. aragonense* Rouy et Camus.

Valle de Ocón, Ruedas, Vallehondo (Cámara), Moncayo (B. Vicioso), Orihuela del Tremedal (Pau), Sierra de Albarracin (Reverchon).

Stachys Foucauldiana Maire et Sennen, ap. Sennen, *Pl. d'Espagne*, n.º 8885 (1933) = *St. arvensis* × *Ocymastrum* Pau.

La poseía en mi herbario de Túnez (Djebel-Djelud — leg. Pitard.) inédita.