


PERIÓDICO

DE LA SOCIEDAD MÉDICO-QUIRURGICA DE CADIZ.

TOMO CUARTO.

CÁDIZ: AÑO DE 1824.



IMPRESA DE LA CASA DE MISERICORDIA.



PERIÓDICO

DE LA SOCIEDAD MÉDICO-QUIRURGICA DE CADIZ

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 1824.

BOTANICA.

Descripcion de dos plantas nuevas halladas en los con-
tornos de Sevilla, y noticia de otras varias que se
crian con ellas; remitida por el Dr. D. Mariano La-
gasca, en 27 de junio de 1823.

Un suceso extraordinario me ha privado en un momento del fruto de veinte y ocho años de fatigas, de todos mis manuscritos, de mis mas preciosos libros, de lo mas rico que poseía de la familia de las aparasoladas, del difícilísimo género *Carex*, de toda mi coleccion de helechos que me gloriaba ser una de las mejores de Europa, de todos los materiales de la familia de las *chanantoforas*.....y de otros objetos preciosos é inéditos que correspondían á muy ilustres ingenios. Ansioso de no privar á mi patria de las observaciones que vaya haciendo en los diferentes seres que me ofrece mi incesante estudio en la ciencia de los vegetales, remito á la Sociedad las descripciones de dos plantas nuevas que observé en los primeros dias del presente mes, y la noticia de otras varias que se crian con ellas. Estas descripciones deberán acaso rectificarse con la inspeccion de las plantas, pues las he hecho de memoria; á pesar que creo no me engaña esta, porque las había estudiado y descrito con mucho detenimiento. En momentos mas felices acaso determinaré formar un catálogo comprensivo de las plantas espontáneas, de las conaturalizadas en España, y de las que se cultivan en los jardines botánicos de la península, que podrá

A

Este periódico se publica mensualmente, y consta de 16 á 24 páginas. Se suscribe en Badajoz en la oficina de farmacia de D. Isidro Rosa y Romero, en Barcelona en la de D. Jacinto Compta, en Cádiz en la de D. Nicolas Carmona, en Córdoba en la de D. José Búrgos, en la Coruña en la de D. Calisto Garcia, en Granada en la de D. Francisco Javier Argüelles, en Huelva en la de D. Francisco Javier Iturralde, en Jaén en la de D. Bernardo Vasallo, en Málaga en la de D. Tiburcio Vigil, en Ronda en la de D. Antonio Gonzalez, en Santander en la de D. Antonio Cuesta, en Sevilla en la de D. Pedro Gatica, y en Valencia en la de D. Agustin Alcon, á razon de 30 rs. vn. anuales, en las cuales se hallarán tambien de venta ejemplares sueltos y colecciones completas de los años anteriores. Los Sres. socios de todas clases acudirán á los respectivos depósitos de la provincia en que residen, á recoger el ejemplar que les remite puntualmente la Sociedad.

(2)
servir de base para formar la obra botánica verdaderamente española, que muchos años há habia concebido, y pensaba principiar á publicar muy pronto en Sevilla ó en esta capital.

MALVA anodæformis.

MALVA anodæformis: foliis inferioribus reniformi-orbiculatis angulatis, superioribus digitatis palmatisve crenato-dentatis, pedunculo axillari elongato unifloro multo brevioribus; calyce exteriori triphylo.

A. caule simplici vel simplicissimo.

B. caule ramoso.

Planta herbacea, anual, de un gemo á un pié ó mas de alta, poblada de pelo áspero, especialmente en el tallo, ramos, peciolo, pedúnculos y mitad inferior del caliz.

La raiz fibrosa, perpendicular, sencilla = Tallo derecho rollizo, con tuberculitos purpúreos, de que nacen los pelos casi cerdosos que lo visten, sencillo en la variedad *A.*, con ramos mas ó ménos abiertos parecidos á él en la variedad *B.* = Hojas inferiores arriñonado-arredondadas, con vello áspero, anguladas, festonado-dentadas, mas cortas que los peciolo; las superiores mas largas que los mismos, palmeadas ó digitadas con gajos alancillados por lo comun; festonado-aserradas, mucho mas cortas que los pedúnculos, que nacen de sus sobacos = Pedúnculos solitarios, unifloros, derechos, filiformes, oscuramente articulados cerca del caliz = Caliz exterior de tres hojuelas angostas, lineares-alancilladas agudas mucho mas cortas que el caliz interior; este profundamente hendido en cinco lacinias alancilladas, agudas = Corola de color de carne, mas larga que el caliz; parecida á la de la *Anoda dilleniana* = Cajas mucho mas pequeñas que el caliz.

Observacion. Esta especie es parecida á la *Malva papaver* de Cavanilles, junto á la cual debe colocarse, pero diversa segun aparece de la descripcion que acabamos de dar.

Se cria en los ribazos, eriales, y en los olivares

(3)
entre San Juan de Alfarche y el camino de Tomares la variedad *B.* la coji en Goria del Rio en sitios húmedos, yendo al pago llamado Coto del Rey.

La he visto en flor desde mediados de mayo hasta el 7 de junio, y conjeturo que florecerá hasta entrado julio.

Observacion. Juntas con esta planta, me acuerdo que se crian las siguientes entre San Juan de Alfarche y el camino de Tomares.

Malva parviflora. L. y nieensis. Cav. Lavatera operculata, y cretica. Raphanus raphanistrum. Biscutella auriculata. Sinapis arvensis, alba, y foliosa W. Senebiera coronopus. Dec. Rapistrum rugosum Cav. Sisymbrium irio y catholicum. Fumaria officinalis, spicata, parviflora y capreolata. Caucalis nodosa, arvensis, muricata, y mauritanica Lag. Scrophularia mellifera. Desf. y sambueifolia. Cynoglossum clandestinum Desf. y pictum Ait. Cerinthe major L. varietas floribus violaceis. Echium plantagineum, y vulgare. Heliotropium europæum. Lonicera caprifolium. Thapsia villosa. L. y Thap. intermedia Lag. Lycium europæum. Phlomis purpúrea, Stachys cretica. Cistus salicifolius; y una especie nueva parecida al Cistus niloticus. Smilax aspera. Polygala monspeliensis? Trifolium seabrum, marinum. Smith. Astragalus pentaglottis, y hamosus. Scorpiurus muricata y subvillosa. Ornithopus compressus; y scorpioides. Anagallis cærulea, phonicea, y Monelli. Asparragus acutifolius y albus. Una rosa de flor blanca muy hermosa que no determiné. Bromus mollis, L. phlevides Lag. var. floribus hirtis; y otra especie que me parece nueva; panicula subnutante oblonga, spiculis oblongo-lanceolatis multistoris, pubescentibus, aristis divaricatis. Avena sterilis, fragilis L. y hirtula Lag. Anthoxanthum ovatum. Lag. Marrubium vulgare. Delphinium pentagynium. Desf. Pieridium tin-gitanum Desf. Anthemis valentina, tomentosa y cotula. Centaurea calcitrapa, y pullata. Cardus crispus. Sylibum marianum Gertn. Calendula arvensis. Thrinicia hirta. Aristolochia bætica y longa. Vinca minor. Dactylis glomerata. Cynodon dactilon. Phalaris bulbosa L. y quadrivalvis Lag. Briza minor y máxima, y otras muchas de que ahora no me acuerdo.

(4)

En el Coto del Rey perteneciente á Coria del Rio ví á mas de muchas de las plantas arriba enumeradas las siguientes: *Malva hispánica*. *Thapsia fatida* L. et Lag. *Seseli ammoides* Lin. (Gen. nov. Lag) *Cachrys sicula*. *Cistus albidus*, *crispus*, y *thymifolius*. *Lavandula sthæcas*, *Scorpiurus vermiculata*. *Nigella hispánica*. *Herniaria annua* Lag. *Polycarpon tetraphyllum*. *Læstingia bætica* Lag. *Oenanthe peucedanifolia* W. y *globulosa* L. *Satureja capitata*. *Ornithopus compressus*, y *nudiflorus* Lag. y la siguiente especie nueva de *Ononis*.

ONONIS subspicata: *foliis ternatis, foliolis oblongis truncatis dentato-serratis, stipulis semicordatis dentatis: racemis subspicatis terminalibus aphyllis; bracteis cordatis pedicello longioribus.*

Planta herbacea, ¿ anual? cubierta de vellito suave muy corto y viscoso.

Raiz fibrosa sencilla, perpendicular con algunas fibrillas capilares, de un blanco sucio. = Tallo esparramado, tendido, ó ascendente, y á veces casi derecho, rollizito, ramoso, del grueso de un bramante poco mas ó ménos, de medio á un pié y mas de largo. = Ramos y ramillos parecidos al tallo, terminados como este en un racimo de flores. = Hojas pecioladas con tres hojuelas, las superiores á veces con una sola: hojuelas prolongaditas, planas, truncadas, dentado-aserradas, las laterales casi sentadas, la terminal mayor y peciolada y como unas ocho líneas de largo. = Estípulas medio acorazonada dentadas, pegadas por su margen á la base del peciolo, y mucho mas cortas que este. = Racimos espigados, terminales, solitarios, de una á dos pulgadas de largo, con siete á diez y seis flores cada uno, pedunculados. = Pedunculillos muy cortos, sin arista, mas cortos que la bractea acorazonada, casi abrazadora y casi siempre enterísima, que hay en la base de todos ellos. = Caliz profundamente hendido en cinco lacinias casi iguales, plano-alesnadas, mas cortas que la corola. = Corola parecida á la de la *Ononis spinosa*: estandarte de un rosa hermozo, rayado: alas casi doblemente mas cortas que el estandarte, trasovado-oblongas, de un blanco sucio: qui-

(5)

lla puntiaguda del color de las alas excepto en la punta que es amarillenta. Legumbre casi rolliza, vellosita, con cuatro semillas reniformes, casi igual al caliz.

Se cria con muchísima abundancia en sitios arenosos en el referido coto del Rey y especialmente junto al camino.

Florece por mayo y junio, y me parece planta anual.

Observacion 1.^a Debe colocarse junto á la *ononis hispida* del Desfontaines.

Observacion 2.^a La he visto comida frecuentemente por el ganado, pero ignoro cual sea el que la paste.

Observacion 3.^a Acompañan á esta planta la *Corrigiola litoralis*, la *Loeflingia bætica*, que tiene la corola mas larga que el caliz y cinco estambres, la *Festuca alopecurus*, Schobz. y otras dos especies que no puedo en este momento denominar, una de ellas muy semejante á la *F. loliacea* Smith y la otra sumamente parecida á la *F. alopecurus*, pero diversa porque entre otras notas tiene la de no tener barba sino en un corto trecho de la margen de cada gluma de la corola y hacia el medio de ella.

Observacion 4.^a En la ciudad de Sevilla se vende por manojos en las calles con el nombre de yerba mosquera la *Ononis antropodia* de Brotero, que es muy viscosa, y la cuelgan en las habitaciones la gente vulgar, y así cazan las moscas.

CIRUJIA.

Observacion de una ascitis enquistada, en la que se practicó 164 veces la paracentesis en el espacio de 22 años.

En todos tiempos la observacion ha sido el objeto del médico ilustrado; de ella es, de donde saca los materiales para deducir las teorías sobre toda clase de enfermedades. Hipócrates fué el primero que nos dejó trazada esta senda, y el que se extrayó de ella no encontrará mas que un caos inmenso de contradicciones, si la razon, ilustrada por los hechos, no le hace retroceder á su primitivo estado. A esta misma observacion debemos los descubrimientos mas importantes; y á ella en fin hemos de deber lo mucho que aún nos res-