

2.º Designar los individuos de las comisiones que dentro de ellas se formen para el mejor y más pronto despacho de los negocios.

3.º Autorizar las actas y los acuerdos de la Sección, y remitir al Gobierno cuando estén despachados los expedientes en que la Sección haya sido consultada directamente.

Art. 15. Sustituirá al Presidente de Sección el Vocal más antiguo de ella, y entre los nombrados en igual fecha el de más edad.

CAPÍTULO IV.

DE LOS VOCALES PONENTES.

Art. 16. Corresponde á los Vocales Ponentes:

1.º Examinar si los expedientes remitidos por el Gobierno están suficientemente instruidos para ser informados, y reclamar, en caso contrario, por medio de la Secretaría general de la Junta los documentos que hagan falta.

2.º Presentar los proyectos de dictámen y redactar el que definitivamente se acuerde.

Art. 17. Los Vocales Ponentes tendrán á sus órdenes para que les auxilien en el desempeño de su cargo á los empleados asignados á las Secciones de que formen parte.

Art. 18. En ausencias, enfermedades y vacantes, los Ponentes se sustituirán unos á otros por designación del Presidente de la Junta.

(Se concluirá.)

SECCION CIENTÍFICA.

Otros apuntes para la Flora de España,
por D. Juan Texidor y Cos.

(Conclusion.)

ANAGALLIS arvensis L. v. *latifolia* Lange (*A. latifolia* L.)—Alto Ampurdán cerca de Tortellá, r. r. r. en los campos, con fl. y fr. en primavera. De esta planta, que sólo dos veces se nos ha presentado en Cataluña, convienen sus caracteres perfectamente con la descripción del *A. latifolia* L. (Duby, en DC. Prodr. t. 8, p. 70), y forman un tránsito algunas subvar. intermedias que abundan en varias comarcas y especialmente en la Casa de Campo de Madrid para (cual Wk.) considerarla como var. del *A. arvensis*. El *A. linifolia* L., que como *A. Monelli* Clus., citamos en la prov. de Madrid y tenemos de otras localidades, difiere del que guardamos de Portugal por ser en este más sufruticosa y desnuda la base del tallo, más cortos los meritalos y amontonadas las hojas en el ápice de las ramas.

FRAXINUS oxyphylla Bieb. & *obtusata* Gren. Godr. (*Fr. angustifolia?* in Cut. fl. Mad.)—Escorial, Junio (Laguna!), Casa de Campo, orillas del Manzanares y Aranjuez.

El *Vincetoxicum officinale* Moench.—Distritos de Mahon en Cala-Mezquita y de Mercadal, primav. (Casall!).

CHLORA pesfoliata L. v. *grandiflora* Griseb. (*Chl. grandiflora* Pourr. [Herb.])—Mahon (Pourr.), en el barranco de San Juan, Mayo (Casall!), y en el predio Bisarriña el tipo (Casall!).

IPOMEA sagittata Desf.—En Son-Bou de Alayor (Casall!).

SYMPHYTUM tuberosum L.—Menorca (Ramis!).
S. officinale L.—Menorca (Ramis!).

ALKANNA tinctoria Tausch.—Alayor, cerca el molino Fabrer (Casall!).

ECHIMUM plantagineum L.—Menorca (Casall!), y el *E. italicum* L. vulg. *lengua bovina*, en Mahon y Alayor (Casall!).

E. calicinum Viv.—Llanos del Besós y del Llobregat, primav.

CYNOGLOSSUM cheirifolium L.—Menorca (Ramis!).

PHYSALIS Alkekengi L.—Menorca (Ramis!).

ATROPA Belladonna L.—Menorca (Ramis!) y Vierzo r. El *Solanum Sodomeum* L. entre casa Ar-tunex y el faro del Llobregat, r. r. (Casall!).

VERBASCUM phlomoides L.—Sitios áridos de Olot (Vayreda!); Ampurdan y Pirineos de Bassagoda, fl. Julio y tiene las hojas poco festonadas.

SCROPHULARIA canina L.—Menorca, vulg. *erba-pudenta* (Ramis!).

S. canina L.—Arenales cerca de Mahon, Mayo (Casall!).

LINARIA Elatine Desf.—Alayor, Setiembre (Casall!); las semillas son reticuladas.

L. arvensis Desf.—Olot (Vayreda!) y Ampurdan.

L. Tournefortii Lange v. *inquinans* Lange. (*L. arenaria* Texid. non DC. et v. *saxatilis* Tuy, region Compostelana, reino de Leon y Valladolid. La *L. italica* Trev. que citamos en Cataluña (Apuntes p. 56) y el Sr. Lange supone (Prodr. fl. hisp. t. 2, p. 577), sea la *L. vulgaris*, ha sido examinada por varios botánicos á quienes la hemos remitido y están conformes con nuestra opinion.

VERONICA officinalis L.—Menorca (Ramis!).

V. serpyllifolia L.—Montes de Olot, Mayo (Vayreda!).

V. verna L.—Cordillera del Vierzo.

DIGITALIS purpurea L. v. *tomentosa* Whb.—Peñas de Cala-Mezquita, barranco del predio Favaret, Mahon y Costa-blanca de Alayor, vulg. *hidals*, herba de Santa María, boca de llop, Junio (Casall!).

MELAMPYRUM sylvaticum L.—Montes del Vierzo.

MENTHA sylvestris L.—Vierzo.

M. aquatica L. v. *subspica* Benth.—Olot. (Vayreda!). La forma típica en el barranco de Alendar de Menorca (Casall!).

ORIGANUM vulgare L.—Menorca, vulg. *orengue* (Ramis!).

THYMUS Chamædrys Fries.—Mahon (Casall!).

T. Chamædrys Fries v. *vestitus* Lag.—Piedrafitá y Vierzo.—En Cataluña, montes de Nuria, San Juan del Herm y Tapis.

T. capitatus Hffg.—Menorca (Casall!), Mahon (Pourr!), Ibiza y Palma de Mallorca (Tremols!).

MICROMERIA græca Bth. v. *latifolia* Bois.—Mahon y reino de Valencia (Pourr!).

M. græca Bth. v. *nervosa* (*M. nervosa* Bth.; Wk. Lge. Prodr. fl. hisp. t. 2, p. 411 n. 2266) en Mahon (Casall!) y Godella, cerca de Valencia. En un mismo individuo se nos han presentado ramas con los caracteres del tipo y se modificaban otras resultando la *nervosa*; fl. Abril-Octubre.

M. filiformis Bth.—Alrededores de Mahon, Alayor y monte Toro, Mayo (Casall!); en Ibiza y Cabrera (Tremols!).

M. marifolia Bth. (*Thymus marifolius* Pourr. herb.).—Mahon (Pourr!).

MELISSA officinalis L.—Menorca (Ramis!).

SALVIA Sclarea L.—Vierzo.—Caldas de Momboy (Casall., Texid.) y alto Ampurdan. La *S. Aethiops* L. en Aranjuez.

GLECHOMA hederacea L.—Menorca (Ramis!).

El *Lamium flexuosum* Ten. en el llano del Llobregat; el *Stachys hirta* L. cerca de Alayor, vulg. *espinadella* (Casall!); el *St. recta* L. en Menorca (Ramis!); la *Ballota fetida* Lam. cerca de Mahon y vulg. *malrubí pudent* (Casall!), y la *B. hirsuta* Bth. en Ibiza (Tremols!).

PHLOMIS Lychnitis L.—Menorca (Ramis!).

SIDERITIS scordioides L. *genuina*.—En el Vierzo, y la v. *Cavanillesii* Wk. en el Ampurdan.

MARRUBIUM vulgare L. v. *lanatum* Bth.—Alayor (Casall!).

AJUGA Chamæpytis Scheb. y también el *A. iova* Schr. en Menorca (Ramis!).

TEUCRIUM Polium L. v. *purpurascens* Bth.—Alayor (Casall!).

LIPPIA nodiflora Rich. v. *repens* Schaur.—Orilla de una acequia de Son-Bou de Alayor (Casall!).

PLANTAGO crassifolia Forsk.—Alayor (Casall!).

P. Cynops L.—Menorca (Ramis!).

STATICE lychnidifolia Guir. (*St. auriculæfolia* Pourr. herb.).—Mahon (Pourr!).

S. minuta L.—Mahon (Casall!). La *S. virgata* en Mahon cerca la torre de Cala-Mezquita (Casall!).

El *Chenopodium murale* L. y la *Beta maritima* L. cerca de Mahon (Casall!). En Palma de Mallorca la *Sueda fruticosa* Fonsk. y *Salsola vermiculata* L. *flavescens* Moq. T. (Tremols!).

RUMEX pulcher L.—Mahon (Casall!). El *R. bucephalophorus* L. en Mahon (Casall!).

DAPHNE Rodriguezii Texid. (Apuntes de 1868, p. 64.) Baya elíptico-ovada, el ápice agudo, poco carnosa y (estando seca) de color amarillento-rojizo. Colina de Cala-Mezquita en Menorca (Casall!).

EUPHORBIA dulcis L.—Barranco de Sevall en San Cristóbal de Menorca (Casall!). La *E. Esula* L. en Menorca (Ramis!), Mahon (Pourr!) y hácia Alayor (Casall!).

E. terracina L.—Mahon, Alayor y otros puntos (Casall!).

URTICA pilulifera L. v. *balearica* Lge.—Camino y escombros de los alrededores de Mahon, Mayo (Casall!).

THELIGONUM Cynocambre L.—Alayor, monte Toro y otros puntos de Menorca (Casall!), Abril.

SCILLA lilio-hyacinthus L.—Montes de Olot y más arriba (Vayreda!), Abril.

ERYTRONIUM dens-canis L.—Vierzo. El *Phalangium Liliago* Schr. en los montes de Olot (Vayreda!).

ALOE vulgaris Lamk.—Llano del Llobregat (Texid.), casa Antunez y cerca de Mahon (Casall!).

PARIS quadrifolia L.—Montes del Vierzo.

Smilax aspera L. v. *rubra* Texid. (Flora Farm., 1871.) Obs. hojas lanceolado-alabardadas, espinosas en los bordes y costilla, fl. rojas. Mahon en las tapias, hácia San Pons y Alayor (Casall!).

El *Sm. mauritanica* Desf. en la region baja de Cataluña y Monserrat.

POLYGONATUM vulgare Desf.—Menorca (Ramis!).

CROCUS versicolor Gawl.—Es c. en Binisarmeña y otros puntos de Menorca (Casall.).

IRIS Pseudo-acorus L.—Prado Son-Bou de Alayor, Mayo y vulg. *espadella*, *jinjol gròch* (Casall.).

El *Narcissus juncifolius* Req. en Puigsacau, y el *N. Pseudo-Narcissus* L., en la cordillera del Corp (Vayreda!).

CEPHALANTHERA grandiflora Bb.—Montes de Olot, r. (Vayreda!). El *Spinanthes aestivalis* Rich. en el Vierzo. El *Epipactis Helleborine* Crtz. v. *microphylla* Rchb. en los montes de Olot, con la var. *rubiginosa* Crtz. (Vayreda!) y ésta asciende por los Pirineos.

SERAPIAS Lingua L.—En la marina del Mercadal de Menorca (Casall.).

ACERAS longibracteata Rchb.—Barcelona en la Cordillera de San Jerónimo (Tremols!) y Mahon (Casall.).

ORCHIS provincialis Balb.—Vierzo.—El *O. bifolia* L. en los montes de Olot, y el *O. viridis* Crantz, en Vidrà (Vayreda!).

JUNCUS acutus L.—Menorca (Ramis!), predio Son-Bou. (Casall.).

J. maritimus Lam.—Menorca (Pourr.).

J. supinus Moench. v. *aquatilis*.—Menorca en el torrente del barranco de Sevall (Casall.). El *J. bufonius* L. en Menorca (Oleo), cerca de Mahon (Casall.).

LUZULA spadicæa DC.—Vierzo.

El *Cyperus distachyos* All.—En Mahon (Pourr.) y Alayor (Casall.); el *Schenus nigricans* L. cerca de Mahon y Mercadal (Casall.).

SCIRPUS Holoschenus L. v. *romanus* Koch.—Menorca (Ramis!), barranco de Sevall y vulg. *jonch boval* (Casall.).

S. lacustris L.—Menorca (Ramis!) cerca de Mahon, en el torrente de los vergeles de San Juan (Casall.); y en el torrente de Sevall en San Cristóbal (Casall.) la var. *digynus* Godr.

S. Savii Seb. et Maur.—Alayor (Casall.).

CLADIUM giganteum Wk.—Menorca (Ramis!) en Alayor (Casall.).

CAREX setifolia Godr.—Guadarrama.—En Mahon (Casall.).

C. divulsa Good.—Mahon (Casall.), y el *C. vulpina* L. en el término de San Cristóbal (Casall.).

C. glauca Scop.—Predio Son Saura de Mercadal en Menorca y cerca de Caldas de Mombuy (Casall.).

C. Halleriana Asso.—Menorca en San Cristóbal (Casall.).

C. distans L.?—Mahon (Casall.). No puedo asegurar que es el *C. distans* por estar comida del ganado y sólo queda una espiga.

C. extensa Good.—Son Bou y Calamperta de Alayor (Casall.).

ANTHOXANTHUM odoratum L.—Mercadal de Menorca (Casall.). La *Koeleria phleoides* Pers. cerca de Mahon (Casall.).

MELICA nutans L.—Mahon y Alayor, Abril (Casall.). La *Briza maxima* L., *Scleropoa rigida* Gris. y *Lamarckia aurea* Moench, cerca de Mahon (Casall.).

BROMUS erectus Huds.—Montes del Vierzo. Cerca de Mahon el *Br. sterilis* L. (Casall.).

ASPIDIUM aculeatum Doell. α et β Gren. Godr.—Hácia Berga y montes próximos á Barcelona (Colm.), Puerto de Benasque (Zet.), es c. c. en Vallvidrera, Monserrat, alto Ampurdan, montes de Camprodon, etc.

ASPLENIUM Trichomanes L.—Menorca (Ramis!).

EQUISETUM Telmateya Ehrh.—Menorca (Ramis!).

La *Selaginella denticulata* Koch.—Mahon y Alayor (Casall.).

ROCCELLA phycopsis Ach.—Mahon (Casall.).

BOLETUS edulis.—En el Alto Ampurdan c. y vulg. *siureny*.

DÆDALEA labyrinthiformis.! (*D. quercina* Pers.; *Agaricus quercinus* L., *Ag. labyrinthiformis* Bull.). Es frecuente sobre los troncos de los *Quercus* de la region compostelana; tambien lo he hallado sobre los castaños, y por no ser exclusiva en las plantas del primer género y la disposicion de sus láminas, me inducen á preferir el nombre específico dado por Bull. considerándolo el como agárico.

LECIDEA lucida β *leprosa* Sch.—Es c. sobre varias rocas y especialmente sobre coccolita, cerca de Santiago de Galicia.

Lecanora muralis et subfusca, sobre rocas de los muros en el Alto Ampurdan.