

N<sup>o</sup> 125

## Nuevas formas españolas de plantas.

Auctore Carolo Pau.

(In: Bol. Soc. Arag. de C. Nat., 1904, p. 288 et seq.)

1. *Clematis cirrhosa* L. var. **Barnadesii** Pau, l. c., p. 288.

Planta glabra; foliis ovato-lanceolatis, integris vel subtrilobis, sublaciniato-serratis, petiolis ciliatis; floribus pedunculatis, involucri foliaceo, duobus foliolis petiolatis et plus minusve perfoliatis ad basin petiolorum bracteatorum, sensim evanescentibus in floribus superioribus, limbo ovali, dentato aut integro, pedunculis longioribus.

Hispania: Almorchón.

2. *Adonis castellana* Pau, l. c., p. 289.

Multicaulis, ramosa a radice collo. Caules grossi, lanuginosi. Folia petiolis villosis, villo longo et laxo. Flores sepalis villosis, demum aliquando glabrescentibus; petalis violaceis, macula nigra ad basin haud insignitis; spica ovoidea, densa; carpellis duplo minoribus, sine carina in parte superiore; rostro recto, longo, uniformi, apice nigro-caeruleo. Basis carpelli et rostri nec emarginata nec dentata.

Hispania: Abula (Barras); Olmetum (Gutiérrez).

3. *Saponaria composita* (*glutinosa* × *officinalis*) Pau, l. c., p. 289.

Similis *officinali* L.; sed distincta veste pubescente et glandulosa, quae totam operit, foliis brevioribus, apice haud lanceolato. A *S. glutinosa* differt foliis angustioribus et calicibus inflatis. Petali majores quam in *glutinosa*, minores quam in *officinali*.

Hispania: Ulmetum.

4. *Hypericum baeticum* Boiss. (*H. tetrapterum* × *undulatum*).5. *Hypericum Roberti* Coss. var. **hispanicum** Pau, l. c., p. 290.

Differt a typo tunetano foliis brevioribus, dentibus bractearum minoribus, sepalis ovatis.

Hispania: Almería.

6. *Erodium* (Sect. *Gruina*) **carthaginense** Pan, l. c., p. 290.

Planta annua, pubescens. Caules prostrati, copiosi. Folia magna, longiter petiolata, limbo ovato, pinnatifido, segmentis pinnato-sectis, decurrentia, ala integra; stipulis ferrugineis, ovatis, obtusis; pedunculis foliis longioribus. Umbellae 2—6-floribus; bracteis involucri ovatis, apice rotundato; tepalis ovatis, breviter mucronatis, pubescentibus, striatis; petalis purpureis, sepalis majoribus; carpellis albo-pilosis, foveola sine plica, rostro longo.

Hispania: Carthago nova.

7. *Inula Gutierrezii* (*Conyza* × *lutescens*) Pau, l. c., p. 291 = *I. suaveolens* Lange et Willkomm, Prodr. II, p. 43.

8. *Carduncellus matritensis* Pau, l. c., p. 290 (*C. pinnatus* var. *acaulis* Cutanda!).

Planta laevis, subcaulis. Folia capitulis 1—4 longiora, longiter petiolata, late linealia, pinnato-partita, partitionibus decurrentibus et subpinnatifidis lanceolatis, spinosis, spinis rubescentibus; anthodio ovato 30—45 mm; bracteis floralibus apice desinentibus in limbum foliaceum spinosum, forma varium, partitum aut sectum; squamis basi valde dilatatis, apice cuspede elongata; margine integerrimo, solumque in apice duabus vel tribus spinis paribus; dorso obscure nervato; interioribus in apicem desinentibus cochleariformem, laciniatum et membranaceum, nervis in dorso distinctioribus. Achaeniis corona dentata terminatis; in quadruplici facie sublaevibus, long. 7 mm plumula 20 mm rubescente.

Hispania: Cerro Negro (Madrid).

9. *Centranthus calcitrapa* L. var. *Gutierrezii* Pau, l. c., p. 292.

A basi ramosus, ramis patentibus; foliis omnibus pinnato-sectis, segmentis linealibus integerrimis; bracteis brevioribus.

Hispania: Ulmeti.

10. *Chondrilla* (?) *vallisoletana* Pau, l. c., p. 292.

Planta glauca (biennis?); caule unico, striato, setis rigidis operto, superne ramoso; foliis oblongis, integris, marginibus spinoso-ciliatis, sicut in nervo medio et pagina inferiore; capitulis ramosis pedunculis brevibus; anthodio cinereo, squamis linealibus, setosis; achaeniis . . .

Hispania: Ulmeti.

11. *Teucrium capitatum* L. var. *ulmeticum* Pau, l. c., p. 293.

Capitulis ut in capitato; foliis amplis, viridibus; caulibus inferne laniferis.

Hispania: Ulmeti (Gutiérrez).

Misit Longinus Navás, S. J.