2.261
Caja Pau
n: 145

DOS ESPECIES NUEVAS

DE LA

FLORA ESPAÑOLA

POR

CARLOS PAU

(Extracto de la *Revista de Montes*.—Madrid, 15 de Agosto de 1909, núm. 782.)

MADRID
IMPRENTA DE RICARDO ROJAS
Campomanes, 8.—Teléfono 316.

1909

R 12.9
1940

Rev. Montes 33(782): 589-590

DOS ESPECIES NUEVAS DE LA FLORA ESPAÑOLA

Centaurea Avilæ, Pau, nov. sp.—Lanuginosa y canescente en la base, con tallos más ó menos numerosos erectos, rígidos, angulosos, sencillamente ramosos y cabezuelas terminales solitarias.

Hojas radicales pinnado-cortadas, lacinias oblongas y lineales mucronadas, mugrón espinoso; las rámulas enteras oblongo-lineales y algo ensanchadas hacia la terminación, que es más ó menos redondeada, con dos pínulas dentiformes en la base que parecen orejuelas.

Cabezuelas globulosas, invólucro glabérrimo, escamas aovadas, densas, pegadas, anchamente escamoso el margen, con el disco del apéndice aovado-lanceolado, negro, largamente pestañoso, pestañas blanquecinas y espina terminal simple, débil y corta. Corolas purpúreas.

Planta asombrosamente parecida á la *Cent. Paui Loscos*, de la que difiere por las escamas lisas (no estriadas), membrana marginal plateada mayor, pestañas blanquecinas y más largas y, sobre todo, por la espina terminal sencilla (no pestañosa).

Se encuentra junto á la laguna de Gredos, y también en los alrededores de Navacepeda de Tormes, sobre suelos silíceos.

Cerastium Secalli, Pau, nov. sp.—Planta humilde, de unos 10 centímetros, ramosa, alampiñada y verde; tallos débiles, frágiles, difusos; hojas oblongas, mucronadas brevemente, adelgazadas en peciolo, parecidas á las de la *Stellaria uliginosa*, pestañosas, con escasos pelos cortos pegados en ambas caras; cimas paucifloras, con pedicelos mucho mayores que los

Re 19.942

BIBLIOTECA DE CIENCIAS NATURALES

cálices, pubescentes y glandulosos, erectos; brácteas escariosas en su mitad superior; sépalos pubescentes con ápice y margen escariosos; pétalos lineales profundamente partidos y doble mayores que los sépalos, con su base glabra; filamentos lampiños; estilos cinco; cápsula mitad mayor que el cáliz, recta y con los dientes planos; semillas ferrugíneas, discoideas, escotadas en el ombligo, resultando comprimidas y arriñonadas ligeramente, tuberculosas y con la testa adherida al albumen.

La más próxima es el *C. alpinum;* quizás se pueda clasificar entre esta especie y el *C. arvense.* Yo no conozco ni poseo forma parecida de España ni de Europa.

Fué hallada en una excursión verificada por los Ingenieros Sres. Avila y Secall, en los alrededores de la laguna de Gredos y en la subida desde ésta á los Hermanitos de Gredos, en suelos silíceos en el mes de Septiembre.

CENTAURÉA AVILÆ, PAU

CERASTIUM SECALLI, PAU