EXCURSIONS BOTANIKQUES

EN

ESPAGNE

Par M. G. ROUY.

L'Espagne a été souvent parcourue au point de vue botanique, et des ouvrages à juste titre appréciés ont été publiés sur la flore de ce beau pays. Cependant, à l'exception des provinces munies d'importants établissements universitaires et de celles dont la richesse exceptionnelle a principalement attiré les botanistes, il reste encore, même dans les localités dont la végétation semble relativement connue, beaucoup à découvrir, tant au point de vue des espèces et variétés non encore décrites qu'au sujet de la dispersion géographique de plantes déjà signalées en Espagne ou n'y ayant pas été indiquées jusqu'à présent. Cela s'explique du reste aisément; car, sans compter les difficultés des herborisations, difficultés bien aplanies à l'époque actuelle, la plupart des excursions scientifiques dans la Péninsule ont été faites avec le désir très naturel de visiter le plus de pays possible en un laps de temps relativement court, et peut-être alors n'a-t-il pas toujours été permis à certains botanistes de séjourner suffisamment dans toutes les localités intéressantes, si nombreuses en Espagne.

La méthode qui m'a paru la meilleure pour arriver à de bons résultats dans l'exploration de telle ou telle région d'un pays aussi accidenté que l'Espagne consiste à s'installer pendant plusieurs jours dans un centre assez important d'où l'on puisse herboriser dans toutes les directions, sans toutefois s'écarter de plus de 40 kilomètres, et chaque herborisation ne devant, que rarement, demander plus de deux jours d'absence du lieu de cantonnement. C'est cette méthode que j'ai employée depuis quatre ans

dans mes excursions en Espagne, et les résultats que j'ai obtenus, aussi bien pour la découverte d'espèces rares ou peu communes que pour la dessiccation des plantes récoltées, ne peuvent que m'engager à continuer l'emploi de ce mode d'exploration, praticable maintenant presque partout dans la Péninsule.

Ayant l'intention de consacrer tous les ans près d'un mois à des excursions botaniques en Espagne, je me propose de publier chaque année un *précis* des herborisations que j'aurai faites autour de certaines villes, ou même simples bourgades, en divisant cette publication en trois parties : la première, comprenant un court résumé des herborisations principales ; la seconde, donnant les indications de localités nouvelles ; la troisième, enfin, relatant les observations, remarques et diagnoses d'espèces ou de variétés inédites, s'il y a lieu.

I. CENTRE D'EXCURSIONS : JATIVA (mai 1879 et juin 1880).

1° Herborisations.

Játiva, station de la ligne de Valencia à Almansa, est, tant par son industrie et son commerce que par l'abondance et la diversité de ses productions agricoles, un des chefs-lieux de district les plus importants de la province de Valencia. La ville, dont la population dépasse 15000 habitants, est située au pied d'une montagne, sur le versant de laquelle s'élèvent jusqu'au sommet les murailles d'une ancienne forteresse.

Pour avoir une idée à peu près complète de la flore des environs de Játiva, qu'ont déjà visités Barrelier, Cavanilles, Dufour, Bourgeau, MM. Boissier, Leresche, Hegelmaier, cinq herborisations principales doivent être faites :

- 1° *Sierra de Játiva* : cerro del Castillo.
- 2° — — cerro de Vernisia.
- 3° — — bords du rio Montesa, et cerro del Calvario.
- 4° *Vallidigna* : cuesta de Barig et cerro de Ubar.
- 5° *Sierra Mariola*.

Les trois premières courses, consacrées aux environs immédiats de Játiva, font connaître la végétation des collines pierreuses, des roches et des sables ; la quatrième donne un aperçu suffisant de la flore des hauts coteaux et des montagnes d'altitude moyenne ; enfin l'herborisation de la sierra *Mariola* met à même de récolter la majeure partie des espèces alpêtres et subalpines de cette région, les sierras de *Aitana*, de *Castalla*, de *Chiva*, de *Jijona*, de *Campana*, ne possédant qu'un nombre très limité de plantes spéciales.

I. Cerro del Castillo. — Gravissant les dernières rues assez escarpées de la ville, on se trouve bientôt sur des terrains rocaillieux incultes précédant les champs maigres et les vignes qui, dans l'enceinte même des anciens remparts, s'étendent depuis les dernières maisons de Játiva jusqu'à la base des grands rochers situés au sommet du cerro. L'exploration de ce vaste espace procure un grand nombre de plantes intéressantes :

Ballota hirsuta Benth., *Thapsia villosa* L., *Rapistrum rugosum* L'Hérit., *Tanacetum annuum* L., *Senecio Gallicus* Chaix, *Dianthus Sætabensis* Rouy, *Rhagadiolus stellatus* Willd., *Biscutella petræa* Jord., *B. pinnatifida* Jord., *Atractylis cancellata* L., *Hymenostemma Fontanesii* Willk. (*Leucanthemum Sætabense* Duf.), *Centaurea Spachii* C. H. Schultz, *Polygala rupestris* Pourr., *Urospermum Dalechampii* Desf., *U. picroides* Desf., *Andryala sinuata* L., *Reseda Aragonensis* Losc. Pardo, *Campanula Erinus* L., *Sideritis scordioides* L., *Cynanchum acutum* L., *Dianthus brachyanthus* Boiss. var. *montanus* Willk. et Lge, *Coronilla juncea* L., *Vincetoxicum nigrum* Moench, *Thymus æstivus* Reut., *Ononis ramosissima* Desf., *Sarcocapnos enneaphylla* DC. var. *major* Willk. et Lge (sur les remparts à droite), *Psoralea bituminosa* L., *Arenaria minutiflora* Losc., *Nigella Damascena* L. var. *minor* Boiss. (*N. Bourgæi* Jord.), *Koniga maritima* R. Br. var. *major* Rouy, *Trifolium lappaceum* L., *Medicago orbicularis* All., *Ononis arachnoidea* Lapeyr., *Vaillantia hispida* L., *Ononis minutissima* var. *calycina* Willk. et Lge (*O. barbata* Cav. !), *Bellis annua* L., *Spartium juncetum* L., *Erodium malacoides* L'Hérit. var. *macrophyllum* Lge (*E. althæoides* Jord.), *Lavatera maritima* Gouan, *Anthemis arvensis* L., *Eruca vesicaria* Cav., *Helianthemum lavandulifolium* DC., *Fumaria viscida* Spach, *Anacyclus Valentinus* L., *Trifolium angustifolium* L., *Pallenis spinosa* Cass., *Sonchus tenerimus* L. var. *spinulosus* Willk. et Lge, *Convolvulus althæoides* L., *Teucrium Carthaginense* Lge, *T. capitatum* L., *T. Majorana* Pers., etc.

En suivant la base des grands rochers, on peut récolter, tant après leurs parois que parmi les éboulis et rocailles :

Linum angustifolium Huds., *Centaurea cruenta* Willd., *Lactuca tennerrima* Pourr., *Orobanchæ Hederae* Duby, *Silene Tenoreana* Coll., *Centaurea aspera* L. var. *subinermis* DC., *Mercurialis ambigua* L. f., *Antirrhinum Barrelieri* Duf. α . *genuinum* et β . *piliferum* Rouy, *Silene glauca* Pourr. (*S. ambigua* Camb. non Salisb. nec Turcz., *S. Sætabensis* Duf.), *Scrofularia sciaphila* Willk., *Acanthus mollis* L., *Sarcocapnos crassifolia* DC. var. *speciosa* Boiss. (parois des grands rochers de gauche), *Digitalis obscura* L., *Silene Nevadensis* Boiss., *S. Saxifraga* L. var. *hispanica* Rouy, *Rumex intermedius* DC. (*R. thyrsoides* G. et G. non *alt.*), *Phlomis Lychnitis* L., *Picridium intermedium* C. H. Schultz,

Galium rigidum Vill. var. *falcatum* Willk. et Lge, *Chaenorrhinum crassifolium* Lge (*Linaria crassifolia* Kze), *Thesium divaricatum* Jan, *Plantago albicans* L., et deux plantes qui jusqu'à présent n'ont été signalées que là : *Crambe glabrata* DC., et *Melandrium dictline* Nym. (*Lychnis dictlinis* Lag.); toutes deux, du reste, y sont rares.

Cette herborisation peut s'effectuer en moins de quatre heures.

II. **Cerro de Vernisia.** — Le cerro de Vernisia, plus élevé de quelques mètres que le cerro del Castillo, n'est, en quelque sorte, que le prolongement, dans la direction de l'ouest, de ce dernier, dont il est séparé seulement par le col de Vernisia. Vue de la gare de Játiva, cette montagne paraît n'être qu'un entassement de rochers presque dépourvus de végétation; mais, grâce à cette aridité même, elle présente plusieurs espèces saxicoles que le cerro del Castillo n'offre pas au botaniste.

Pour faire cette herborisation assez pénible, mais qui en somme n'exige guère que cinq heures, il faut sortir de Játiva par la route d'Almansa, et, dès que l'on a franchi la porte de la ville, entreprendre l'ascension de la partie du cerro del Castillo non comprise dans l'enceinte fortifiée. Les champs et les rocaïlles qui s'étendent jusqu'aux roches présentent, outre plusieurs plantes signalées dans l'excursion précédente :

Phlomis crinita Cav. (*P. Barrelieri* Duf.), *Sideritis Sætabensis* Rouy, *Coris Monspelienis* L., *Lavandula latifolia* Vill., *Rosmarinus officinalis* L., *Lens nigricans* Godr., *Scorpiurus subvillosa* L., *Dianthus Hispanicus* Asso, *Convolvulus linzatus* L., *Anarrhinum bellidifolium* Desf., *Cistus crispus* L., *C. albidus* L., *Ruta angustifolia* Pers., etc.

Traversant alors le col de Vernisia, on aborde le cerro de ce nom. On y rencontre, surtout dans la partie supérieure du versant nord, moins exposé aux vents violents que les versants sud et ouest, plusieurs espèces rares ou peu communes : *Silene colorata* Poir. var. *canescens* Soy. et Godr. (*S. canescens* Ten.), *S. tridentata* Desf., *Orobis saxatilis* Vent., *Dianthus multiceps* Costa, *Lactuca tenerrima* Pourr., *Galium setaceum* Lamk, *Ranunculus gramineus* L. var. *luzulaefolius* Boiss., *Centaurea tenuifolia* Duf., *Asperula tenuiflora* Jord., *Helianthemum dichroum* Kze, *Viola arborescens* L., *Teucrium buxifolium* Schreb., *Rhamnus lycioides* L. var. *pubescens* Rouy, une forme vivipare de l'*Euphorbia serrata* L., *Malva althæoides* Cav., *Erythraea Barrelieri* Duf., *Convolvulus lanuginosus* Desr. var. *sericeus* Boiss. (*C. linearis* DC.), *Silene glauca* Pourr., *Sonchus oleraceus* L. var. *lacerus* Wallr. (*S. lacerus* Willd., *S. ciliatus* Lamk), *Chaenorrhinum crassifolium* var. *parviflorum* Lge (*Linaria Sætabensis* Leresche), *Paronychia aretioides* DC., *Thesium divaricatum* Jan., *Biscutella stenophylla* Duf., *Malva Hispanica* L., *Herniaria cinerea* Lamk, *Hymenostemma Fontanesii* DC. et Ak.,

Ajuga Iva Schreb., *Helichrysum Stæchas* DC. var. *cæspitosum* Willk., *Artemisia arborescens* L., *Koeleria setacea* Pers., etc.

Ces plantes récoltées, il convient de descendre vers la route d'Almansa pour explorer les champs et les sables situés à la base du cerro ; on peut y prendre : *Hypocoum grandiflorum* Benth., *Atractylis cancellata* L., *Cornicina lotoides* Boiss., *Ononis pubescens* L., *Linaria ignescens* Kze., *Calendula Malacitana* Boiss. et Reut., *Orobanche pruinosa* Lapeyr. (*O. speciosa* DC.), *Lavatera Cretica* L., *Stachys hirta* L., *Centaurea pullata* L., *Microlonchus Clusii* J. Gay, *Cyperus esculentus* L., *Trisetum neglectum* R. et Sch., *Ononis arenaria* DC., *Polygonum aviculare* var. *vegetum* Ledeb. Dans les fossés se trouvent les *Mentha rotundifolia* L. et *Lythrum acutangulum* Lag.

Retour à Játiva.

III. Sables du rio Montesa et cerro del Calvario. — Sortant de Játiva par la route d'Alcoy et prenant, immédiatement après la belle fontaine de *los veinte y cinco caños*, le chemin de gauche, on arrive en moins d'une demi-heure au rio Montesa, après avoir recueilli au bord des fossés et des champs : *Fumaria pallidiflora* Jord., *Lathyrus latifolius* L., *Anacyclus Valentinus* L., *Centaurea pullata* L., *Lythrum acutangulum* Lag. forma *longistyla* Willk. et Lge, *Ononis ramosissima* Desf., *Scrofularia Valentina* Rouy, *Chrysanthemum Myconis* L., *Scolymus Hispanicus* L., *Hedysarum humile* L. var. *major* Lge (*H. Fontanessii* Boiss.), *Andrachne telephioides* L., *Microlonchus Clusii* J. Gay.

Dans les sables du rio se trouve en abondance le *Nerium Oleander*, dont les magnifiques corymbes de fleurs roses sont d'un si bel effet ; y croissent également : *Santolina incana* Lamk, *Arenaria leptoclados* Guss., *Herniaria cinerea* Lamk, *Diploaxis viminea* DC. ; et près des rizières : *Ipomœa sagittata* Desf., ne fleurissant que vers la fin de juillet.

En suivant alors un petit chemin qui, sur la droite, va rejoindre la route d'Alcoy, on récolte dans les champs et les terrains rocailleux qu'il traverse : *Anthyllis cytisoides* L., *Sonchus tenerrimus* L. var. *spinulosus* Willk. et Lge, *Trachelium caeruleum* L., *Linum Narbonense* L., *L. angustifolium* Huds., *L. strictum* L. var. *cymosum* G. et G. (*L. sessiliflorum* Lamk), *Anchusa Italica* Retz, *Eruca vesicaria* Cav., *Antirrhinum Barrelieri* Duf., *Helianthemum ledifolium* Willd., *H. lavandulæfolium* DC., *Cistus albidus* L., *Helichrysum serotinum* Boiss., *Moricandia arvensis* DC., *Picnomon Acarna* Cass., *Tyrimnus leucographus* Cass., *Scabiosa Monspelienensis* Jacq., *Galactites tomentosa* Mœnch, *Trisetum scabriusculum* Coss., *Poterium verrucosum* Ehrnb., *Stipa tortilis* Desf., *Phalaris paradoxa* L., *Hypocoum grandiflorum* Benth., *Rœmeria violacea* Medik, *Plantago albicans* L., puis, au delà de la route d'Alcoy, une plante nouvelle

pour la flore espagnole : *Elæoselinum Asclepium* Bert. (*Thapsia Asclepium* L.), en compagnie de *Vaillantia hispida* L., *Sideritis pungens* Benth. var. *Tragoriganum* Rouy (S. *Tragoriganum* Lag.) *Atractylis humilis* L., *Digitalis obscura* L., *Phlomis crinita* Cav., *Thymus æstivus* Reut., et de plusieurs autres espèces déjà signalées dans les deux herborisations précédentes et assez répandues autour de Játiva.

Ces récoltes faites, il est nécessaire de quitter le sentier qui conduit à Játiva, et de gravir le versant oriental de la montagne ; cette ascension procure : *Anthyllis genistoides* Duf., *Trifolium tomentosum* L., *Paronychia argentea* Lamk, *Pallenis spinosa* Cass., *Ajuga Iva* Schreb., *Avena barbata* Brot. var. *triflora* Willk., *Centaurea aspera* L. var. *subinermis* DC., *Lavatera maritima* Gouan, *Galium saccharatum* All., *Erica stricta* Don, *Asplenium Petrarchæ* DC., *Mæhringia pentandra* J. Gay, *Asperula scabra* Presl var. *glabrescens* Boiss., *Helianthemum hirtum* Pers., *Diplotaxis viminea* DC., *Ononis tridentata* L. forma *α. angustifolia* Lge, *Echium angustifolium* Lamk, *Arenaria modesta* Duf. Au sommet du Cerro, d'où par un temps clair on peut apercevoir le roc de Sagunto à plus de 110 kilomètres, croissent quelques pieds d'*Elæoselinum Lagasce* Boiss. (*E. tenuifolium* Willk., *Thapsia tenuifolia* Lag.).

La descente sur Játiva permet de recueillir parmi les éboulis et dans les interstices des rochers, outre plusieurs plantes déjà récoltées, quelques espèces peu communes, entre autres : *Delphinium peregrinum* L., *Chænorhinum crassifolium* Lge var. *elongatum* Rouy, *Velezia rigida* L., *Erodium Cavanillesii* Willk., *Teucrium Pseudochamæpitys* L., *Trifolium stellatum* L., *Allium pallens* L., *Micropus bombycinus* Lag., et une plante presque exclusivement maritime en France, mais qui en Espagne s'élève jusque dans la région des montagnes : *Statice echiioides* L.

IV. ^{Mondubèr} **Valldigna : cuesta de Barig et cerro de Ubar.** — Cette excursion, une des plus productives des environs de Játiva, demande une journée entière.

On doit partir de Játiva par le premier train du matin et descendre à la station de Carcagente, point de départ d'une ligne de « *tramvia* » qui va à Denia, en passant par Tabernes de Valldigna, Gandia, Oliva. Quittant la voiture à environ 10 kilomètres de Carcagente, il faut commencer immédiatement l'exploration des collines élevées situées à gauche de la voie, surtout du haut coteau nommé *cuesta de Barig*, qui procure au botaniste les espèces suivantes : *Santolina squarrosa* Willd., *Stæchelina dubia* L., *Thymus Piperella* L., *Ononis pubescens* L., *Kentrophyllum lanatum* DC., *Erica multiflora* L. (*E. peduncularis* Presl!), *Biscutella collina* Jord., *Crupina Crupinastrum* Vis., *Linum angustifolium* Huds., *Echinops Ritro* L., *Atractylis cancellata* L., *Scolymus Hispanica*

nicus L., *Galactites tomentosa* Moench, *Vaillantia hispida* L., *Urospermum picroides* Desf., *Lavandula multifida* L., *Thymus Mastichina* L., *Phlomis Lychnitis* L., *Coris Monspelensis* L., *Androsace maxima* L., *Dianthus Hispanicus* Asso var. *elongatus* Rouy, *Scorzonera crispata* Boiss., *Chlora perfoliata* L., *Erythrea Barrelieri* Duf., *Phillyrea angustifolia* L., *Malva Hispanica* L., *Psoralea bituminosa* L., *Trifolium lappaceum* L., *Dianthus velutinus* Guss., *Rapistrum Linnaeanum* Boiss. et Reut., *Helianthemum ledifolium* Willd., *Malva althaeoides* Cav., *Hypericum ericoides* L., *Elaeoselinum Asclepium* Bert., *Anthyllis genistoides* Duf., *Centaurea Melitensis* L. (var. à calathides solitaires), *C. prostrata* Coss., *Silene glauca* Pourr., *Galium frutescens* Cav., *Leucanthemum gracilicaule* Duf., *Serratula Barrelieri* Duf., *Elaeoselinum Lagascae* Boiss., *Thymus Zygis* L., etc.

Descendant ensuite vers la *Ermite de Valldigna*, en suivant le lit d'un petit ruisseau à sec l'été, on rencontre : *Scolymus Hispanicus* L., *Scorzonera angustifolia* L., *Salvia Valentina* Vahl, *Phlomis purpurea* L., *P. crinita* Cav., *Linum suffruticosum* L., *Pulicaria odora* Rehb., *Stachys Heraclea* All., *Ononis mitissima* L., *Galium decipiens* Jord., *Inula helenioides* Pourr., *Helianthemum pilosum* Pers., et une plante fort curieuse et rare : *Anthyllis onobrychioides* Cav., en société de l'*Arenaria Pseudarmeriastrum* Rouy.

Après avoir traversé le *rio de Villanueva*, dans les sables duquel végètent : *Nerium Oleander* L., *Rumex bucephalophorus* L., *Santolina squarrosa* Willd., *Ononis pubescens* L., *O. ramosissima* Desf., *O. mitissima* L., etc., on entre dans un petit bois de Pins (*Pinus silvestris* L.) situé à la base de la sierra de Valldigna. On peut y prendre, en plus de quelques espèces déjà recueillies : *Halimium lepidotum* Spach, *Helianthemum lavandulifolium* DC., *Salvia Æthiopis* L., *Herniaria polygonoides* Cav., *Lavandula pedunculata* Cav., *Bupleurum protractum* Link et Hoffg.

La sierra de Valldigna s'étend sur une longueur de près de 15 kilomètres et l'ascension en est fort pénible; quelques pics surmontés d'immenses blocs de rochers paraissent même difficilement accessibles. On doit donc, pour rester dans les limites de temps permises, se borner à gravir le cerro de Ubar, le plus élevé de la chaîne. Dans les éboulis et les rocailles il est facile de recueillir : *Hymenostemma Fontanessii* Willk., *Campanula brachiata* Salzm., *Silene saxicola* Rouy, *Carduncellus caeruleus* DC., *Centaurea tenuifolia* Duf., *Teucrium aureum* Schreb., *Quercus coccifera* L., *Galium setaceum* Lamk, *G. frutescens* Cav., *Lavandula latifolia* Vill., *Sideritis pungens* Benth. var. *Tragoriganum* Rouy (*S. Tragoriganum* Lag.), *Brunella hyssopifolia* Moench, *Dianthus Valentinus* Willk., *Helianthemum grandiflorum* DC., *Biscu-*

tella petræa Jord., *Dianthus brachyanthus* Boiss. var. *montanus* Willk. et Lge, *Hypericum ericoides* L., *Malva althæoides* Cav., *Teucrium Majorana* Pers., *Leucanthemum gracilicaule* Duf., *Linum Narbonense* L., *Sedum Clusianum* Guss., *Coronilla coronata* DC. (*C. Clusii* Duf.), etc.

Abordant ensuite la partie supérieure de la montagne, on peut récolter : *Chaenorrhinum crassifolium* Lge, *Serratula Barrelieri* Duf., *Corynolobus Bæticus* R. v. Rœm. (abondant par places sur les parois des grands rochers), *Lactuca tenerrima* Pourr., *Lithospermum fruticosum* L., *Erythraea Barrelieri* Duf., *Silene glauca* Pourr., *Thymus æstivus* Reut., *Scabiosa tomentosa* Cav., *Rhamnus lycioides* L., *Salvia lavandulæfolia* Vahl, *Veronica Assoana* Willk., *Teucrium gnaphalodes* Vahl.

Ces récoltes faites, il est urgent de descendre sur Valldigna afin de disposer du temps nécessaire pour revenir à pied à Carcagente, en suivant la voie du « tramvia ». L'exploration des talus et rochers procure : *Centaurea aspero-Calcitrapa* (*C. hybrida* Chaix), rare au milieu des parents (*C. Calcitrapa* L. et *C. aspera* L. var. *subinermis* DC.), *Hedysarum humile* L., *Rumex Tingitanus* L., *Haplophyllum Hispanicum* Spach, *Erodium Cavanillesii* Willk., puis, plus près de la ville, dans les haies, *Centaurea stenophylla* Duf., très abondant.

Retour de Carcagente à Játiva par le dernier train.

V. **Sierra Mariola** (altitude 1400 mètres). — Départ de Játiva à neuf heures du matin par la diligence d'Alcoy; arrivée vers une heure aux *Ventas de Muro* (1), situées à un kilomètre environ de la base de la sierra. Il est bon de demander au patron d'une des auberges qu'il vous serve de guide dans la montagne et se charge de votre boîte ou de votre cartable, ce qu'il fait du reste volontiers, s'en remettant à vous pour l'appréciation de sa peine.

On doit gagner rapidement le *barranco del Campo*, séparant les *cerros de Moncabrer* et de *Agres*. Les champs, les vignes, les talus situés entre les ventas et l'entrée du barranco (vallon encaissé, torrent) offrent : *Galactites tomentosa* Moench, *Hypecoum grandiflorum* Benth., *Centaurea pullata* L., *Anacyclus Valentinus* L., *Vaillantia hispida* L., *Psoralea bituminosa* L., *Andryala laciniata* Lamk, *Moricandia arvensis* DC., *Rapistrum rugosum* L'Hérit., *Convolvulus althæoides* L., *Ajuga Iva* Schreb., *Plantago albicans* L., *Trisetum neglectum* R. et Sch., *Helianthemum lavandulæfolium* DC., *Fumana viscida* Spach, *F. lævipes* Spach, *Rœmeria violacea* Medik.

En suivant le sentier du barranco qui, à travers des vignes et un petit bois de Pins d'abord, puis ensuite à travers les éboulis, conduit à la maison

(1) Une *Venta* est une auberge servant de relais aux courriers et aux diligences.

du garde de la sierra, on recueille successivement : *Euphorbia Characias* L., *Scorzonera graminifolia* L. var. *major* Willk. et Lge, *Rosmarinus officinalis* L., *Carduncellus Monspeliensis* All., *Galium aciphyllum* Willk. et Costa, *Dianthus Hispanicus* Asso, *Sonchus tenerrimus* L., *Helianthemum ledifolium* Willd., *Cistus albidus* L., *Convolvulus lineatus* L., *Linum angustifolium* Huds., *Plantago albicans* L., *Helianthemum dichroum* Kze, *Lavandula latifolia* Vill., *Hedysarum humile* L., *Hypericum ericoides* L., *Sedum Clusianum* Guss., *Helianthemum grandiflorum* DC., *Antirrhinum Barrelieri* Duf., *Lactuca tenerrima* Pourr., *Biscutella stenophylla* Duf., *Polygala rupestris* Pourr., *Malva althæoides* Cav., *Paronychia capitata* DC., *Knautia subscaposa* Boiss. et var. *subintegerrima* Rouy, *Leucanthemum gracilicaule* Duf., *Hymenostemma Fontanesii* Willk., *Carduus Granatensis* Willk., *Erythraea Barrelieri* Duf., *Convolvulus lanuginosus* Desr. (rare) et var. *sericeus* Boiss. (commun), *Centaurea Mariolensis* Rouy, *Scabiosa tomentosa* Cav., *Teucrium aureum* Schreb., *Onobrychis montana* DC., *Euphorbia Mariolensis* Rouy, *Reseda lutea* L., *Paronychia aretioides* DC.

Auprès de la maison du garde se trouve une source où l'on peut renouveler sa provision d'eau ; dans la haie qui la domine sont cultivés quelques beaux pieds de *Rosa sulphurea* Ait.

Prenant alors à droite un petit chemin tracé, tantôt sur le roc, tantôt à travers les éboulis, on gagne le pied des immenses rochers ou *peñas* qui couronnent le cerro de Agres ; durant ce trajet on récolte : *Scorzonera graminifolia* L. var. *minor* Willk. et Lge, *Serratula Barrelieri* Duf., *Jurinea humilis* DC., *Centaurea Mariolensis* Rouy, *Erinacea pungens* Boiss., *Erysimum australe* J. Gay var. *simplex* Willk. et Lge, *Onopordon acaule* L., *Helianthemum nudicaule* Dun., *Paronychia aretioides* DC., *Andryala macrocephala* DC., *Xeranthemum inapertum* Willd. var. *subalpinum* Rouy, *Asphodelus cerasiferus* J. Gay, *Salvia lavandulifolia* Vahl, *Lithospermum fruticosum* L., *Scabiosa tomentosa* Cav.

Au pied même des *peñas*, dans les rocaïlles ou sur les parois des petits rochers, se trouvent quelques espèces des plus intéressantes : *Euphorbia isatidifolia* Lamk, *Conopodium ramosum* Costa, *Iberis Tenoreana* DC., *I. Lagascana* DC., *I. Hegelmaieri* Willk., *Æthionema ovalifolium* Boiss., *Daphne jasminea* S. et Sm., *Arenaria obtusiflora* Kze, *Bupleurum opacum* Lge, *Linaria depauperata* Leresche, *Clypeola microcarpa* Moris, *Hutchinsia petræa* R. Br. var. *Granatensis* Asso, *Tulipa australis* Link var. *montana* Willk., *Uropetalum serotinum* Gawl. Sur les roches ou dans leurs fissures croissent : *Campanula Hispanica* Willk., *Asplenium leptophyllum* Lag., *Sarcocapnos crassifolia* DC. var. *speciosa* Boiss., *Hieracium Mariolense* Rouy, *Draba Hispanica* Boiss., *Jasione foliosa* Cav.

L'heure étant alors déjà fort avancée, il faut songer à la retraite, mais auparavant jouir du magnifique point de vue qui s'offre aux regards, d'un des points les plus élevés de la province d'Alicante. A l'est, l'horizon est limité par les hautes sierras de Benicadell et de Aitana, au sud par les montagnes de Penaguila et la sierra de Carrascal, qui, avec la sierra Mariola à l'ouest et les montagnes d'Albayda au nord, forment un splendide cirque dont le centre est occupé par l'importante ville d'Alcoy, une des plus éclairées et des plus manufacturières du sud de l'Espagne. Le panorama devient même véritablement féerique lorsqu'en regardant par-dessus les montagnes d'altitude déjà fort respectable qui avoisinent Albayda et celles qui dominent Játiva, on peut voir se dérouler à perte de vue les riches campagnes, les champs d'Orangers et les rizières des environs d'Alcira et de Carcagente, puis l'immense lac d'Albufera et une partie de la *huerta* si renommée de Valencia.

Ce superbe panorama, le sentiment de bien-être que procure la fraîcheur des lieux élevés, alors que dans la plaine la température est plus que tiède à cette époque de l'année, et les excellentes récoltes déjà faites, vous font oublier rapidement les quelques petites fatigues de l'ascension. Il est toutefois bon de ne pas se considérer comme au terme de ses tribulations, car la descente directe sur les ventas de Muro, qui doit s'effectuer à travers les éboulis et les blocs de rochers par des passages quelquefois difficiles, ne le cède en rien à la montée, si même elle n'est pas plus ardue; mais elle permet de recueillir encore plusieurs plantes, dont quelques-unes non rencontrées jusqu'alors: *Matthiola tristis* R. Br., *Hieracium macranthum* Ten., *Silene glauca* Pourr., *Dianthus brachyanthus* Boiss. var. *montanus* Willk. et Lge, *Arenaria capitata* Lamk., *Teucrium buxifolium* Schreb., *Cynoglossum Arundanum* Coss. var. *Mariolense* Rouy, *Muscari racemosum* Mill., *Galactites Duriei* Spach, *Paronychia aretioides* DC., *Reseda leucantha* Hegelm., *Globularia vulgaris* L. var. *major* Willk., *Galium Valentinum* Lge, *Scrophularia sciaphila* Willk., *Ononis Aragonensis* Asso, *Diplotaxis brassicoides* Rouy, *Taraxacum tomentosum* Lge, *Chaenorrhinum crassifolium* Lge, *Scabiosa Monspeliensis* Jacq. var. *subacaulis* Rouy, *Thymus æstivus* Reut. (très abondant), *Cytisus sessilifolius* L., *Linaria hirta* Moench.

De retour aux ventas, il ne reste plus, après un repas forcément sommaire, qu'à prendre vers dix heures la diligence de Játiva qui vous ramène en cette ville vers cinq heures du matin. Cette herborisation est certainement une des plus productives que l'on puisse faire dans la province d'Alicante, et la proximité de deux centres importants, Játiva et Alcoy, rend l'exploration de la sierra Mariola relativement facile.

Obs. — Pressé par le temps, il ne m'a été possible d'explorer que la

partie orientale de la sierra Mariola, c'est-à-dire le barranco del Campo et le cerro de Agres dominant le village de ce nom. Toutefois, pour compléter l'ensemble de la végétation de cette chaîne, je donne ici la liste des espèces indiquées, quelquefois avec doute, au cerro de Moncabrer et que je n'ai point vues au cerro de Agres; elles sont peu nombreuses d'ailleurs :

Anemone trifolia L., *Erodium Valentinum* Boiss. et Reut., *Adenocarpus intermedius* DC., *Ononis rigida* Kze, *O. crispa* L., *Potentilla caulescens* L., *Poterium rupicolum* Boiss. et Reut., *Scabiosa saxatilis* Cav., *Armeria latifolia* Willd., *A. allioides* Boiss.

2° Localités nouvelles

Plusieurs botanistes, que j'ai cités dans la préface de ces notes, ont exploré, depuis Barrelier, les environs de Játiva, et il était permis de supposer qu'il ne resterait plus d'importantes découvertes à glaner dans cette région. Toutefois, connaissant la richesse toute particulière de la flore espagnole, je n'ai pas été trop surpris de recueillir dans mes herborisations à Játiva, Valldigna et la sierra Mariola, diverses espèces que mes savants ou illustres devanciers ne semblent pas y avoir rencontrées et dont la découverte à ces localités étend sensiblement l'aire géographique, et par là même présente un certain intérêt.

Je dois signaler tout d'abord deux espèces nouvelles pour la flore d'Espagne : *Clypeola microcarpa* Moris et *Elæoselinum Asclepium* Bert., et quelques espèces ou variétés qui m'ont paru inédites et dont je publierai les diagnoses ultérieurement en indiquant leur habitat aussi exactement que possible. Ensuite je crois devoir appeler l'attention sur un assez grand nombre de plantes qui n'ont pas été indiquées dans les limites de l'ancien royaume de Valence (1), et dont quelques-unes étaient considérées comme appartenant exclusivement, en Espagne, à la région de l'Andalousie; je veux parler des *Carduus Granatensis* Willk., *Cynoglossum Arundanum* Coss., *Iberis Tenoreana* DC., *Tyrimnus leucographus* Cass., *Brassica Blancoana* Boiss et Reut., *Calendula Malacitana* Boiss. et Reut., *Linaria ignescens* Kze, *Erucastrum Bæticum* Lge, etc. D'autres, comme les *Conopodium ramosum* Costa, *Artemisia arborescens* L., *Dianthus multiceps* Costa, figuraient seulement parmi les espèces qui, dans la Péninsule, n'existaient qu'en Catalogne; d'autres enfin, telles que les *Centaurea Spachii* C.-H. Schultz, *C. prostrata* Coss., *Reseda leucantha* Hegelm.,

(1) L'ancien royaume de Valence comprenait les trois provinces actuelles de Valencia, Alicante, Castellon de la Plana.

Handwritten notes in French:
Centaurea Spachii Willd. et Reut.
C. prostrata Coss. et Reut.

n'avaient été rencontrées que dans les provinces de Murcia et d'Albacete, composant l'ancien royaume de Murcie.

J'ai également recueilli à des localités nouvelles quelques espèces fort rares mentionnées seulement à un ou deux endroits dans les provinces de Valencia ou d'Alicante, notamment : *Linaria depauperata* Ler., *Iberis Hegelmaieri* Willk., *Arenaria obtusiflora* Kze, *Asplenium leptophyllum* Lag., *Helianthemum nudicaule* Dun., *Thymus æstivus* Reut., *Centaurea stenophylla* Duf., etc.

De plus, j'ai eu l'occasion de récolter deux plantes négligées jusqu'à présent par suite de données incertaines (*species non satis notæ*), et qui me paraissent constituer de bonnes espèces : ce sont les *Echium angustifolium* Lamk, *Centaurea cruenta* Willd. J'estime devoir y ajouter *Teucrium Majorana* Pers., dont M. Willkomm a trouvé une forme *procumbens* dans les îles Baléares, principalement à Majorque.

Dans la liste ci-dessous se trouveront énumérées, non seulement les espèces dont j'ai parlé plus haut, mais aussi celles qui, tout en étant plus répandues que les premières, méritent également, par leur rareté relative, d'être signalées.

Pour abrégé, et afin d'éviter la répétition continuelle du nom des localités explorées, je vais suivre l'ordre que j'ai adopté dans le compte rendu des herborisations, et mentionner au fur et à mesure les plantes non encore indiquées où je les ai récoltées.

1. Jativa : cerro del Castillo.

<i>Nigella Damascena</i> L. var. <i>minor</i> Boiss.	<i>Coronilla juncea</i> L.
<i>Sarcocapnos crassifolia</i> DC. var. <i>speciosa</i> Boiss. (S. <i>speciosa</i> Boiss.). — Parois des grands rochers à gauche (versant nord).	<i>Galium rigidum</i> Vill. var. <i>falcatum</i> Willk. et Lge.
<i>Konigia maritima</i> R. Br. var. <i>major</i> Rouy.	<i>Anacyclus Valentinus</i> L.
<i>Biscutella petraea</i> Jord.	<i>Atractylis cancellata</i> L.
— <i>pinnatifida</i> Jord.	<i>Centaurea cruenta</i> Willd. — Rocailles à la base des grands rochers à droite (versant nord).
<i>Fumana viscida</i> Spach.	<i>Centaurea aspera</i> L. var. <i>subinermis</i> DC. — Spachii C. H. Schultz.
<i>Reseda Aragonensis</i> Losc. Pard.	<i>Urospermum Dalechampi</i> Desf.
<i>Polygala rupestris</i> Pourr.	<i>Picridium intermedium</i> C. H. Schultz. — Parois des grands rochers, à gauche.
<i>Silene Tenoreana</i> Coll. — Eboulis des grands rochers à gauche (versant nord).	<i>Lactuca tenerrima</i> Pourr.
<i>S. Saxifraga</i> L. var. <i>Hispanica</i> Rouy. — Parois et fissures des rochers.	<i>Andryala sinuata</i> L.
<i>Dianthus Sætabensis</i> Rouy.	<i>Sonchus tenerrimus</i> L. var. <i>spinulosus</i> Lge.
<i>D. brachyanthus</i> Boiss. var. <i>montanus</i> Willk. et Lge.	<i>Scrofularia sclephila</i> Willk. (abondant).
<i>Arenaria minutiflora</i> Losc.	<i>Antirrhinum Barrelieri</i> Duf. var. <i>piliferum</i> Rouy.
<i>Lavatera maritima</i> Gouan.	<i>Orobanche Hederæ</i> Duby (Vauch.).
<i>Erodium malacoides</i> L'Hérit. var. <i>macrophyllum</i> Lge (E. <i>althæoides</i> Jord).	<i>Thymus æstivus</i> Reut.
<i>Ononis ramosissima</i> Desf.	<i>Sideritis Sætabensis</i> Rouy. — Col de Vernisia, en dehors de l'enceinte fortifiée.
— <i>Natrix</i> L. var. <i>villosa</i> Rouy.	

Centaurea cruenta Willd. se reputa si
nomina de C. seridis L.

Teucrium Majorana Pers.

Acanthus mollis L.

Mercurialis ambigua L. f.

Thesium divaricatum Jan.

2. Jativa : cerro de Vernisia.

Ranunculus gramineus L. var. luzulaefolius Boiss.

Biscutella stenophylla Duf.

Helianthemum dichroum Kze.

Viola arborescens L.

Silene colorata Poir. var. canescens S. et G.

Dianthus multiceps Costa.

— *Hispanicus Asso.*

Rhamnus lycioides L. var. pubescens Rouy.

Lathyrus saxatilis Boiss.

Asperula tenuiflora Jord.

Artemisia arborescens L.

Helichrysum Stœchas DC. var. cœspitosum Willk.

Lactuca tenerrima Pourr.

Sonchus oleraceus L. var. lacerus Wallr.

Coris Monspelienis L.

Convolvulus lanuginosus Desr. var. sericeus Boiss. (C. linearis DC.).

Thymus æstivus Reut.

Ajuga Iva Schreb.

Thesium divaricatum Jan.

Thesium neglectum R. et Sch.

Kœleria setacea DC.

Sables et rocailles au pied du cerro de Vernisia, versant nord :

Lavatera Cretica L.

Ononis ramosissima Desf. var. arenaria G. et G. (O. arenaria DC.).

Cornicina lotoides Boiss.

Calendula Malacitana B. et R.

Centaurea pullata L.

Linaria ignescens Kze.

Orobanche pruinosa Lap. (O. speciosa DC.).

Stachys hirta L.

Polygonum aviculare L. var. vegetum Ledeb.

Cyperus esculentus L.

3. Jativa : bords du rio Montesa et cerro del Calvario.

De Jativa au rio Montesa :

Fumaria pallidiflora Jord.

Ononis ramosissima Desf.

Lathyrus latifolius L.

Chrysanthemum Myconis L.

Anacyclus Valentinus L.

Centaurea pullata L.

Scrofularia Valentina Rouy.

Andrachne telephioides L.

Sables du rio Montesa et bords des rizières :

Santolina incana Lamk.

Arenaria leptoclados Guss.

Ipomœa sagittata Desf.

Du rio Montesa à la route d'Alcoy :

Moricandia arvensis DC.

Linum strictum L. var. cymosum G. et G.

Poterium verrucosum Ehrh.

Scabiosa Monspelienis Jacq.

Helichrysum serotinum Boiss.

Tyrimnus leucographus Cass.

Sonchus tenerrimus L. var. spinulosus Lge.

Trachelium cœruleum L.

Phalaris paradoxa L.

Stipa tortilis Desf.

Cerro del Calvario, versant est :

Arenaria modesta Duf.

Lavatera maritima Gouan.

Anthyllis genistoides Duf.

Trifolium tomentosum L.

Elæoselinum Asclepium Bert.

Elæoselinum Lagasœ Boiss.

Asperula scabra Presl var. glabrescens Boiss.

Scabiosa Monspelienis Jacq.

Atractylis humilis L.

Centaurea aspera L. var. *subinermis* DC.
Echium angustifolium Lamk.
Thymus aestivus Reut.
Sideritis pungens Benth. var. *Tragoriganum Rouy* (S. *Tragoriganum* Lag.).
Ajuga Iva Schreb.
Avena barbata Brot. var. *triflora* Willk.

Cerro del Calvario, versant nord :

Delphinium peregrinum L.
Diplotaxis viminea DC.
Velezia rigida L.
Erodium Cavanillesii Willk.
Micropus bombycinus Lag.
Chœnorrhinum crassifolium Lge (Linaria *crassifolia* Kze) var. *elongatum* Rouy.
Teucrium Pseudochamaepitys L.
Statice echinoides L.
Allium pallens L.

4. Valldigna : cuesta de Barig, la Ermita, cerro de Ubar.

Cuesta de Barig :

Delphinium peregrinum L.
Biscutella collina Jord.
Helianthemum dichroum Kze.
Dianthus velutinus Guss.
— *Hispanicus* Asso var. *elongatus* Rouy.
Malva althæoides Cav.
Hypericum ericoides L.
Ononis pubescens L.
Anthyllis genistoides Duf.
Elæoselinum Asclepium Bert.
— *Lagascæ* Boiss.
Vaillantia hispida L.
Leucanthemum gracilicaule Duf.
Santolina squarrosa Willd.
Echinops Ritro L.
Galactites tomentosa Moench.
Kentrophyllum lanatum DC.
Serratula Barrelieri Duf.
Centaurea prostrata Coss.
— *Melitensis* L.
Crupina Crupinastrum Vis.
Urospermum picroides Desf.
Erica multiflora L.
Coris Monspelienensis L.
Androsace maxima L.
Chlora perfoliata L.
Erythraea Barrelieri Duf.
Thymus Piperella L.

De la « cuesta de Barig » à la « ermita de Valldigna » :

Helianthemum pilosum Pers.
Arenaria Pseudarmeriastrum Rouy.
Malva Hispanica L.
Ononis mitissima L.
Galium decipiens Jord.
Inula helenioides Pourr.
Pulicaria odora Rehb.
Scorzonera angustifolia L.
Salvia Valentina Vahl.
Stachys Heraclæa All.

Sables du « rio de Villanueva » et bois de Pins à la base du « cerro de Ubar » :

Helianthemum lavandulæfolium DC.
Ononis ramosissima Desf.
— *pubescens* L.
— *mitissima* L.
Bupleurum protractum Hoff et Link.
Santolina squarrosa Willd.
Nerium Oleander L.
Lavandula pedunculata Cav.

Cerro de « Ubar », les éboulis et les « peñas » :

Erucastrum Bæticum Lge. — Au pied des grands rochers et sur leurs parois ; abondant par places.
Biscutella petræa Jord.
Helianthemum grandiflorum DC.
Silene glauca Pourr.
— *saxicola* Rouy.
Dianthus Valentinus Willk.
— *brachyanthus* Boiss. var. *montanus* Willk. et Lge.

Malva althæoides Cav.
Hypericum ericoides L.
Sedum Clusianum Guss.
Scabiosa tomentosa Cav.
Leucanthemum gracilicaule Duf.
Hymenostemma Fontanesii Willk.
Centaurea tenuifolia Duf.
Serratula Barrelieri Duf.
Lactuca tenerima Pourr.
Campanula brachiata Salzm.

Erythraea Barrelieri Duf.
Lithospermum fruticosum L.
Veronica Assoana Willk.
Thymus æstivus Reut.
Salvia lavandulæfolia Vahl.
Sideritis pungens Benth. var. *Tragoriganum Rouy* (S. *Tragoriganum* Lag.).
Brunella hyssopifolia Mæench.
Teucrium gnaphalodes Vahl.
 — *Majorana* Pers.

Rochers et talus le long de la voie du tramvia de Valldigna à Carcagente :

Erodium Cavanillesii Willk.
Haplophyllum Hispanicum Spach.
Hedysarum humile L.

Centaurea aspero-Calcitrapa Gr. et Godr.
 — *stenophylla* Duf.
Rumex Tingitanus L.

5. La sierra Mariola.

Des « ventas de Muro » au « barranco del Campo » :

Moricandia arvensis DC.
Helianthemum lavandulæfolium DC.
Fumana lævipes Spach.
 — *viscida* Spach.
Vaillantia hispida L.

Anacyclus Valentinus L.
Centaurea pullata L.
Andryala laciniata Lam.
Ajuga Iva Schreb.
Trisetum neglectum R. et Sch.

Du « barranco del Campo » jusqu'à la « casa del guardian » :

Helianthemum dichroum Kze.
 — *grandiflorum* DC.
Polygala rupestris Pourr.
Dianthus Hispanicus Asso.
Malva althæoides Cav.
Hedysarum humile L.
Onobrychis montana DC.
Paronychia capitata DC.
Sedum Clusianum Guss.
Galium aciphyllum Willk. et Costa.
Scabiosa tomentosa Cav.
Knautia subscaposa B. et R., et var. *subintegerrima* Rouy.
Santolina squarrosa.

Leucanthemum gracilicaule Duf.
Hymenostemma Fontanesii Willk.
Carduncellus Monspelienensis All.
Carduus Granatensis Willk.
Centaurea Mariolensis Rouy.
Scorzonera graminifolia L. var. *major* Willk.
 et *Lge* (S. *macrocephala* DC.).
Lactuca tenerima Pourr.
Convolvulus lanuginosus Desr. var. *sericeus* Boiss. (C. *linearis* DC.)
 — *lineatus* L.
Euphorbia Characias L.
 — *Mariolensis* Rouy.

De la « casa del guardian » à la base des « peñas » du cerro de Agres :

Erysimum australe Gay forma *simplex* Willk. et *Lge*.
Helianthemum nudicaule Dun.
Paronychia aretioides DC.
Scabiosa tomentosa Cav.
Onopordon acaule L.
Jurinea humilis DC.
Centaurea Mariolensis Rouy.

Serratula Barrelieri Duf.
Xeranthemum inapertum Willd. var. *subalpinum* Rouy.
Scorzonera graminifolia L. var. *minor* Willk. et *Lge* (S. *pinifolia* Gouan).
Andryala macrocephala DC.
Lithospermum fruticosum L.
Asphodelus cerasiferus Gay.

Éboulis et parois des « peñas » au sommet du cerro de Agres :

Clypeola microcarpa Moris.	Conopodium ramosum Costa. ? ?
Iberis Tenoreana DC.	Hieracium Mariolense Rouy.
— Lagascana DC.	Linaria depauperata Ler. ?
— Hegelmaieri Willk.	Daphne jasminea S. et Sm. ?
Æthionema ovalifolium Boiss.	Tulipa australis Link var. montana Willk.
Hutchinsia petræa R. Br. var. Granatensis	(T. Hispanica Clus.).
Asso. Amo	Uropetalum serotinum Gaul. ? ?
Arenaria obtusiflora Kze.	Asplenium leptophyllum Lag. ? ?
Bupleurum opacum Lge.	

Rocailles du cerro de Agres, versant est :

Diplotaxis brassicoides Rouy.	Galium Valentinum Lge.
Reseda leucantha Hegelm.	Galactites Duriæ Spach.
Silene glauca Pourr.	Taraxacum tomentosum Lge.
Dianthus brachyanthus Boiss. var. montanus Willk. et Lge.	Hieracium macranthum Ten.
Arenaria capitata Lamk.	Convolvulus lanuginosus Desr.
Scabiosa Monspelienensis Jacq. var. subacaulis Rouy.	Cynoglossum Arundanum Coss. var. Mariolense Rouy.

Les listes précédentes ne font mention que des plantes récoltées à des localités où elles n'avaient pas encore été signalées; mais comme la plupart des espèces que j'ai vues, tant à Jativa qu'à Valldigna ou à la sierra Mariola, n'y ont été recueillies que par Cavanilles ou Dufour, il y a plus de soixante ans, ou un peu plus près de notre époque, depuis 1850, par Bourgeau et par MM. Boissier, Leresche, Hegelmaier, il me paraît dès lors utile de rappeler la présence de ces plantes dans ces mêmes localités à une date toute récente (1880). Aussi vais-je donner un tableau général de toutes les espèces que j'ai récoltées dans ces parages, afin de présenter un ensemble aussi exact que possible des diverses plantes existant dans la région *Sætabensis*.

Ranunculus gramineus L. var. luzulæfolius Boiss.	ticus Röm. — Brassica Bætica Boiss.).
Nigella Damascena L. var. minor Boiss. (N. Bourgæi Jord.).	Moricandia arvensis DC.
Delphinium peregrinum L.	Eruca vesicaria Cav.
Rømeria violacea Medik. [R. hybrida L. (nomen incongruum)].	Koniga maritima R. Br. var. major Rouy.
Hypecoum grandiflorum Benth.	Draba Hispanica Boiss.
Sarcocapnos crassifolia DC. var. speciosa Boiss. (S. speciosa Boiss. Diagn. or.).	Clypeola microcarpa Moris.
Fumaria pallidiflora Jord.	Biscutella collina Jord., — petræa Jord., — pinnatifida Jord., — stenophylla Duf.
Matthiola tristis R. Br.	Æthionema ovalifolium Boiss.
Erysimum australe Gay. f. simplex Willk. et Lge p. p. (E. curvifolium Jord.).	Iberis Tenoreana DC., — Lagascana DC., — Hegelmaieri Willk.
Diplotaxis viminea DC.	Hutchinsia petræa R. Br. var. Granatensis Asso. Amo
— brassicoides Rouy.	Rapistrum rugosum L'Hérit., — Linnæanum Boiss. et Reut.
Erucastrum Bæticum Lge (Corynelobus Bæ-	Crambe glabrata DC.
	Cistus albidus L., — crispus L.

- Halimium lepidotum Spach.*
Helianthemum ledifolium Willd., — pilosum *Pers.*, — grandiflorum *DC.*, — nudicaule *Dun.*, — hirtum *Pers.*, — lavandulæfolium *DC.*, — dichroum *Kze.*
Fumana lævipes Spach., — viscida *Spach.*
Viola arborescens L.
Reseda Aragonensis Losc. Pardo., — lutea *L.*, — leucantha *Hegeim.*
Polygala rupestris Pourr.
Melandrium dicline Nym. (Lychnis diclinis Lag.). — *maculatum*
Silene Tenoreana Coll., — colorata *Poir. var. canescens Soy et Godr. (S. canescens Ten.).* — glauca *Pourr. (S. ambigua Camb. non Salisb. nec Turcz., S. Sætabensis Duf.).* — saxicola *Rouy.* — Saxifraga *L. var. Hispanica Rouy.*
Dianthus velutinus Guss., — Valentinus *Willk.*, — Sætabensis *Rouy.*, — multiceps *Costa.* — Hispanicus *Asso et var. elongatus Rouy.* — brachyanthus *Boiss. var. montanus Willk. et Lge.*
Velezia rigida L.
Mœhringia pentandra Gay.
Arenaria leptoclados Guss., — minutiflora *Losc.*, — modesta *Duf.*, — obtusiflora *Kze.* — Pseudarmeriastrum *Rouy.* — capitata *Lamk.*
Linum narbonense L., — angustifolium *Huds.*, — strictum *L. var. cymosum G. et G. (L. sessiliflorum Lamk.).*
Malva Hispanica L., — althæoides *Cav.*
Lavatera Cretica L., — maritima *Gouan.*
Erodium malacoides L'Hérit. var. macrophyllum Lge (E. althæoides Jord.). — Cavanillesii *Willk.*
Hypericum ericoides L.
Ruta angustifolia Pers.
Haplophyllum Hispanicum Spach.
Rhamnus lycioides L. et var. pubescens Rouy.
Spartium junceum L.
Erinacea pungens Boiss.
Cytisus sessilifolius L.
Ononis tridentata L. var. β. Willk. et Lge. — Aragonensis *Asso.* — ramosissima *Desf. et var. arenaria G. et G. (O. arenaria DC.).* — Natrix *L. var. villosa Rouy (O. arachnoidea Lapeyr.).* — minutissima *L. var. calycina Willk. et Lge (O. barbata Cav.).* — mitissima *L.*, — pubescens *L.*
Anthyllis cytisoides L., — genistoides *Duf.*, — onobrychioides *Cav.*
Cornicina lotoides Boiss.
Medicago orbicularis All.
Trifolium angustifolium L., — stellatum *L.* — lappaceum *L.*, — tomentosum *L.*
Psoralea bituminosa L.
Lens nigricans Godr.
Lathyrus latifolius L., — saxatilis *Boiss.*
Coronilla juncea L., — coronata *DC. non L. nec Jacq. (C. Clusii Duf.).*
Hedysarum humile L., — humile *L. var. majus Lge (H. Fontanesii Boiss.).*
Onobrychis montana DC.
Scorpiurus subvillosa L.
Poterium verrucosum Ehrnb.
Lythrum acutangulum Lag.
Herniaria polygonoides Cav., — cinerea *Lamk.*
Paronychia argentea Lamk., — capitata *DC.*, — aretioides *DC.*
Sedum Clusianum Guss.
Thapsia villosa L.
Elæoselinum Asclepium Bert., — Lagascæ *Boiss. (Thapsia tenuifolia Lag., — E. tenuifolium Willk.).*
Bupleurum protractum Hoffg et Link., — opacum *Lge.*
Conopodium ramosum Costa.
Galium frutescens Cav., — aciphyllum *Willk. et Costa.* — rigidum *Vill. var. falcatum Willk. et Lge.* — Valentinum *Lge.* — setaceum *Lamk.* — decipiens *Jord.* — saccharatum *All.*
Asperula tenuiflora Jord., — scabra *Presl var. glabrescens Boiss.*
Vaillantia hispida L.
Knautia subscaposa Boiss. et var. subintegerrima Rouy.
Scabiosa Monspelienensis Jacq. et var. subacaulis Rouy. — tomentosa *Cav.*
Bellis annua L.
Senecio gallicus Chaix.
Anthemis arvensis L.
Anacyclus Valentinus L.
Tanacetum annuum L.
Artemisia arborescens L.
Santolina incana Lam., — squarrosa *Willd.*
Hymenostemma Fontanesii Willk. (Leucanthemum Sætabense Duf.).
Leucanthemum gracilicaule Duf.
Chrysanthemum Myconis L.
Inula helenioides Pourr.
Pulicaria odora Rehb.
Asteriscus spinosus G. et G. (Pallenis spinosa Cass.).
Helichrysum Stæchas DC. var. cæspitosum Willk. — serotinum *Boiss.*
Micropus bombycinus Lag.
Calendula Malacitana Boiss et Reut.
Echinops Ritro L.
Stæhelina dubia L.

- Atractylis cancellata* L., — *humilis* L.
Kentrophyllum lanatum DC.
Carduncellus cæruleus DC. var. *incisus* DC. (C. *Tingitanus* DC.). — *Monspeliensium* All.
Centaurea cruenta Willd., — *aspera* L. var. *subinermis* DC., — *stenophylla* Duf., — *aspero-Calciatrapa* G. et G., — *Melitenensis* L., — *tenuifolia* Duf., — *Mariolensis Rouy*, — *prostrata* Coss., — *Spachii* C. H. Schultz, — *pullata* L.
Microlonchus Clusii Spach.
Crupina Crupinastrum Vis.
Serratula Barrelieri Duf.
Leuzea conifera L.
Jurinea humilis DC.
Onopordon aculea L.
Picnomon Acarna Cass.
Carduus Granatensis Willk.
Tyrinnus leucographus Cass.
Galactites tomentosa Moench, — *Duriæi* Spach.
Xeranthemum inapertum Willd. var. *subalpinum* Rouy.
Scolymus Hispanicus L.
Rhagadiolus stellatus DC.
Urospermum picroides Desf. — *Dalechampii* Desf.
Scorzonera crispata Boiss., — *angustifolia* L., — *graminifolia* L. var. *major* Willk. et Lge (S. *macrocephala* DC.), — *graminifolia* L. var. *minor* Willk. et Lge (S. *pinifolia* Gouan).
Taraxacum tomentosum Lge.
Picridium intermedium Schultz Bip.
Lactuca tenerrima Pourr.
Sonchus tenerrimus L. var. *spinulosus* Lge, — *oleraceus* L. var. *lacerus* Walbr. (S. *lacerus* Willd.).
Hieracium Mariolense Rouy, — *macranthum* Ten.
Andryala Ragusina L. var. *lyrata* Willk. et Lge (A. *macrocephala* DC.), — *Ragusina* L. var. *minor* Lge (A. *laciniata* Lamk), — *sinuata* L.
Campanula brachiata Salzmann, — *Erinus* L., — *Hispanica* Willk.
Trachelium cæruleum L.
Jasione foliosa Cav.
Erica multiflora L. (E. *peduncularis* Prest), — *stricta* Don.
Coris Monspeliensis L.
Androsace maxima L.
Olea europæa L.
Phillyrea angustifolia L.
Nerium Oleander L.
Cynanchum acutum L.
- Vincetoxicum nigrum* Moench.
Chlora perfoliata L.
Erythraea Barrelieri Duf.
Convolvulus lanuginosus Desr. et var. *sericeus* Boiss. (C. *linearis* DC.), — *lineatus* L., — *althæoides* L.
Ipomœa sagittata Desf.
Echium angustifolium Lamk.
Anchusa italica Retz.
Lithospermum fruticosum L.
Cynoglossum Arundanum Coss. var. *Mariolense* Rouy.
Scrofularia Valentina Rouy, — *sciaphila* Willk.
Antirrhinum Barrelieri Duf., — *Barrelieri* Duf. var. *pilliferum* Rouy.
Anarrhinum bellidifolium Desf.
Chaenorrhinum crassifolium Lge (Linaria *crassifolia* Kze), — *crassifolium* Lge var. *elongatum* Rouy, — *crassifolium* Lge var. *parviflorum* Lge (L. *Sætabensis* Leresche).
Linaria hirta Moench, — *ignescens* Kze, — *depauperata* Ler.
Veronica Assoana Willk.
Digitalis obscura L.
Orobanche pruinosa Lap. (O. *speciosa* DC.), — *Hederæ* Dub. (Vaucl.).
Lavandula Stœchas L., — *pedunculata* Cav., — *latifolia* Vill., — *multifida* L.
Mentha rotundifolia L.
Thymus Mastichina L., — *Piperella* L., — *Zygis* L., — *æstivus* Reut.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia lavandulæfolia Vahl, — *Æthiopis* L., — *Valentina* Vahl.
Stachys hirta L., — *Heraclea* All.
Phlomis Lychnitis L., — *crinita* Cav. (P. *Barrelieri* Duf.), — *purpurea* L.
Ballota hirsuta Benth.
Sideritis scordioides L., — *pungens* Benth., var. *Tragoriganum* Rouy (S. *Tragoriganum* Lag.). — *Sætabensis* Rouy.
Brunella hyssopifolia Moench.
Ajuga Iva Schreb.
Teucrium Pseudochamæpitys L., — *buxifolium* Schreb., — *Carthaginense* Lge, — *aureum* Schreb., — *gnaphalodes* Vahl, — *capitatum* L., — *Majorana* Pers.
Acanthus mollis L.
Plantago albicans L.
Statice echioides L.
Globularia vulgaris L. var. *major* Willk.
Rumex ntermedius DC., — *Tingitanus* L., — *bucephalophorus* L.
Polygonum aviculare L. var. *vegetum* Ledeb.
Daphne jasminea S. et Sm.

Thesium divaricatum <i>Jan.</i>	Tulipa australis <i>Link</i> var. montana <i>Willk.</i> (<i>T. Hispanica</i> <i>Clus.</i>).
Andrachne telephioides <i>L.</i>	Cyperus esculentus <i>L.</i>
Euphorbia Mariolensis <i>Rouy</i> , — isatidifolia <i>Lamk.</i> , — serrata <i>L.</i> , — Characias <i>L.</i>	Phalaris paradoxa <i>L.</i>
Mercurialis ambigua <i>L. f.</i>	Stipa tortilis <i>Desf.</i>
Quercus coccifera <i>L.</i>	Avena barbata <i>Brot.</i> var. triflora <i>Willk.</i>
Pinus silvestris <i>L.</i>	Trisetum neglectum <i>R. et Sch.</i> , — scabrius- culum <i>Coss.</i>
Asphodelus cerasiferus <i>J. Gay.</i>	Koeleria setacea <i>DC.</i>
Muscari racemosum <i>Mill.</i>	Asplenium leptophyllum <i>Lag.</i> , — Petrar- chæ <i>DC.</i>
Allium pallens <i>L.</i>	
Uropetalum serotinum <i>Gaw.</i>	

De Játiva, l'on pourrait également herboriser à *Mojente*, à *Fuente-la-Higuera*, à *Enguera*, à *Albayda*, où l'on a indiqué quelques espèces ne se trouvant pas dans les localités que j'ai visitées, et qui cependant sont intéressantes à signaler. Je les énumère dans la liste suivante, avec les dix plantes de la sierra Mariola mentionnées au cerro de Moncabrer et que je n'ai point vues au cerro de Agres ; j'y ajoute également les noms de quatre ou cinq espèces indiquées autour de Játiva et que mes herborisations ne m'ont point procurées, qu'elles aient été faites tardivement ou trop tôt :

Anemone trifolia <i>L. ?</i>	Saxifraga Cossoniana <i>Boiss. et Reut.</i> /
Matthiola lunata <i>DC.</i>	Scabiosa saxatilis <i>Cav.</i> /
Meniocus linifolius <i>Desv.</i>	Crucianella patula <i>L.</i> /
Biscutella montana <i>Cav.</i>	Centaurea pectinata <i>L.</i> , — hyssopifolia <i>Duf.</i>
Silene Cretica <i>L.</i>	Campanula Lœflingii <i>Brot.</i> /
Spergularia campestris <i>Willk. et Lge.</i> /	Linaria Cavanillesii <i>Chav.</i> /
Erodium Valentinum <i>Boiss. et Reut.</i> .	Thymus cephalotus <i>L.</i>
Genista oretana <i>Webb</i> , — micrantha <i>Ort.</i>	Teucrium pumilum <i>L.</i>
Cytisus patens <i>L.</i>	Armeria latifolia <i>Willd.</i> ! — allioides <i>Boiss.</i> /
Adenocarpus intermedius <i>DC.</i>	Euphorbia rupicola <i>Boiss.</i> /
Ononis Sicula <i>Guss.</i> , — rigida <i>Kze.</i> , — crispa <i>L.</i> :	Parietaria Mauritanica <i>DR.</i>
Potentilla caulescens <i>L.</i> /	Cynosurus polybracteatus <i>Poir.</i>
Poterium runcunculoides <i>Boiss. et Reut.</i> /	Festuca capillifolia <i>Duf.</i> /

Extrait du *Bulletin de la Société botanique de France.*

Tome XXVIII, séance du 27 mai 1881.