

NARCISSORUM NOTULÆ, XLVIII

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS



Fontqueria **56**(52): 553-554 [seorsim: 1-2]
LA GUARDA (Campanario, Badajoz), 23-XII-2016

FONTQUERIA is a series of botanical publications without administrative affiliation. It publishes original works in Botany, particularly those that are of interest to the editors. Its publications are in any language, the only limitation being the ability of the editorial team.

Accredited with the *International Association for Plant Taxonomy* for the purpose of registration of new non-fungal plant names.

DISTRIBUTION

Postal distribution: Contact the editor

Mail for electronic distribution: Fontqueria@yahoo.com

Cubierta: Fotografía de archivo nº J-3220; se ha retirado hacia atrás la espata. Cámara *Nikon D3*, objetivo *Micro-Nikkor 105 mm, 1:4*. Colección «Mirueña de los Infanzones: pr., km 1 secus viam P-630, 40°43,206'N, 005°04,439'W, ad 3827 hp. Humidis apricis; substrato siliceo», *F. J. Fernández Casas Ff_2009-068*, 25-iii-2009. Precisamente la colección tipo de *Narcissus × abulensis* Fernández Casas (2016).

EDITOR

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

La Guarda (Campanario, Badajoz): fjfcasas@yahoo.com

Narcissorum notulæ, XLVIII

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

La Guarda (Campanario, Badajoz): fjcfcasas@yahoo.com

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (23-xii-2016). Narcissorum notulæ, XLVIII. *Fontqueria* 56(52): 553-554 [seorsim: 1-2].

Keywords. Nomenclature, Systematics; New hybrid; *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*), sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815); *N. × abulensis* Fernández Casas (2016), *N. juressianus* Fernández Casas (1986) × *N. turgidus* Salisbury (1796).

Abstract. Notes on the systematics and nomenclature of the genus *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). A new hybrid species is proposed in section *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815): *N. × abulensis* Fernández Casas (2016), probably engendered by the crossing *N. juressianus* Fernández Casas (1986) × *N. turgidus* Salisbury (1796).

Zusammenfassung. Notizen zu Systematik und Nomenklatur der Gattung *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Eine neue Art im Sektion *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815) wird vorgeschlagen: *N. × abulensis* Fernández Casas (2016), wahrscheinlich hervorgerufen durch *N. juressianus* Fernández Casas (1986) × *N. turgidus* Salisbury (1796).

Résumé. Notes systématiques et nomenclaturales au sujet du genre *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Une nouvelle espèce est proposée dans la section *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815): *N. × abulensis* Fernández Casas (2016), engendrée probablement par le croisement *N. juressianus* Fernández Casas (1986) × *N. turgidus* Salisbury (1796).

Resumo. Notas sistemáticas e nomenclaturais sobre o gênero *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Uma nova série híbrida é proposta na secção *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815): *N. × abulensis* Fernández Casas (2016), engendrada provavelmente pelo cruzamento *N. juressianus* Fernández Casas (1986) × *N. turgidus* Salisbury (1796).

Resumen. Notas sistemáticas y nomenclaturales acerca del género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Se propone una especie nueva en la sección *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815): *N. × abulensis* Fernández Casas (2016), engendrada probablemente por el cruce *N. juressianus* Fernández Casas (1986) × *N. turgidus* Salisbury (1796).

Prosigue la secuencia de asientos que se dedican a la sistemática del género *Narcissus* (*Amaryllidaceæ*); véase nuestra última publicación que ha tratado del mismo tema, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (02-iv-2016).

Describimos hoy una noto especie nueva, dentro de la sección *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815), del género *Narcissus* Linnaeus (1753), *Amaryllidaceæ*: *N. juressianus* Fernández Casas (1986) × *N. turgidus* Salisbury (1796).

El nuevo mesto se había observado y colectado en 2009. En el herbario SALA pudimos estudiar otra colección de 1994 que parece idéntica; pero nuestra identificación ha de ser tomada con precaución, que el material seco da muchas sorpresas.

Sectio *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815)

Narcissus Linnaeus sect. **Bulbocodii** (Salisbury) De Candolle, Fl. franç. 6: 325, n° iv (1815), "Bulbocodiens"; De Candolle in Redouté, Liliacées 8: [126] sub tab. 486 (1816)

SPECIES TYPICA: *N. Bulbocodium* Linnaeus, Sp. pl. 1: 289-290, n° 3 (1753)

- = *Corbularia* [Salisbury, Trans. Hort. Soc. London 1: 349-351 (1812)] Salisbury ex Haworth, Suppl. Pl. Succ.: 120 (v-1819)
- ≡ *Narcissus* Linnaeus, subgen. *Corbularia* (Salisbury) Spach, Hist. vég. (phan.) 12: 431 (1846); (Salisbury) Pax (1887)
- ≡ *Narcissus* Linnaeus, sect. *Corbularia* (Salisbury) Schultes f. in Schultes & Schultes f., Syst. vég. (phan.) 7(2): 932-933, nº 1452.a: 1-5 (1830); “*Corbulariae*”; (Salisbury) Herbert, Amaryll.: 2 (1888)
SPECIES TYPICA: *Corbularia tenuifolia* (Salisbury) Salisbury, Trans. Hort. Soc. London 1: 349-350 (1812), ≡*Narcissus tenuifolius* Salisbury, Prodr.: 222, nº 8 (1796)
- BIBLIOGR.: M. C. DURIEU DE MAISONNEUVE in P. E. S. DUCHARTRE (1847: 426); M. J. ROEMER (1847: 189-191).

48 ***Narcissus ×abulensis*** Fernández Casas, Fontqueria 56(52): 554, nº 48 (23-xii-2016)

- = *Narcissus juressianus* Fernández Casas (1986) × *N. turgidus* Salisbury (1796), nobis videatur
TYPUS: *F. J. Fernández Casas Ff_2009-068*, 25-III-2009 (herb. FJFC).
- Sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle, Fl. franc. 6: 325, nº iv (1815), “*Bulbocodiens*”; De Candolle in Redouté, Liliacées 8: [126] sub tab. 486 (1816)
- ≠ *Narcissus ×carpetanus* (Barra Lázaro & G. López) Fernández Casas, Fontqueria 6: 49, nº 61 (23-x-1984), quod est *N. nivalis* Graëlls (1854) × *N. turgidus* Salisbury (1796), nobis videtur

ILLUSTR.: Tabula nostra, hoc loco initialis pagella, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (23-xii-2016: pag. i).

DIAGNOSIS vel character essentialis

Quoad perigonii colorem inter *Narcissum juressianum* et *N. turgidum* valde interiectus, quoad cetera omnino medius etiam.

ORIGEN DEL RESTRICTIVO

Abulensis, -e, es adjetivo latino, gentilicio de la ciudad y provincia de Ávila.

OBSERVACIONES

La planta se parece talmente a *Narcissus turgidus*, con el color más saturado, más tirando a gualdo que a citrino, y con la corona levemente más estrechada en su base. El androceo es muchas veces exerto, pero no siempre; hay muchas ocasiones en que las anteras no sobresalen de la corona.

Aclaremos que a pesar de su aspecto del todo intermedio entre sus presuntos progenitores, y pese a que no se han observado dilataciones en el hipanto, la planta pudiera ser fértil, y nomoe-specie por tanto; no lo hemos comprobado todavía.

Hs, ÁVILA:

- 30TUL20 40.70°, 005.07°; «San Juan del Olmo: ermita de San Juan del Olmo, 1310 m. Prados húmedos. Flores más pálidas», *A. Gutiérrez Balbas & C. J. Valle Gutiérrez*, s/n, 28-III-1994 (SALA 137066).
- 30TUL20 UL2409, «Mirueña de los Infanzones: pr., km 1 secus viam P-630, 40°43,206'N, 005°04,439'W, ad 3827 hp. Humidis apricis; substrato siliceo», *F. J. Fernández Casas Ff_2009-068*, 25-III-2009 (herb. FJFC, holo-; typus *N. ×abulensis*).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DURIEU DE MAISONNEUVE, Michel Charles in Pierre Étienne Simon DUCHARTRE (1847). Espèces nouvelles de l’Algérie; 2e suite. *Rev. Bot.* 2(9-10):: 424-439.
- FERNÁNDEZ CASAS, Francisco Javier (02-IV-2016). *Narcissorum notulæ*, XLV-XLVII. *Fontqueria* 56(49): 467-480 [seorsim: 1-14].
- ROEMER, Max Joseph (1847). Subordo III. *Narcissineæ*. In *Familiarum naturalium regni vegetabilis synopsis monographicæ seu Enumeratio omnium plantarum hucusque detectarum secundum ordines naturales, genera et species digestarum, additis diagnosibus, synonymis, novarumque vel minus cognitarum descriptionibus*. Fasc. IV Ensatae. Pars prima: 146-244. Weimar.