

F.150

C A T A L O G U S

~~1-3 1778~~

ARBORUM ET FRUTICUM

I N

H O R T O E D I N E N S I

G R E S C E N T I U M

Anno 1778.



E D I N B U R G I :

Apud BALFOUR et SMELLIE,

M,DCC,LXXVIII.

1800-1801

1800-1801

C A T A L O G U S

ARBORUM ET FRUTICUM.

+ *Hedysarum* mouuant.

- ACER** *tartaricum*, foliis cordatis indivisis ferratis; lobis ob-
soletis, floribus racemosis
pseudoplatanus, foliis quinquelobis inaequaliter ferratis,
floribus racemosis
— *rubrum*, foliis quinquelobis subdentatis subtus glaucis.
pedunculis simplicissimis aggregatis
— *saccharinum*, foliis quinquepartito-palmatis acuminato-
dentatis, subtus pubescentibus
— *platanoides*, foliis quinquelobis acuminatis acute den-
tatis glabris, floribus corymbosifis
— *penylvanicum*, foliis trilobis acuminatis ferrulatis, flori-
bus racemosis
tampestre, foliis lobatis obtusis emarginatis
monspessulanum, foliis trilobis integerrimis glabris an-
nulis
negundo, foliis compositis, floribus racemosis
— *creticum*, foliis trilobis integerrimis pubescentibus per-
ennantibus

- ÆSCULUS** *hippocastanum*, floribus heptandris
pavia, floribus octandris
— *flava*, foliis quinis, calyce ovato, unguibus duplo bre-
viore, laminis cordato-subrotundis, staminibus in-
flexis. S.

- AMORPHA** *fruticosa*

- AMYGDALUS** *persica*, foliis ferraturis omnibus acutis, floribus sessili-
bus solitariis
communis, foliis ferraturis infimis glandulosis, floribus
sessilibus geminis
pumila, foliis venoso-rugosis
nana, foliis basi attenuatis

- ANAGYRIS** *foetida*



- ANDROMEDA** *marianna*, pedunc. aggregatis, coroll. cylindricis, foliis alternis ovatis integerrimis
polifolia, pedunc. aggregatis, coroll. ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis
racemosa, racem. secundis bracteatis, coroll. gibbosocylindricis, foliis alternis oblongis ferratis
arborea, racem. secundis nudis, coroll. rotundo ovatis
calyculata, racem. secundis foliaceis, coroll. subcylindricis, foliis alternis lanceolatis obtusis punctatis
daboechia, racem. secundis, floribus quadrifidis ovatis foliis alternis lanceolatis revolutis
spicata, racem. spicaeform. secundis, corol. subcylindracea, foliis oblongis ferrulatis subfessilibus deciduis. S.
populi folia
- ANNONA** *triloba*, foliis lanceolatis, fruct. trifidis
- ARALIA** *spinosa*, arborescens, caule foliisque aculeata
- ARBUTUS** *unedo*, caule arboreo, foliis glabris ferratis, bacc. polyspermis
adrachne, caule arboreo, foliis glabris integerrimis ferratisque, bacc. polyspermis
alpina, caul. procumbentibus, foliis rugosis ferratis
uva urſi, caul. procumbentibus, fol. integerrimis
- ARISTOLOCHIA** *odoratissima*, foliis cordatis acuminatis, caule volubili fruticoso, pedunc. solitariis, labio corollis majore
- ATRIPLEX** *portulacoides*, caule fruticoso, foliis obovatis
- AZALEA** *vulgaris*, foliis margine scabris, corollis piloso-glutinosis
- BACCHARIS** *halimifolia*, foliis obovatis superne emarginato-crenatis
- BERBERIS** *vulgaris*, pedunculis racemosis
- BETULA** *alba*, foliis ovatis acuminatis ferratis
 — v. ramis dependentibus
nigra, fol. rhomboeo-ovatis acuminatis duplicato-ferratis
lenta, fol. cordatis oblongis acuminatis ferratis
nana, fol. orbiculatis, crenatis
pumila, fol. obovatis crenatis
alnus, pedunculis ramosif

- BIGNONIA** *catalpa*, foliis simplicibus ternis cordatis, caule erecto,
floribus diandris
radicans, sol. pinnatis; Foliolis incisis, caule genicu-
lis radicatis
- BUXUS** *sempervirens*, hort. Cliff.
v. arboreifrons, Bauh. pin.
v. suffruticosa, B. P. humilis Dod. pempt.
- CALYCANTHUS** *florida*, petalis interioribus longioribus
- CARPINUS** *betulus*, squamis strobilorum planis
ostrya, squamis strobilorum inflatis
- CEANOHTHUS** *americanus*, foliis trinervis
- CELASTRUS** *scandens*, inermis, caule volubili
- CELTIS** *australis*, fol. ovato-lanceolatis
occidentalis, fol. oblique ovatis acuminatis
- CEPHALANTHUS** *occidentalis*, foliis oppositis ternatisque
- CERCIS** *siliquastrum*, foliis cordato-orbiculatis glabris
canadensis, fol. cordatis pubescentibus
- CHIONANTHUS** *Virginiana*, pedunculis trifidis trifloris
- CISTUS** *populifolius*, arboreifrons exstipulatus, foliis cordatis
laevis acuminatis petiolatis
laurifolius, arboreifrons exstipulatus, foliis oblongo-
ovatis petiolatis trinerviis supra glabris: Petiolis
basi connatis
ladaniferus, arboreifrons exstipulatus, fol. lanceolatis
supra laevis, petiolis basi coalitis vaginantibus
montpelienensis, arboreifrons exstipulatus, fol. linear-lan-
ceolatis fessilibus utrinque villosis trinerviis
incanus, arboreifrons exstipulatus, fol. spatulatis tomen-
tosis rugosis: Inferioribus basi connatis vaginanti-
bus
albidus, arboreifrons exstipulatus, foliis ovato-lanceola-
tis tomentosis incanis fessilibus subtrinerviis
crispus, arboreifrons exstipulatus, fol. lanceolatis pube-
scentibus trinerviis undulatis
creticus, arboreifrons exstipulatus, foliis spatulato-ovatis,
petiolatis enerviis scabris calyc. lanceolatis
- CITRUS** *aurantium*, petiolis alatis, fol. acuminatis
medica, petiolis linearibus
v. Limon Vulgar.

CLETHRA *alnifolia*

- CLEMATIS** *viorna*, foliis compositis decompositisque: foliolis quibusdam trifidis
cripha, foliis simplicibus ternatisque: foliolis integris trilobisive
orientalis, foliis compositis: foliolis incisis angulatis lobatis cuneiformibus, petalis interne villosis
vitalba, foliis pinnatis; foliolis cordatis scandentibus

CNEORUM *tricoccum*

- COLUTEA** *arborescens*, arborea, foliis obcordatis
 v. *oriental*, M
 v. *istria*, W
frutescens, fruticosa, foliol. ovato oblongis

CORIARIA *myrtifolia*, foliis ovato-oblongis

- CORNUS** *florida*, arborea, involucro maximo: foliolis obcordatis
sericea, arborea cymis nudis, foliis ovatis decemnerviis, subtus subvillosis, pedunculis glabris, S
mascula, arborea, umbellis involucrum aequantibus
sanguinea, arborea, cymis nudis, ramis rectis
alba, arborea, cymis nudis, ramis recurvatis
coerulea, arborea, cymis nudis, foliis ovato-oblongis, decemnerviis subtus subvillosis, germinibus pedunculifolis villosis. S.

- CORONILLA** *emerus*, fruticosa, pedunc. subtrifloris, corollarum unguibus calyce triplo longioribus, caul. angulato
valentina, fruticosa, foliol. subnovenis, stip. suborbiculatis
glaуca, fruticosa, foliol. septenis, obtusissimis, stipul. lanceolatis

- CORYLUS** *avellana*, stipulis ovatis obtusis
colurna, stipulis linearibus acutis

- CRATAEGUS** *aria*, foliis ovatis incisis ferratis, subtus tomentosis
 v. *Suecica inermis*, foliis ellipticis ferratis transversaliter sinuatis, subtus villosis
tomentosa, foliis cuneiformi-ovatis ferratis subangulatis, subtus villosis, ram. spinosis
calcarata, spinosa, foliis cuneiformi ovatis angulatis glabris nitidis, petiolis foliisque calycinis ferrato-glandulosis, S.

- terminalis*, foliis cordatis septangulis : Lobis infimis
divaricatis
- CRATAEGUS** / *coccinea*, foliis cordatis repando-angulatis ferratis gla-
bris
/ *viridis*, foliis lanceolato-ovatis, subtrilobis ferratis gla-
bris, caule inermi
/ *cerus galli*, foliis lanceolato-ovatis ferratis glabris, ra-
mis spinosis
oxyacantha, foliis obtusis subtrifidis ferratis
- CUPRESSUS** / *sempervirens*, foliis imbricatis, frondibus quadrangulis
horizontalis, M. ramos extra se spargens Tournef.
/ *districha*, foliis distichis patentibus
/ *thyoides*, foliis imbricatis, frondibus ancipitibus
lufstanica, M. foliis imbricatis, apicibus aculeatis, ra-
mis dependentibus
/ *juniperoides*, foliis oppositis decussatis subulatis patulis
- CYTISUS** / *laburnum*, racemis simplicibus pendulis, foliol. ovato-
oblongis
v. *alpinus*, M. angustifolius flore racemoſo pen-
dulo longiore
glutinosus
fessilifolius, racem. erectis. calyc. bractea triplici, fol.
floralibus fessilibus
austriacus, florib. umbellatis terminalibus, caul. erectis,
foliol. lanceolatis
tartaricus, Lee's catalog.
- DAPHNE** / *Mezereum*, florib. fessilibus ternis caulinis, fol. lanceo-
latis deciduis
laureola, racem. axillaribus quinquefloris, fol. lanceo-
latis glabris
cneorum, floribus fasciculatis terminalibus fessilibus, fol.
lanceolatis nudis mucronatis
guindium, panicula terminali, fol. linear-lanceolatis a-
cuminatis
- DIOSPYROS** / *virginiana*, foliorum paginis concoloribus
lotus, foliorum paginis discoloribus
- ELAEAGNUS** *angustifolia*, foliis lanceolatis
- EMPETRUM** *nigrum*, procumbens
- EPHEDRA** / *monoſtachia*, pedunculis pluribus : Amentis geminis
diſtachya, pedunculis oppositis, amentis geminis

- ERICA** *vulgaris*, antheris aristatis, cor. campanulatis subaequalibus, cal. duplicatis, fol. oppositis sagittatis
v. flore albo
cinerea, anth. cristatis, cor. ovatis, stylo subexerto, fol. ternis, stigmate capitato
cineria v. flore albo,
tetralix, anth. aristatis, cor. ovatis, stylo inclusu fol.
quaternis ciliatis, floribus capitatis
—v. flore albo,
multiflora, anth. muticis exsertis, cor. cylindricis, stylo exerto, fol. quinis, flor. sparsis
triflora, anth. cristatis, cor. globo-campanulatis, stylo inclusu, fol. ternis, flor. terminalibus
mediterranea, anth. muticis exsertis, cor. ovatis, stylo exerto, fol. quaternis patentibus, flor. sparsis
longiflora

- EUONYMUS** *Europaeus*, *vulgar.* M. foliis lanceolatis, floribus ternandriis, fructu tetragono, M.
latifolius, foliis ovato-lanceolatis, floribus pentandris, fructu pentagono, pedunculis longissimis. Mill.
Americanus, flor. omnibus quinquefidis, fol. sessilibus

- FAGUS** *castanea*, fol. lanceolatis acuminato-ferratis, subtus nudis
pumila, fol. lanceolato-ovatis acute ferratis, subtus tomentosis, amentis filiformibus nodosis
Sylvatica, fol. ovatis obfoletis ferratis

- FICUS** *carica*, fol. palmatis

- FOTHERGILLA**, *gardeni*

- FRAXINUS** *excelsior*, foliolis ferratis, floribus apetalis
rotundifolia, foliolis ovato-lanceolatis serratis, flor. coloratis, Mill.
ornus, foliolis ferratis, flor. coloratis. Mill.
paniculata, foliolis lanceolatis glabris, flor. paniculatis terminatricibus, M.
Americana, foliolis integerrimis, petiolis teretibus
alba, foliolis ovatis ferratis, corollis . . . petiolis supra planis

- GENISTA** *candicans*, fol. ternatis subtus villosis, pedunculis lateribus subquinquefloris foliatis, legum. hirsutis
sagittalis, ramis ancipitibus membranaceis articulatis, fol. ovato-lanceolatis
tinctoria, fol. lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis

- GENISTA.** / *Canariensis*, fol. ternatis utrinque pubescentibus, ramis angulatis
anglica, spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus,
fol. lanceolatis
germanica, spinis compositis, ramis floriferis inermibus,
fol. lanceolatis
striata, H. K.
- GINKGO** *biloba*
- GLEDITSIA** *triacanthos*, caule spinis triplicibus axillaribus
inermis, caule inermi
- GLYCINE** *frutescens*, fol. impari-pinnatis, caule perenni
- GREWIA** *occidentalis*, fol. subovatis. flor. solitariis
- GUILANDINA** *dioica*, inermis, fol. bipinnatis : Basi apiceque simpli-
citer pinnatis
- HALESIA** *tetraptera*, fol. lanceolato-ovatis, petiolis glandulosis
- HAMAMELIS** / *Virginiana*
- HEDERA** *helix*, fol. ovatis lobatisque
quinquefolia, fol. quinatis ovatis ferratis
- HIBISCUS** *syracus*, fol. cuneiforme-ovatis superne inciso-ferratis,
caule arboreo
- HIPPOPHAE** / *rhamnoides*, fol. lanceolatis
/ *canadenſis*, fol. ovatis
- HYDRANGEA** *arboreſcens*
- HYPERICUM** / *canariense*, flor. trigynis, calyc. obtusis, stam. corolla brevioribus, caule fruticoflo
ascyon, flor. pentagynis, caule tetragono herbaceo erecto simplici, fol. laevibus integerrimis
androsaemum, flor. trigynis, fruct. baccatis, caule fruticoflo ancipi
bircinum, flor. trigynis, stam. corolla longioribus, caule fruticoflo ancipi
prolificum, flor. trigynis : Primordialibus fessilibus, caule ancipi fruticoflo, fol. lanceolato-linearibus
perfoliatum, flor. trigynis, caule subancipi, fol. am-
plexicaulibus ovatis, cyma floribus fessilibus
olympicum, flor. trigynis, calyc. acutis, stam. corolla brevioribus, caule fruticoflo

JASMINUM

officinale, fol. oppositis : Foliolis distinctis
fruticans, fol. alternis ternatis simplicibusque, ramis
 angulatis
humile, fol. alternis acutiusculis ternatis pinnatisque,
 ramis teretibus

ILEX

aquifolium, fol. ovatis acutis spinosis
v. echinata, fol. ovatis, undulatis, marginibus aculeatis, paginis superne spinosis, M.
cassine, fol. ovato-lanceolatis ferratis, Lin.
caroliniana, Mil.

ITEA

Virginiana,

IVA

frutescens, foliis lanceolatis, caule fruticoso

JUGLANS

regia, foliolis ovalibus glabris subferratis subaequalibus
alba, foliolis septenis lanceolatis ferratis : Impari sessili
 v. *ovata*, foliolis lanceolatis ferratis glabris subaequalibus, M.
nigra, foliolis quindenis lanceolatis : Exterioribus minoribus, geminis superaxillaribus
 v. *oblonga*, foliolis cordato-lanceolatis inferne nervosis, pediculis foliorum pubescentibus, M.
cinerea, foliolis undenis lanceolatis basi altera breviore

JUNIPERUS

communis, fol. ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus
 v. *Suecia*, fol. ternis patentibus, acutioribus, ramis erectioribus, baccis longioribus, Mill.
Bermudiana, fol. inferioribus ternis : Superioribus binis decurrentibus subulatis patulis acutis
Virginiana, fol. ternis basi adnatis : Junioribus imbricatis : Senioribus patulis
Sabina, fol. oppositis erectis decurrentibus : Oppositonibus pyxidatis
Lusitanica, M. foliis oppositis patulis decurrentibus, ramis erectioribus
Phoenicia, fol. ternis oblitteratis imbricatis obtusis

KALMIA

latifolia, fol. ovatis, corymb. terminalibus
angustifolia, fol. lanceolatis, corymb. lateralibus

LAVATERA

arborea, caule arboreo, fol. septemangularibus, tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus
olbia, caule fruticoso, fol. quinquelobo-hastatis, pedunculis solitariis

LAURUS / *camphora*, fol. triplinervis lanceolato-ovatis
nobilis, fol. lanceolatis venosis perennantibus, flor.
 quadrifidis
v. undulata, fol. lanceolatis venosis perennantibus
 marginibus undatis, M.
benzoin, fol. enerviis ovatis utrinque acutis integris
 annuis
 / *sassafras*, fol. trilobis integrisque

LIGUSTRUM *vulgare*

LIQUIDAMBAR / *styraciflua*, foliis palmato-angulatis : Lobis indivisis
 acutis
peregrina, fol. oblongis alternatim sinuatis

LIRIODENDRON / *tulipiferum*, fol. lobatis

LONICERA / *caprifolium*, flor. verticillatis terminalibus sessilibus, fol.
 fummis connato-perfoliatis
sempervirens, verticillis aphyllis terminalibus, fol. sum-
 mis connato-perfoliatis
periclymenum, capitul. ovatis imbricatis terminalibus,
 fol. omnibus distinctis
tatarica, pedunc. bifloris, bacc. distinctis, fol. corda-
 tis obtusis
xylosteum, pedunc. bifloris, bacc. distinctis, fol. inte-
 gerrimis pubescentibus
alpigena, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis didymis,
 fol. ovali-lanceolatis
coerulea, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis globosis,
 stylis indivisis
syphoricarpos, capitul. lateralibus pedunculatis, fol.
 petiolatis
dierilla, racem. terminalibus, fol. serratis

LOTUS *rectus*, capit. subglobosis, caule erecto laevi : Legum.
rectis glabris

LYCIUM *afrum*, fol. linearibus
barbarum, fol. lanceolatis, calyc. sub-bifidis
Europaeum, fol. obliquis, ramulis flexuosis teretibus.
 Salicifolium, Mill.
Chinense, fol. ovato lanceolatis, ramis diffusis, floribus
 solitariis patentibus alaribus, stylo longiori, M.

MAGNOLIA *grandiflora*, fol. lanceolatis perennantibus
glaucia, fol. ovato-oblongis subtus glaucis
acuminata, fol. ovato-oblongis acuminatis
tripetala, fol. lanceolatis, petalis exterioribus depen-
 dentibus

- MELIA *cedarach*, fol. bipinnatis
- MELIANTHUS *majar*, stipulis solitariis petiolo adnatis
- MENISPERMUM *Canadense*, fol. peltatis cordatis subrotundo angulatis
- MESPILUS *Germanica*, inermis fol. lanceolatis subtus tomentosis,
flor. solitariis sessilibus
pyracantha, spinosa, fol. lanceolato-ovatis crenatis,
calyc. fructus obtusis
arbutifolia, inermis, fol. lanceolatis crenatis, subtus to-
mentosis
amelanchier, inermis, fol. ovalibus ferratis subtus hirs-
utis
chamaemespilus, inermis, fol. ovalibus acute ferratis
glabris, flor. corymbofo-capitatis
Canaden sis, inermis, fol. ovato-oblongis glabris acuti-
useulis
cotonea fler, inermis, fol. ovatis integerrimis, subtus to-
mentosis
orientalis, fol. ovatis crassis integerrimis, subtus to-
mentosis, floribus umbellatis axillaribus
- MORUS *alba*, fol. oblique cordatis laevibus
nigra, fol. cordatis scabris
patyrifera, fol. palmatis, fructibus hispidis
rubra, fol. cordatis subtus villosis, amentis cylindri-
cis
- MYRICA *gale*, fol. lanceolatis subserratis, caule suffruticoso
cerifera, fol. lanceolatis subserratis, caule arbores-
cente
v. pumila, Myrtus Brabanticae similis Carolinien-
sis humilior, foliis latioribus et magis ferratis. Ca-
tesb.
cuneata
- MYRTUS *communis*, flor. solitariis : Involucro diphyllo
- NYSSA *aquatica*,
v. montana Catesb.
- PASSIFLORA *coerulea*, foliis palmatis integerrimis
- PHILADELPHUS, *coronarius*, foliis subdentatis
v. pumilus, W.
inodorus, foliis integerrimis
- PHYLLYREA *angustifolia*, foliis linear-lanceolatis integerrimis

- PHILLYREA** *latifolia*, foliis ovato-cordatis ferratis
media, foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis
- PHLOMIS** *fruticosa*, foliis subrotundis tomentosis crenatis, involu-
 cris lanceolatis, caule fructuoso
- PINUS** *abies*, M. *picea*, M. foliis subulatis, mucronatis laevibus bifari-
 am versis
alba, M. foliis subtus argenteis, apice emarginatis,
 conis erectis
balsamica, M. foliis subtus argenteis apice subemar-
 ginatis bifariam versis
canadenfis, M. foliis linearibus obtusiusculis, sub-
 membranaceis
mariana, M. foliis linearibus acutis, conis minimis
Americana, M. foliis linearibus obtusiusculis bifariam
 versis, conis subrotundis
- Pinus* M. *silvestris*, M. foliis geminis primordialibus solitariis
 glabris
rubra, M. foliis geminis brevioribus glaucis, conis
 parvis mucronatis
pinea, M. foliis geminis, primordialibus solitariis ci-
 liatis
echinata, M. *Virginiana* praelongis foliis tenuioribus
 cono echinato gracile Pluk.
rigida, M. foliis ternis, conis longioribus, squamis ri-
 gidioribus
taeda, M. foliis longioribus tenuioribus ternis, conis
 maximis laxis
cembra, M. foliis quinis laevibus
fimbrosa, M. foliis quinis scabris
- Larix*, M. *cedrus*, M. foliis acutis perennanticis, conis obtusis
Larix decidua, M. foliis deciduis, conis ovatis ob-
 tusis
- PISTACIA** *trifolia*, foliis subternatis simplicibusque
narbonensis, foliis pinnatis ternatisque suborbiculatis
vera, foliis impari-pinnatis : Foliolis subovatis recur-
 vis
terebinthus, foliis impari pinnatis : Foliolis ovato-lan-
 ceolatis
lentiscus, foliis abrupte pinnatis : Foliolis lanceolatis
- PLATANUS** *orientalis*, foliis palmatis
occidentalis, foliis lobatis
 v. *Hispanica*, Lee.
- POPULUS** *alba*, fol. subrotundis dentato angulatis subtus tomen-
 tofis

- POPULUS** *alba*, v. *major*, fol. angulatis ferratis, subtus tomentosus superne virentibus, Mil.
tremula, foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris
nigra, foliis deltoidibus acuminatis ferratis
 v. *padensis*, ramis erectis approximatis
tacamahac, M. Balsam, L. S. N. fol. ovatis ferratis
 subtus albidis, stipulis resinosis
 hujus var. *vulgo* Balsam
balsam, M. an *heterophylla* Lin.
- POTENTILLA** *fruticosa*, foliis pinnatis, caule fruticoso
- PRINOS** *verticillatus*, foliis longitudinaliter ferratis
glaber, foliis apice ferratis
 Rotundifol.
- PRUNUS** *padus*, flor. racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis
virginiana, flor. racemosis, foliis deciduis basi antice glandulosis
lusitanica, flor. racemosis, foliis sempervirentibus eglandulosis
laurocerasus, flor. racemosis, fol. sempervirentibus dorso biglandulosis
mahaleb, flor. corymbosis terminalibus, foliis ovatis
armeniaca, flor. sessilibus, foliis subcordatis
pumila, flor. subumbellatis, foliis angusto-lanceolatis
cerasus, umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis
avium umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis
domestica, pedunculis subfolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis
infertia, pedunculis geminis, foliis ovatis subvillois convolutis, ramis spinescentibus
spinosa, pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis
Padus Caroliniana M. foliis lanceolatis acute dentatis sempervirentibus?
- PTELEA** *trifoliata*, foliis ternatis
- PUNICA** *granata*, foliis lanceolatis, caul. arboreo
- PYRUS** *communis*, foliis ferratis laevibus, flor. corymbosis
malus, foliis ferratis, umbellis sessilibus
coronaria, foliis ferrato-angulosis, umbellis pedunculatis

- PYRUS** *cydonia*, foliis integerrimis, flor. solitariis
baccata, foliis ferratis, pedunc. confertis, pomis bac-
 catis
- QUERCUS** *robur*, foliis deciduis oblongis superne latioribus ; Si-
 nubus acutioribus, angulis obtusis
 v. longo pedicul. C. B.
 v. brevi pedicul. C. B.
phellos, foliis lanceolatis integerrimis glabris
ilex, foliis ovato-oblongis indivisis ferratisque, subtus
 incanis, cortice integro
fruber, foliis ovato oblongis indivisis ferratis, subtus to-
 mentosis, cortice rimofo fungoso
prinus, foliis ovatis utrinque acuminatis sinuato-ferra-
 tis : Denticulis rotundatis uniformibus
rubra, foliis obtuse sinuatis setaceo-mucronatis
cerris, foliis oblongis lyrato-pinnatifidis, laciinis trans-
 versis acutis, subtus subtomentosis
nigra, foliis cuneiformibus obsolete trilobis
alba, fol. oblique pinnatifidis : Sinibus angulisque
 obtusis
virginiana, M. foliis lanceolato ovatis integerrimis pe-
 tiolatis sempervirentibus
- RHAMNUS** *catharticus*, spinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis,
 fol. ovatis, caul. erecto
frangula, inermis, flor. monogynis hermaphroditis, fol.
 integerrimis
alaternus, inermis, flor. dioicis, stigmata triplici, fol.
 ferratis
 v. fol. dentat. Lee
paliurus, aculeis geminatis : Inferiore reflexo, flor.
 trigynis
spina Christi, aculeis geminatis rectis, fol. ovatis
scandens, H. K.
- RHODODENDRON**, *ferrugineum*, fol. glabris subtus leprosis, coroll. in-
 fundibuliformibus
ponticum, fol. nitidis lanceolatis utrinque glabris, ra-
 cem. terminalibus
maximum, fol. nitidis ovalibus obtusis venosis, margine
 acuto reflexo, pedunc. unifloris
- RHUS** *coriaria*, fol. pinnatis obtusiuscule ferratis ovalibus,
 subtus villosis
typhina, fol. pinnatis argute ferratis lanceolatis, subtus
 tomentosis
vernix, fol. pinnatis integerrimis annuis, opacis, peti-
 olo integro aequali

RHUS

copallinum, fol. pinnatis integerrimis petiolo membranaceo articulato
radicans, fol. ternatis : Foliol. petiolatis ovatis nudis integerrimis, caul. radicante
toxicodendron, fol. ternatis : Foliol. petiolatis angulatis pubescentibus, caul. radicante
cotinus, fol. simplicibus obovatis
canadenſis, fol. pinnatis, obſolete ferratis lanceolatis, utrinque glabris, panicula composita. Mill.
procera, Sol.

RIBES

rubrum, inerme, racem. glabris pendulis, flor. planiusculis
alpinum, inerme, racem. erectis, bracteis flore longioribus
nigrum, inerme racem. pilosis, flor. oblongis
grossularia, ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsutis
RIBES *uva crispa*, ramis aculeatis, bacc. glabris, pedicellis bractea monophylla
oxyacanthoides, ramis undique aculeatis
cynobati, aculeis subaxillaribus, bacc. aculeatis racemosis

ROBINIA

pseudacacia, racemis pedicellis unifloris, fol. impari-pinnatis, stipul. spinosis
hispida, racem. axillaribus, fol. impari-pinnatis, caul. inermi hispido
caragana, pedunc. simplicibus, fol. abrupte pinnatis, petiolis inermibus
pygmaea, pedunc. simplicibus, fol. quaternatis sessilibus

Rosa

eglantaria, germin. globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiol. scabris foliol. acutis
cinnamomea, germin. globosis pedunculisque glabris, caule aculeis stipularibus petiol. subinermibus
arvensis, germin. globosis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis, flor. cymosis
pimpinellifolia, germin. globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiol. scabris, foliol. obtusis
spiniflora, germin. globosis glabris, pedunc. hispidis, caule petiolisque aculeatissimis
Carolina, germin. globosis hispidis, pedunc-subhispidis, caule aculeis stipularibus, petiol. aculeatis
villoſa, germin. globosis pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiol. aculeatis, fol. tomentosis
sempervirens, germin. globosis pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatis, florib. subumbellatis

Rosa

centifolia, germin. ovatis pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiol. inermibus
gallica, germin. ovatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis
canina, germin. ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis
alba, germin. ovatis glabris, pedunc. hispidis, caule petiolisque aculeatis
damascena, caule aculeato pedunculis hispidis, calycibus pinnatifidis hirsutis, Mill.
provincialis, caule petiolisque aculeatis, foliis subtus villosis, calycibus semipinnatis hispidis, Mill.

Rosmarinus officinalis

Rubus

idaeus, fol. quinato pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiol. canaliculatis
occidentalis, fol. ternis subtus tomentosis, caule aculeato, petiol. teretibus
hispidus, fol. ternatis nudis, caulib. petiolisque hispidissimis, strigis rigidulis
caesius, fol. ternatis subnudis: Lateralibus bilobis, caule aculeato tereti
fruticosus, fol. quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis
odoratus, fol. simplicibus palmatis, caule inermi multifolio multifloro

Ruscus

aculeatus, fol. supra floriferis nudis
Hypophyllum, fol. subtus floriferis nudis
hypoglossum, fol. subtus floriferis sub foliolo
racemosus, racemo terminali hermaphroditico

Salix

hermaphroditica, fol. ferratis glabris, flor. hermaphroditis diandris
pentandra, fol. ferratis glabris, flor. pentandris
vitellina, fol. ferratis ovatis acutis glabris: Serraturis cartilagineis, petiolis calloso punctatis
amygdalina, fol. ferratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus
fragilis, fol. ferratis glabris ovato lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis
babylonica, fol. ferratis glabris linear-lanceolatis, ramis pendulis
purpurea, fol. ferratis glabris lanceolatis: Inferioribus oppositis
helix, fol. ferratis glabris lanceolato-linearibus: Superioribus oppositis obliquis
rubra, fol. integris glabris linear-lanceolatis acutis, Hudson

<i>SALIX</i>	<i>arenaria</i> , fol. integris ovatis acutis, supra subvillosis, subtus tomentosis <i>fusca</i> , fol. integerrimis ovatis subtus pubescentibus <i>rosmarinifolia</i> , fol. integerrimis lanceolato-linearibus strictis sessilibus, subtus tomentosis <i>aurita</i> , fol. integerrimis utrinque villosis obovatis ap- pendiculatis <i>caprea</i> , fol. ovatis rugosis, subtus tomentosis undatis, superne denticulatis <i>viminalis</i> , fol. subintegerrimis lanceolato linearibus longissimis acutis, subtus sericeis, ramis virgatis <i>alba</i> , fol. lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pu- bescentibus : Serraturis infimis glandulosis
<i>SALSOLA</i>	<i>fruticosa</i> , frutiçosa erecta, fol. filiformibus obtusiuscu- lis
<i>Sanguinaria</i>	<i>Canadensis</i>
<i>SAMBUCUS</i>	<i>canadensis</i> , cymis quinquepartitis, fol. sub-bipinnatis, caul. frutescente <i>nigra</i> , cymis quinquepartitis, caul. arboreo v. fructu albo v. lacinato folio Bauh. pin. <i>racemosa</i> , racem. compositis ovatis, caul. arboreo
<i>SELAGO</i>	<i>spurra</i> , spicis corymbosis, fol. linearibus denticulatis
<i>SIDEROCYDON</i>	<i>inerme</i> , fol. perennantibus obovatis, pedunculis teret- ibus <i>lycoides</i> , spinosum, fol. deciduis lanceolatis
<i>SOREX</i>	<i>aucuparia</i> , fol. pinnatis utrinque glabris <i>domestica</i> , fol pinnatis subtus villosis
<i>SPARTIUM</i>	<i>junceum</i> , ramis oppositis teretibus apice floriferis, fol. lanceolatis <i>complicatum</i> , fol. ternatis : Foliolis conduplicatis, caul. inerribus prostratis glabris, leguminibus scabris <i>scoparium</i> , fol. ternatis solitariisque, ramis inerribus angulatis <i>radiatum</i> , fol. ternatis linearibus sessilibus petiolatis persistentibus, ramis oppositis angulatis <i>spinosum</i> , fol. ternatis, ramis angulatis spinosis <i>lusitanicum</i> , fol. ternatis, foliolis cuneiformibus, ramis inerribus angulatis
<i>SPRAECA</i>	<i>salicifolia</i> , fol. lanceolatis obtusis ferratis, nudis, flor. duplicato-racemosis <i>tomentosa</i> , fol. lanceolatis inaequaliter ferratis subtus tomentosis, flor. duplicato-racemosis

- SPIRAEA *hypericifolia*, fol. obovatis integerrimis, umbellis sessili-
bus
forbifolia, fol. pinnatis: Foliolis uniformibus ferratis,
caule fruticoso, flor. paniculatis
crenata, fol. oblongiusculis apice ferratis, corymbis la-
teralibus
opulifolia, fol. lobatis ferratis, corymbis terminalibus
- STAPHYLEA *pinnata*, fol. pinnatis
trifolia, fol. ternatis
- STEWARTIA *malacodendron*
- STYRAX *officinalis*
- SYRINGA *vulgaris*, fol. ovato-eordatis
v. flore caeruleo
Perfica, fol. lanceolatis
v. fol. dissectis
- TAMARIX *Gallica*, floribus pentandris
Germanica, floribus decandris
- TAXUS *baccata*, fol. approximatis
- THEA *Bohea*, flor. hexapetalis
viridis, flor. enneapetalis
- TILIA *Europaea*, floribus nectario destitutis
Americana, floribus nectario instructis
- THUJA *orientalis*, strobilis squarrofis: Squamis acutis
occidentalis, strobilis laevibus: Squamis obtusis
- VACCINIUM *mirtillus*, pedunc. unifloris, fol. ferratis ovatis deci-
duis, caule angulato
uliginosum, pedunc. unifloris, fol. integerrimis obovatis
obtusis laevibus
vitis idaea, racem. terminalibus nutantibus, fol. obo-
vatis revolutis integerrimis, subtus punctatis
oxycoccus, fol. integerrimis revolutis ovatis, caulib. re-
pentibus filiformibus nudis
- VIBURNUM *tinus*, fol. integerrimis ovatis: Ramificationibus ven-
rum subtus villoso-glandulosis
nudum, fol. integerrimis lanceolato-ovatis
prunifolium, fol. subrotundis crenato-ferratis glabris
dentatum, fol. ovatis dentato-ferratis plicatis
lantana, fol. cordatis ferratis venosis, subtus tomentosis
acerifolium, fol. lobatis, petiolis laevibus



- VIBURNUM** *opusus*, fol. lobatis, petiolis glandulosis
 v. *Roseum*, flore globoſo pteno
 lentago, fol. ovatis ferrulatis acuminatis glabris, petiol.
 emarginatis undulatis
 ſeffile, Sol.
 cassinoides, fol. evatis crenatis glabris, petiolis carinatis
 eglandulatis
- VINCA** *minor*, caul. procumbentibus, fol. lanceolato-ovatis,
 flor. pedunculatis
 major, caul. erectis, fol. ovatis, flor. pedunculatis
- VISCUM** *album*, fol. lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis
 axillaribus
- VITEX** *agnus castus*, fol. digitatis ferratis, spicis verticillatis
- VITIS** *vinifera*, fol. lobatis finuatis nudis
 vulpina, fol. cordatis dentato-ferratis utrinque nudis
 laciniosa, fol. quinatis, foliolis multifidis
- ULEX** *Europaeus*, fol. villosis acutis, spinis sparsis
- ULMUS** *Americana* fol. aequaliter ferratis : Basi inaequalibus
 scabra, fol. oblongo-ovatis inaequaliter ferratis, caly-
 cibus foliaceis, Mill.
 sativa, fol. ovatis acuminatis duplicato-ferratis, bafi
 inaequalibus, Mill.
 minor, fol. oblongo-ovatis glabris acuminatis dupli-
 to-ferratis, Mill.

ZANTHOXYLUM *clava Herculis*, foliis pinnatis.

F I N I S.

Explicatio Nominum Abbreviatorum.

- M. the Gardener's Dictionary by P. Miller, 1758, fol.
 H. the Vegetable System, by J. Hill, M. D. fol.
 H. K. Hortus Kewensis, auctore J. Hill, 1772, 8vo.
 C. B. Casp. Bauhin. pinax, 1671, 4to.
 J. R. H. J. Raii Historia Plantarum, fol.
 S. Dr Solander.
 Cat. Natural Hist. of Carolina, by M. Catesby, 1731, fol.
 Hort. Cliff. Linnaei Hortus Cliffortianus, 1737, fol.
 L. S. N. Linnaei Systema Naturae, Got. 1774.
 Dod. Pempt. R. Dodonaei Stirpium Hist. Pemptades sex, 1616, fol.
 Hudſ. G. Hudsoni Flora Anglica, 1778, 8vo.
 V. Varietas.

